

# APO-OLANZAPINE TABLETS

Olanzapine (5mg, 10mg)

## Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Apo-Olanzapine
2. Bagaimana Apo-Olanzapine berfungsi
3. Sebelum mengambil Apo-Olanzapine
4. Cara menggunakan Apo-Olanzapine
5. Semasa menggunakan Apo-Olanzapine
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Apo-Olanzapine
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

## Apakah kegunaan Apo-Olanzapine

Apo-Olanzapine (olanzapine) digunakan untuk rawatan dan pemeliharaan skizofrenia, penyakit dengan gejala seperti dengar, lihat atau merasakan sesuatu yang tidak wujud, kepercayaan yang salah, kecurigaan yang luar biasa, dan menarik diri.

Apo-Olanzapine juga digunakan untuk rawatan episod manik sederhana dan teruk, keadaan dengan gejala kegembiraan atau teruja.

## Bagaimana Apo-Olanzapine berfungsi

Apo-Olanzapine berada dalam kelas ubat-ubatan yang disebut antipsikotik. Ia berfungsi dengan mengubah aktiviti bahan semula jadi tertentu di otak.

## Sebelum menggunakan Apo-Olanzapine

- *Bila tidak boleh menggunakan*  
Jangan gunakan produk ini jika anda alah kepada Olanzapine atau bahan lain dalam ubat ini. (Rujuk Maklumat Lanjut).

Keadaan perubatan tertentu tidak membenarkan penggunaan Apo-Olanzapine, seperti *narrow-angle glaucoma*, penyakit Parkinson, psikosis yang berkaitan dengan demensia dan / atau gangguan tingkah laku. Merujuk kepada pegawai kesihatan anda sebelum anda mula mengambil ubat ini.

### *Kehamilan dan penyusuan kanak-kanak*

Jangan mengambil Apo-Olanzapine jika anda hamil, cuba hamil atau menganggap anda mungkin hamil. Jangan mengambil Apo-Olanzapine jika anda menyusui. Sila rujuk nasihat doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil sebarang ubat.

### *- Sebelum mula menggunakan Apo-Olanzapine*

Sebelum anda mula menggunakan ubat ini, doktor anda perlu mengetahui sama ada anda mempunyai masalah perubatan lain, termasuk:

- Mana-mana keadaan perubatan yang disebutkan di *Bila tidak boleh menggunakan* di atas.
- Masalah hati, jantung yang diketahui
- Semua keadaan perubatan yang lain.

Ubat ini juga boleh mempengaruhi suhu badan anda. Beritahu doktor anda tentang persekitaran tempat kerja anda supaya mereka dapat menentukan sama ada ubat ini akan mempengaruhi pekerjaan anda atau tidak.

Kecuali diarahkan oleh doktor, ubat ini tidak sesuai untuk orang tua dan kanak-kanak.

- *Jika mengambil ubat-ubat lain*  
Sebilangan ubat boleh menyebabkan komplikasi ketika diambil bersama dengan Apo-Olanzapine. Ubat-ubatan ini termasuk:

- Arang aktif
- Produk perubatan penyakit Parkinson
- Ubat untuk rawatan jantung

Beritahu doktor anda jika anda mengambil ubat-ubat lain, termasuk ubat-ubat yang anda beli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

## Cara menggunakan Apo-Olanzapine

- *Berapa banyak harus digunakan*  
Ikuti semua arahan yang diberikan oleh doktor dan ahli farmasi anda dengan berhati-hati. Ia mungkin berbeza dengan maklumat yang terdapat dalam risalah ini. Sekiranya anda tidak memahami arahan pada label, minta bantuan doktor atau ahli farmasi anda.

### *Skizofrenia:*

Dos permulaan yang disyorkan untuk olanzapine adalah 10 mg / hari.

### *Gangguan Bipolar:*

Dos permulaan yang disyorkan ialah 10mg / hari. Untuk pesakit yang telah menerima olanzapine untuk rawatan episod manik, teruskan terapi pada dos yang sama untuk mencegah dari berulang.

Olanzapine boleh diberikan tanpa makanan kerana penyerapan ubat ini tidak dipengaruhi oleh makanan.

# APO-OLANZAPINE TABLETS

Olanzapine (5mg, 10mg)

*- Bila perlu digunakan*

Gunakan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

*- Berapa lama perlu digunakan*

Teruskan pengambilan Apo-Olanzapine selama yang dicadangkan oleh doktor anda.

*- Jika terlupa menggunakan*

Rujuk doktor atau ahli farmasi anda mengenai perkara yang harus anda lakukan sekiranya anda lupa menggunakannya.

Ambil dos yang terlupa sebaik sahaja anda ingat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, tunggu sehingga mengambil dos seterusnya dan abaikan dos yang terlupa itu. Jangan mengambil dos berganda untuk menebus dos yang terlupa.

*- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)*

Gejala terlebih dos biasanya termasuk denyutan jantung cepat, agitasi/keagresifan, dan kesukaran bercakap.

Walaupun tidak ada penawar khusus untuk terlebih dos ini, jangan mencuba muntah keluar ubat ini. Hubungi doktor anda segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anda rasa anda atau orang lain mungkin telah mengambil terlalu banyak ubat ini. Lakukan ini walaupun tidak ada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera.

## Semasa menggunakan Apo-Olanzapine

*- Perkara yang perlu dilakukan*

Ambil ubat anda seperti mana yang diberitahu oleh doktor anda.

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda mengambil Apo-Olanzapine.

Beritahu doktor anda dengan segera sekiranya anda hamil semasa mengambil ubat ini.

*- Perkara yang tidak boleh dilakukan*  
Jangan berhenti mengambil ubat ini melainkan dinasihatkan oleh doktor anda.

Jangan mengambil ubat baru tanpa berbincang dengan doktor anda.

Jangan berikan Apo-Olanzapine kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai gejala atau keadaan yang sama seperti anda.

*- Perkara yang perlu diberi perhatian*  
Metabolisme ubat ini akan dipengaruhi oleh alkohol dan merokok. Beritahu doktor / ahli farmasi anda jika anda akan merokok dan / atau mengambil alkohol semasa rawatan.

*Memandu dan menggunakan mesin*  
Ubat ini boleh mempengaruhi kemampuan anda untuk memandu atau menggunakan mesin. Sekiranya tablet ini menyebabkan anda merasa sakit, pening atau letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau menggunakan mesin dan segera hubungi doktor anda.

## Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, Apo-Olanzapine boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya. Berikut adalah beberapa kesan sampingan yang mungkin berlaku:

- pening

- sembelit
- keletihan
- kenaikan berat badan
- kegelisahan)
- *orthostatic hypotension*
- mengantuk
- mulut kering
- kelemahan fizikal
- kekurangan tenaga
- dispepsia (gangguan pencernaan)
- peningkatan selera makan
- gegaran

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web [npra.gov.my](http://npra.gov.my) [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

## Cara penyimpanan dan pelupusan Apo-Olanzapine

*- Penyimpanan*

Jauhkan dari capaian kanak-kanak.

HDPE botol: Simpan pada suhu di bawah 25 ° C.

Blister in box: Simpan pada suhu di bawah 30°C.

Lindungi dari cahaya dan kelembapan.

*- Pelupusan*

Ubat tidak boleh dibuang melalui air sisa atau sampah isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana membuang ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

# APO-OLANZAPINE TABLETS

Olanzapine (5mg, 10mg)

## Maklumat lanjut

### - Rupa dan warna produk

Tablet 5 mg: Setiap tablet berwarna putih, bulat, bersalut filem dwicembung, terukir "APO" di satu sisi dan "OLA" di atas "5" di sisi lain. Tablet 10 mg: Setiap tablet berwarna putih, bulat, bersalut filem dwicembung, terukir "APO" di satu sisi dan "OLA" di atas "10" di sisi lain.

**Tarikh kemaskini RiMUP -**  
03/11/2020

**Nombor Siri NPRA**  
NPRA(R2/1)200923/524

### - Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif  
Olanzapine

- Bahan tidak aktif  
Campuran Olanzapine: Lactose Monohydrate, Magnesium Stearate, Microcrystalline Cellulose, Cornstarch

Film salut Olanzapine:  
Hydroxypropyl Methyl Cellulose, Polyethylene Glycol, Titanium Dioxide, Purified Water.

### - Nombor MAL:

Apo-Olanzapine 5mg Tablets:  
MAL19051005AZ

Apo-Olanzapine 10mg Tablets:  
MAL19051006AZ

## Pengilang

Apotex Inc.  
150 Signet Drive,  
Toronto, Ontario,  
Canada, M9L 1T9

## Pemegang Pendaftaran Produk

Pharmaforte (M) Sdn Bhd  
2, Jalan PJU 3/49, Sunway  
Damansara, 47810 Petaling Jaya,  
Selangor Darul Ehsan