

APO-TAMSULOSIN CR TABLETS 0.4mg

Tamsulosin Hydrochloride 0.4mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Apo-Tamsulosin
2. Bagaimana Apo-Tamsulosin berfungsi
3. Sebelum menggunakan Apo-Tamsulosin
4. Cara menggunakan Apo-Tamsulosin
5. Semasa menggunakan Apo-Tamsulosin
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Apo-Tamsulosin
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Apo-Tamsulosin

Apo-Tamsulosin (*tamsulosin hydrochloride*) diindikasikan sebagai rawatan untuk simptom *lower urinary tract* (LUTS) yang berkaitan dengan hiperplasia prostatik benigna (BPH).

Bagaimana Apo-Tamsulosin berfungsi

Apo-Tamsulosin adalah *alpha-blocker* yang melegakan otot-otot dalam prostat dan leher pundi kencing, untuk memudahkan pembuangan air kecil.

Sebelum menggunakan Apo-Tamsulosin

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan produk ini jika anda alah kepada *tamsulosin* atau mana-mana isi kandungan lain ubat ini. (Sila rujuk **Maklumat lanjut**)

Anda juga tidak harus menggunakan Apo-Tamsulosin jika anda menggunakan ubat-ubatan tertentu seperti *CYP3A4 inhibitor* yang kuat (contohnya *ketoconazole*).

Mengandung dan menyusukan anak

Apo-Tamsulosin (*Tamsulosin hydrochloride*) tidak diindikasikan untuk penggunaan dalam kalangan wanita.

- Sebelum mula mengambil

Sebelum mengambil Apo-Tamsulosin doktor anda perlu tahu jika anda mempunyai sebarang keadaan perubatan lain yang memerlukan perhatian.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Sesetengah ubat mungkin menyebabkan komplikasi apabila diambil bersama-sama dengan Apo-Tamsulosin, termasuk:

- *CYP3A4 inhibitor* yang kuat (contohnya *ketoconazole*)
- *CYP3A4 inhibitor* yang sederhana kuat (contohnya *erythromycin*)
- *Cimetidine*
- Penghalang *alpha-adrenergic* lain
- *Warfarin*

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Apo-Tamsulosin

- Berapa banyak harus digunakan

Apo-Tamsulosin 0.4 mg sekali sehari adalah disyorkan sebagai dos untuk rawatan simptom *lower urinary tract* (LUTS) yang berkaitan dengan hiperplasia prostatik benigna (BPH).

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Apo-Tamsulosin perlu diambil pada masa yang sama setiap hari dengan atau tanpa makanan. Tablet Apo-Tamsulosin mesti ditelan secara menyeluruh, kerana menghancurkan atau mengunyah akan mengganggu pelepasan terkawal bahan aktif.

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan Apo-Tamsulosin untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebi dos)

Jika anda menggunakan terlalu banyak Apo-Tamsulosin, anda mungkin mengalami sedikit kesan-kesan hipotensi.

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Apo-Tamsulosin

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Apo-Tamsulosin.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi Apo-Tamsulosin dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Seperti semua penghalang alpha, pengurangan dalam tekanan darah boleh berlaku dalam kes-kes individu semasa rawatan boleh mengakibatkan, walaupun adalah jarang, <i>syncope</i> (kehilangan kesedaran sementara disebabkan oleh kejatuhan dalam tekanan darah) boleh berlaku. Pada tanda-tanda awal hypotensi orthostatik (pening, lemah), pesakit harus duduk atau baring sehingga simptom-simptom ini reda. <i>Memandu dan menggunakan jentera</i> Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera, Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera. Kesan-kesan sampingan Seperti ubat-ubatan lain, Apo-Tamsulosin boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya. Kesan-kesan sampingan yang mungkin berlaku termasuk: • Pening • Gangguan Ejakulasi • Debaran jantung • Sembelit • Cirit-birit • Loya • Muntah • <i>Asthenia</i> (kekurangan tenaga) • Sakit kepala • <i>Syncope</i> Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini. Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web nptra.moh.gov.my [<i>Consumers Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF)</i> or Vaccines (AEFI)].	Cara penyimpanan dan pelupusan Apo-Rosuvastatin - <u><i>Penyimpanan</i></u> Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak. Simpan bawah 30 °C. - <u><i>Pelupusan</i></u> Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar. Maklumat lanjut - <u><i>Rupa dan warna produk</i></u> Tablet kuning-coklat, bulat, dwicembung, bersalut filem. Terukir "TA" lebih "0.4" di satu sisi, kosong di sisi lain. - <u><i>Bahan-bahan kandungan</i></u> - Bahan aktif <i>Tamsulosin Hydrochloride</i> - Bahan tidak aktif <i>Sodium Alginate, Citric Acid Anhydrous, Hydroxypropyl Methylcellulose K15M, Magnesium Sterate, Colloidal Silicon Dioxide, Hydroxypropyl Methylcellulose E5, Hydroxypropyl Cellulose, Polyethylene Glycol 8000, Yellow Ferric Oxide, Purified Water</i> - <u><i>Nombor MAL</i></u> MAL18106110AZ Pengilang Apotex Incorporated, 150 Signet Drive, Weston, Ontario, Canada M9L 1T9 Pemegang Pendaftaran Produk Pharmaforte (M) Sdn Bhd 2, Jalan PJU 3/49 Sunway Damansara 47810 Petaling Jaya	Tarikh kemaskini RiMUP 24/6/2022 Nombor Siri NPRA (R2/1)211220/808
--	---	---