

SALMOL EXPECTORANT

Salbutamol/Guaiphenesin (1 mg/50 mg per 5 mL)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan *Salmol Expectorant*
2. Bagaimana *Salmol Expectorant* berfungsi
3. Sebelum menggunakan *Salmol Expectorant*
4. Cara menggunakan *Salmol Expectorant*
5. Semasa menggunakan *Salmol Expectorant*
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *Salmol Expectorant*
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan *Salmol Expectorant*

Salbutamol menghalang dan melegakan

- Keadaan berdehit, batuk, sesak dada, dan sesak nafas (asma)
- Keradangan saluran pernafasan menyebabkan batuk dan kesukaran mendapat udara masuk ke dalam dan keluar daripada paru-paru (bronkitis kronik)
- kesukaran bernafas apabila paru-paru menjadi besar dan tidak berfungsi dengan baik (*emphysema*)
- Penyakit paru-paru lain pada dewasa dan kanak-kanak berusia 2 tahun dan ke atas.

Guaiphenesin berguna untuk melegakan simptom yang berciri adanya kahak (mukus).

Bagaimana *Salmol Expectorant* berfungsi

Salbutamol digunakan sebagai ubat yang tergolong dalam kumpulan bronkodilator yang membantu saluran pernafasan dalam paru-paru kekal terbuka, menjadikannya lebih mudah untuk udara masuk dan keluar serta membantu melegakan kesesakan dada, berdehit dan batuk. *Guaiphenesin* ialah ekspektoran yang membantu mencairkan kahak yang melekit daripada paru-paru dan menjadikannya lebih mudah untuk dibatuk keluar.

Sebelum menggunakan *Salmol Expectorant*

- Bila tidak boleh menggunakan

- Jika anda mengalami banyak penyakit termasuk tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan hormon tiroid yang berlebihan
- Semasa trimester pertama kehamilan.
- Alergi (hypersensitif) terhadap Salbutamol, Guaiphenesin atau mana-mana bahan kandungan.

Mengandung dan menyusukan anak
Jangan ambil *Salmol Expectorant* jika anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung.

Salbutamol mungkin dirembeskan dalam susu ibu. Jangan ambil *Salmol Expectorant* jika anda sedang menyusukan anak. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

- Sebelum mula menggunakan

Baca segala maklumat pada risalah ini dengan teliti sebelum anda mula menggunakan ubat ini.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda baru-baru ini telah menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi khususnya:

- Ubat untuk merawat tekanan darah tinggi (beta blockers)
- Ubat yang membantu mengurangkan kuantiti air dalam badan (diuretics)
- Ubat yang digunakan dalam rawatan pelbagai penyakit jantung (digoxin).

Cara menggunakan *Salmol Expectorant*

- Berapa banyak harus digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Dewasa: 2-3 sudu teh

Kanak-kanak 6-12 tahun: 1-2 sudu teh

Kanak-kanak 2-6 tahun: 1 sudu teh

- Bila perlu digunakan

Ambil *Salmol Expectorant* 2-3 kali sehari atau sebagaimana yang diarahkan oleh doktor.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan *Salmol Expectorant* untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doctor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (Terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Pengambilan terlalu banyak boleh menyebabkan kesan sampingan, sakit dada (*angina*), tekanan darah tinggi dan kekurangan kalium di dalam serum darah.

Semasa menggunakan *Salmol Expectorant*

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan *Salmol Expectorant*

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi *Salmol Expectorant* dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Sekiranya anda tidak bertindak balas kepada dos biasa ubat ini, ini mungkin menandakan asma yang semakin teruk, dinasihatkan supaya menghubungi doktor anda.

Pangambilan ubat ini harus dihentikan 48 jam sebelum pengumpulan spesimen air kencing untuk ujian tertentu.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, *Salmol Expectorant* boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Kesan sampingan termasuk otot mengeletar terutamanya pada tangan dan peningkatan kadar denyutan jantung.

Salbutamol boleh menyebabkan pengurangan atau peningkatan aktiviti otak, rasa tidak selesa, perubahan emosi, keletihan, mimpi buruk, tingkah laku agresif, keterlaluhan tidur, tidur yang terganggu, keradangan paru-paru, kesesakan hidung, peningkatan kahak, pendarahan hidung, serak, meningkatkan nafsu makan, sakit perut, kejang otot, keputihan yang melampau atau luar biasa (pucat), keradangan mata (konjunktivitis), kehilangan selera makan, perubahan gigi, masalah pencernaan, murid yang dilebar, sakit perut, kesukaran buang air kecil (*micturition*), kejang otot, perubahan suara, geli gatal (*hives*), ruam, kesukaran bernafas dan lain lain

Guaiphenesin boleh diterima dengan baik dan selamat. Walau bagaimanapun, ia boleh menyebabkan rasa mual,

muntah, pening, sakit kepala, geli gatal (*hives*) dan gatal-gatal kulit.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers* → *Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan *Salmol Expectorant*

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan dibawah suhu 30°C.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Jernih, tidak berwarna dengan air perasa mentol.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Salbutamol, Guaiphenesin

- Bahan tidak aktif
Purified water, Citric acid monohydrate, Sodium citrate dihydrate, saccharin sodium, Sucrose, Sorbital solution 70%, Menthol, Methylparaben, Propylparaben, Propylene glycol, dan Glycerin

- Nombor MAL:

MAL 19940426AZ

Pengilang

Biolab Co., Ltd.
625 Soi, 7A, Bangpoo Industrial Estate
Samutprakarn 10280 Thailand

Pemegang Pendaftaran Produk

Medispec (M) Sdn. Bhd.
B-1-07, Jalan SS 25/22,
Taman Mayang,
47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

Tarikh kemas kini RiMUP

29/05/2025

Nombor Siri:

NPRA(R4/1)260118/00027