

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan *Kop gel*
2. Bagaimana *Kop gel* berfungsi
3. Sebelum mengambil *Kop gel*
4. Cara menggunakan *Kop gel*
5. Semasa menggunakan *Kop gel*
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *Kop gel*
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan *Kop gel*

Ia digunakan untuk merawat bengkak, sakit, panas, kemerahan dan kekakuan pada sendi dan otot atau sakit dari kecederaan seperti kecederaan sukan, keseleo dan ketegangan

Bagaimana *Kop gel* berfungsi

Kop Gel mengandungi ubat yang dikenali sebagai *Ketoprofen*. Ini termasuk sekumpulan ubat-ubatan yang disebut 'Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs' (NSAID's). Ia berfungsi dengan menyekat beberapa bahan kimia dalam tubuh anda yang biasanya menyebabkan keradangan dan mengurangkan kesakitan.

Sebelum mengambil *Kop gel*

Bila tidak boleh mengambil

Jangan gunakan *Kop gel* jika anda:

- Alergi terhadap *ketoprofen* atau mana-mana bahan dalam ubat ini, *aspirin* atau NSAID lain
- Anda mempunyai atau dengan sejarah asma atau penyakit alergi
- Anda mempunyai alahan kulit yang dijangkiti atau kulit pecah.

Mengandung dan menyusukan anak

Jangan ambil *Kop gel* jika anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung.

Jangan ambil *Kop gel* jika anda sedang menyusukan anak. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

- Sebelum mula mengambil

Jangan gunakan *Kop gel* di bawah pakaian pembalutan.

Jangan dedahkan kulit kepada cahaya matahari atau cahaya UV selepas permohonan.

Jangan mengguna di kawasan dubur atau kelamin atau mata.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Interaksi dengan ubat lain jarang dengan gel topikal.

Cara menggunakan *Kop gel*

- Berapa banyak harus digunakan

Kegunaan pada Dewasa:

Sapukan dua kali sehari kepada kulit kawasan yang terjejas sehingga 7 hari. Sapu dengan perlahan dan urut dengan baik untuk memastikan penembusan gel. Jumlah dos tidak boleh melebihi 15g/sehari tanpa mengira bilangan kawasan yang terjejas. Jangan cairkan gel.

Kegunaan pada Kanak-kanak (bawah 15 tahun):

Tidak disarankan, disebabkan keselamatan kanak-kanak belum dibuktikan.

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebi dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Dos berlebihan adalah sangat jarang dengan penggunaan topikal. Walau bagaimanapun, jika secara tidak sengaja ditelan, boleh menyebabkan kesan sampingan bergantung kepada jumlah yang diambil.

Semasa menggunakan *Kop gel*

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan *Kop gel*

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi *Kop gel* dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Untuk kegunaan luar sahaja.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, *Kop gel* boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Kesan sampingan termasuk reaksi kulit seperti tindak balas fotosensitiviti, kegatalan, kemerahan dan eksima.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers* → *Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF)* or *Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan

Kop gel

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan dibawah suhu 30°C.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Gel yang telus dan jelas mempunyai bau minyak lavender.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Ketoprofen

- Bahan tidak aktif
Carbomer-940
Propyl Hydroxy benzoate
Ethanol 96%
Menthol
Triethanolamine
Purified water
Minyak Lavender

- Nombor MAL

MAL11060014AZ

Pengilang

SQUARE PHARMACEUTICALS PLC.
Square Road, Salgaria,
Pabna 6600, Bangladesh

Pemegang Pendaftaran Produk

Medispec (M) Sdn Bhd
B-1-07, Jalan SS 25/22,
Taman Mayang,
47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

5/8/2024

Nombor Siri

NPRA(R4/1)240818/00250