

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan *Hepuri*
2. Bagaimana *Hepuri* berfungsi
3. Sebelum mengambil *Hepuri*
4. Cara menggunakan *Hepuri*
5. Semasa menggunakan *Hepuri*
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *Hepuri*
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan *Hepuri* Entecavir

digunakan untuk merawat virus hepatitis B (HBV) kronik pada orang dewasa dengan penyakit hati kompensasi atau dekompensasi atau dengan penyakit kombinasi HIV/HBV yang telah mendapat rawatan *lamivudine* sebelum ini.

Bagaimana *Hepuri* berfungsi

Entecavir adalah ubat antiviral. *Entecavir* menghalang sel-sel virus tertentu daripada mendarab dalam badan anda

Sebelum mengambil *Hepuri*

- Bila tidak boleh mengambil

Anda tidak boleh mengambil ubat ini jika anda alahan kepada *entecavir*, atau bahan-bahan lain dalam *Hepuri*.

Mengandung dan menyusukan anak

Jangan ambil *Hepuri* jika anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung.

Jangan ambil *Hepuri* jika anda sedang menyusukan anak. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

- Sebelum mula mengambil

Sebelum mengambil *entecavir*, beritahu doktor anda jika:

- Anda mempunyai penyakit hati
- Anda mempunyai penyakit buah pinggang
- Anda mempunyai HIV atau AIDS
- Anda mempunyai pemindahan hati
- Anda dijangkiti hepatitis C atau D
- Anda intoleransi dengan laktosa

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Sebelum mengambil *entecavir*, beritahu doktor anda jika anda menggunakan mana-mana ubat berikut:

- *Lamivudine*
- *Adivovir dipivoxil*
- *Enofovir disoproxil*

Cara menggunakan *Hepuri*

- Berapa banyak harus digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Penyakit hati kompensasi

Pesakit naif nucleoside: 0.5mg sekali sehari.

Pesakit refraktori Lamivudine: 1mg sekali sehari diambil masa perut kosong

Penyakit hati dekompensasi

1mg sekali sehari diambil masa perut kosong

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda

untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Gejala berlebihan dos belum diketahui lagi.

Semasa menggunakan *Hepuri*

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan *Hepuri*.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi *Hepuri* dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera
Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, *Hepuri* boleh menyebabkan kesan sampingan,

walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Kesan sampingan yang biasa termasuk kesukaran tidur, sakit kepala, pening, mengantuk, muntah, cirit-birit, mual, senak, meningkatkan enzim hati, dan keletihan.

Kesan sampingan yang lain termasuk ruam, keguguran rambut, dan tindak balas *anaphylactoid*

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

*Lactose (Spray dried),
Microcrystalline cellulose,
Crospovidone, Magnesium stearate,
Hydroxypropyl Methlcellulose,
Polyethylene glycol 4000, Talc,
Titanium dioxide*

- Nombor MAL
MAL18116080AZ

Pengilang

Standard Chem. & Pharm. Co., Ltd., 2nd plant
No. 154, Kaiyuan Road, Sinying District
Tainan City 73055, Taiwan

Pemegang Pendaftaran Produk

Medispec (M) Sdn Bhd.
55 & 57, Lorong Sempadan 2,
11400 Ayer Itam, Penang,
Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

16/12/2021

Cara penyimpanan dan pelupusan

Hepuri

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan dibawah suhu 30°C.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet putih; filem bersalut, tablet berbentuk segi tiga, berjenama "948" di satu permukaan dan "STD" di permukaan yang lain.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Entecavir 0.5mg

- Bahan tidak aktif