

## Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan *Cilosol 100*
2. Bagaimana *Cilosol 100* berfungsi
3. Sebelum mengambil *Cilosol 100*
4. Cara menggunakan *Cilosol 100*
5. Semasa menggunakan *Cilosol 100*
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *Cilosol 100*
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

## Apakah kegunaan *Cilosol 100*

*Cilosol 100* digunakan untuk merawat klaudikasi intermiten (sejenis sakit kaki yang mempunyai ciri tersendiri). Ia biasanya disebabkan oleh urat darah tersekat yang mencegah otot betis mendapat bekalan oksigen yang mencukupi. Kesakitan otot atau kaki kejang berlaku apabila anda sedang berjalan tetapi sakitnya hilang apabila anda berehat. *Cilosol 100* hanya berkesan sekiranya nekrosis tisu periferi (sel mati) tidak berlaku.

Ia juga digunakan untuk mencegah infarksi serebrum (kurang bekalan oksigen ke tisu otak) daripada berulang, tidak termasuk embolisme serebrum kardiogenik (sumbatan dalam arteri otak oleh plak atau bekuan darah yang berasal daripada jantung).

## Bagaimana *Cilosol 100* berfungsi

*Cilosol 100* merencat agregasi platelet pada manusia lalu merencat pembentukan bekuan darah atau plak yang menyebabkan penyumbatan salur darah.

*Cilosol 100* meningkatkan aliran darah dalam pergelangan kaki yang tersumbat, anggota bawah dan otak dengan mengembangkan salur darah dan oleh itu meningkatkan peredaran darah.

## Sebelum mengambil *Cilosol 100*

### - Bila tidak boleh mengambil

Anda tidak boleh mengambil *Cilosol 100* jika:

- Anda alergic (hipersensitif) kepada *Cilostazol* atau bahan-bahan lain dalam *Cilosol 100*
- Anda mengalami kegagalan jantung kongestif dalam apa-apa keterukan
- Anda mempunyai pendarahan patologi yang aktif seperti perdarahan ulser perut dan pendarahan intrakranium (perdarahan dalam otak)
- Jika anda mengalami kesakitan dada berterusan semasa berehat, atau mempunyai "serangan jantung" atau sebarang pembedahan jantung dalam tempoh enam bulan yang lalu.
- Anda mempunyai penyakit buah pinggang yang teruk.
- Anda mempunyai penyakit hati yang sederhana atau teruk.
- Anda mengandung.

### Mengandung dan menyusukan anak

Sekiranya anda mengandung, fikir anda mungkin mengandung, atau jika anda sedang menyusukan anak, tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat sebelum mengambil apa-apa ubat.

### - Sebelum mula mengambil

Semak dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil ubat anda jika:

- Anda alah kepada *Cilostazol*, apa-apa ubat lain, atau mana-mana bahan dalam *Cilosol 100*.
- Anda mempunyai pendarahan ulser, pendarahan di otak, pendarahan dari mana-mana bahagian tubuh anda, jumlah platelet yang rendah dalam darah anda, atau keadaan lain yang menyebabkan pendarahan yang teruk.
- Anda mengalami atau mengalami sebarang masalah jantung.
- Anda mengalami atau mengalami gangguan buah pinggang yang teruk.
- Jika anda mengandung, merancang untuk mengandung, atau menyusukan anak.

### - Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil apa-apa ubat yang ditetapkan atau tidak preskripsi, terutamanya:

- Agen antiplatelet atau antikoagulan yang lain (seperti asid asetilsalisilik, *clopidogrel*, *heparin*, *warfarin*, *dabigatran*, *rivaroxaban* atau *apixaban*) yang boleh meningkatkan risiko perdarahan.
- *Erythromycin*, *Clarithromycin* atau *Rifampicin* (antibiotik)
- *Ketoconazole* (untuk merawat jangkitan kulat)
- *Omeprazole* (untuk merawat lebihan asid di dalam perut)
- *Diltiazem* (untuk merawat tekanan darah tinggi atau sakit dada)
- *Cisapride* (untuk merawat gangguan perut)
- *Lovastatin*, *Simvastatin* atau *Atorvastatin* (untuk merawat kolesterol tinggi dalam darah)
- *Halofantrine* (untuk merawat malaria)
- *Pimozide* (untuk merawat penyakit mental)
- Ergot derivatif (untuk merawat migrain, seperti *Ergotamine*, *Dihydroergotamine*)
- *Carbamazepine* atau *Phenytoin* (untuk merawat sawan)
- *St. John's Wort* (ubat herba)

## Cara menggunakan *Cilosol 100*

### - Berapa banyak harus digunakan

Sentiasa ambil *Cilosol 100* seperti yang telah diberitahu oleh doktor anda. Anda perlu menyemak dengan doktor atau ahli farmasi jika anda tidak pasti.

Dos *Cilosol* yang disyorkan ialah 100mg dua kali sehari, diambil sekurang-kurangnya setengah jam sebelum atau dua jam selepas sarapan dan makan malam. Dos 50mg mungkin diberi oleh doktor jika anda sedang mengambil beberapa ubat pada masa serentak.

### - Bila perlu digunakan

*Cilosol 100* hendaklah diambil dua kali sehari sekurang-kurangnya setengah jam sebelum atau dua jam selepas sarapan dan makan malam.

**- Berapa lama perlu digunakan**

Anda mungkin mula merasai tindak balas seawal 2 hingga 4 minggu selepas terapi dimulakan, tetapi rawatan sehingga 12 minggu mungkin diperlukan sebelum kesan yang bermanfaat dialami.

Doktor mungkin akan menilai anda semula selepas 3 bulan rawatan untuk menentukan sama ada *Cilosol 100* perlu dihentikan jika kesan yang diinginkan tidak tercapai.

**- Jika terlupa menggunakan**

Jika anda terlupa mengambil satu dos, ambil sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah terlalu hampir dengan masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang terlepas dan teruskan dengan jadual dos seperti biasa. Anda tidak boleh mengambil dua dos pada satu masa.

**- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)**

Jika anda atau sesiapa terlebih ambil *Cilosol 100*, sila pergi ke hospital terdekat untuk rawatan kerana anda mungkin memerlukan perubatan. Tanda dan simptom akut akibat terlebih dos adalah seperti berikut: sakit kepala yang teruk, cirit-birit, hipotensi (tekanan darah rendah) takikardia (denyutan jantung cepat yang tidak normal), dan kemungkinan kardiak aritmia (denyutan jantung yang tidak tetap).

**Semasa menggunakan Cilosol 100**

**- Perkara yang perlu dilakukan**

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

**- Perkara yang tidak boleh dilakukan**

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doctor anda.

Jangan berkongsi *Cilosol 100* dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai

simptom atau penyakit yang sama seperti anda.

**- Perkara yang perlu diberi perhatian**

**Memandu dan menggunakan jentera**

Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

**Kesan-kesan sampingan**

Seperti ubat-ubatan lain, *Cilosol 100* boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Jika mana-mana kesan sampingan berikut berlaku, anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera. Berhenti mengambil *Cilosol 100* dan hubungi doktor atau pergi ke hospital terdekat dengan segera:

- Strok
- Serangan jantung
- Masalah jantung yang boleh menyebabkan sesak nafas atau pergelangan buku lali kaki bengkak
- Degupan jantung yang tidak teratur (baru atau lebih teruk)
- Pendarahan yang ketara
- Mudah lebam
- Penyakit serius dengan lepuh kulit, mulut, mata dan alat kelamin
- Kekuningan pada kulit atau putih mata yang disebabkan oleh masalah hati atau darah (penyakit kuning)

Kesan sampingan berikut telah dilaporkan untuk *Cilosol 100*:

**Kesan sampingan yang biasa:**

Sakit kepala, najis yang tidak normal, cirit-birit

**Kesan sampingan biasa:**

Denyutan jantung cepat, jantung berdebar, sakit dada, pening kepala, sakit tekak, hidung berair (*rhinitis*), sakit perut, ketidakselesaan perut (pencernaan), perasaan atau sedamg sakit

(mual atau muntah), hilang selera makan (anoreksia), sendawa berlebihan atau angin (perut kembung), bengkak pergelangan kaki, kaki atau muka, ruam atau perubahan rupa kulit, kulit gatal, pendarahan pada kulit, kelemahan umum.

**Kesan sampingan yang luar biasa:**

Serangan jantung, degupan jantung yang tidak teratur (baru atau lebih teruk), masalah jantung yang boleh menyebabkan sesak nafas atau pembengkakan pergelangan kaki, radang paru-paru, batuk, menggigil, pendarahan yang tidak dijangka, kecenderungan berdarah, (seperti perut, mata atau otot, darah di dalam ludah atau air kencing), menurunkan sel darah merah, pening kepala semasa berdiri, pengsan, keresahan, kesukaran tidur, tindak balas alahan, sakit-sakit badan, kencing manis dan peningkatan gula darah, sakit perut (*gastritis*), kelesuan.

**Kesan sampingan yang jarang berlaku:**

Kecenderungan untuk berdarah lebih lama daripada biasa, peningkatan platelet dalam darah, masalah dengan buah pinggang.

**Kesan sampingan yang tidak diketahui:**

Perubahan dalam tekanan darah, penurunan sel-sel merah, sel-sel putih dan platelet dalam darah anda, kesukaran bernafas, kesukaran bergerak, demam, keletihan panas, ekzema dan ruam kulit yang lain, mengurangkan sensasi kulit, mata berair atau melekit (konjungtivitis), berdering di telinga (*tinnitus*), masalah hati termasuk *hepatitis*, perubahan dalam air kencing

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835490, atau laman web [npra.gov.my](http://npra.gov.my) [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

**Cara penyimpanan dan pelupusan Cilosol 100**

**- Penyimpanan**

Jauhi ubat daripada kanak-kanak.

Simpan dibawah suhu 30 °C.

---

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

**Maklumat lanjut**

- Rupa dan warna produk

Putih, bulat, muka rata, tablet *bevelled edge* terukir dengan 100 pada satu sisi dan kosong di sisi yang lain

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

*Cilostazol*

- Bahan tidak aktif

*Microcrystalline cellulose (Avicel PH 101), Corn starch, Croscarmellose sodium, Crospovidone (Crospovidone XL-10), Sodium lauryl sulfate, Povidone (PVP K-30), Purified water, Colloidal silicon dioxide (Aerosil 200) dan Magnesium stearate*

- Nombor MAL

**Pengilang**

UNISON LABORATORIES CO., LTD.  
39 Moo 4, Klong Udomcholjorn, Muang  
Chachoengsao, Chachoengsao 24000  
Thailand

**Pemegang Pendaftaran Produk**

Medispec (M) Sdn Bhd  
No. 55 & 57, Lorong Sempadan 2 (Off  
Boundary Road), 11400 Ayer Itam,  
Penang, Malaysia

**Tarikh kemaskini RiMUP**

05/07/2019

**Nombor Siri**

NPRA (R2) 19/114