

FEBUTON FILM COATED TABLET 80MG

Febuxostat (80mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan *Febuton*
2. Bagaimana *Febuton* berfungsi
3. Sebelum mengambil *Febuton*
4. Cara menggunakan *Febuton*
5. Semasa menggunakan *Febuton*
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *Febuton*
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan *Febuton*

Rawatan asid urik berlebihan dalam badan di mana pemendapan urat telah berlaku (termasuk sejarah, atau kehadiran, *tophus* dan/atau *gouty arthritis*). *Febuton* digunakan untuk orang dewasa.

Bagaimana *Febuton* berfungsi

Febuton berfungsi dengan mengurangkan tahap asid urik. Mengekalkan tahap asid urik rendah dengan mengambil *Febuton* sekali setiap hari menghentikan kristal membina, dan dari masa ke masa ia mengurangkan gejala. Mengekalkan paras asid urik yang cukup rendah untuk tempoh yang cukup lama juga boleh mengecut tophi.

Sebelum mengambil *Febuton*

- Bila tidak boleh mengambil

Jangan ambil *Febuton*:

Jika anda alah kepada febuxostat atau mana-mana bahan lain ubat ini.

Jika anda berumur di bawah 18 tahun.

Mengandung dan menyusukan anak

Jangan ambil *Febuton* jika anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung.

Jangan ambil *Febuton* jika anda sedang menyusukan anak. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

- Sebelum mula mengambil

Berbincang dengan doktor anda sebelum mengambil *Febuton*:

- Sekiranya anda mempunyai atau pernah mengalami kegagalan fungsi jantung atau masalah jantung
- Sekiranya anda mempunyai atau pernah mempunyai penyakit buah pinggang dan/atau tindak balas alergi yang serius terhadap *Allopurinol* (ubat yang digunakan untuk merawat *Gout*)
- Sekiranya anda mempunyai atau pernah mempunyai penyakit hati atau keabnormalan ujian fungsi hati
- Jika anda sedang dirawat untuk tahap asid urik yang tinggi sebab akibat daripada sindrom *Lesch-Nyhan* (keadaan yang jarang diwarisi di mana terdapat terlalu banyak asid urik dalam darah)
- Sekiranya anda mengalami masalah tiroid.
- Jika anda pernah menerima pemindahan organ.
- Sekiranya anda tidak bertoleransi terhadap laktosa

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Sangat penting untuk memberitahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil ubat-ubatan yang mengandungi bahan-bahan berikut kerana ia mungkin berinteraksi dengan *Febuton* dan doktor anda mungkin akan mempertimbangkan langkah-langkah yang perlu:

- *Mercaptopurine* (digunakan untuk merawat kanser)
- *Azathioprine* (digunakan untuk mengurangkan tindak balas imun)

Cara menggunakan *Febuton*

- Berapa banyak harus digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan *Febuton*

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan *Febuton*.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi *Febuton* dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian
Memandu dan menggunakan jentera
Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, *Febuton* boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Kesan sampingan yang biasa termasuk:

- keadaan gout
- Sakit kepala
- Cirit-birit, mual
- Fungsi hati yang tidak normal
- Ruam
- Bengkak tempatan disebabkan pengedaran cecair dalam tisu (*oedema*)

Kesan sampingan yang luar biasa:

- Kurang selera makan, kencing manis, peningkatan tahap lemak darah, peningkatan berat badan
- kehilangan pemacu seks, kesukaran tidur
- pening, rasa kebas, rasa kesemutan sensasi megurang atau berubah, mengantuk
- Meningkatkan tekanan darah, kemerahan muka atau leher
- ECG yang tidak normal, degupan jantung tidak teratur atau pesat
- batuk, sesak nafas, keradangan saluran hidung dan/atau tekak (jangkitan saluran pernafasan atas), bronkitis
- mulut kering, sakit perut/ketidakselesaan atau pedih ulu hati/senak, sembelit, lulus najis yang lebih kerap, muntah

- gatal-gatal, ruam, keradangan kulit, perubahan warna kulit
- Kekejangan otot, kelemahan otot, sakit otot/sendi, keradangan sendi, kekejangan otot
- darah di dalam air kencing, kencing yang tidak lazim yang kerap, ujian air kencing yang tidak normal (peningkatan tahap protein dalam air kencing), pengurangan keupayaan buah pinggang berfungsi dengan baik
- keletihan, sakit dada, ketidakselesaan dada
- perubahan dalam kimia darah atau jumlah sel darah atau platelet (keputusan ujian darah tidak normal)
- kesukaran ereksi

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan *Febuton*

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan dibawah suhu 30°C.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet bersalut berbentuk kapsul yang berwarna kuning ke kuning, terukir dengan "980" pada satu permukaan dan "S D" di sisi lain mempunyai garis pemisah antara S dan D.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Febuxostat 80mg
- Bahan tidak aktif
Microcrystalline Cellulose, Lactose, Magnesium Stearate,

Hydroxypropylmethyl Cellulose-L, Sodium Croscarmellose, Opadri 03B82459, Purified water

- Nombor MAL

MAL19056004AZ

Pengilang

STANDARD CHEM & PHARM CO., LTD.

6-20, Tuku, Tuku Village, Sinying District, Tainan City 73055, Taiwan

Pemegang Pendaftaran Produk

Medispec (M) Sdn Bhd
B-1-07, Jalan SS 25/22,
Taman Mayang,
47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

01/08/2024

Nombor Siri

NPRA(R2/1)240731/1315