

VIODIN® 5% W/W OINTMENT

Povidone-Iodine USP (5% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan *Viodin*®
2. Bagaimana *Viodin*® berfungsi
3. Sebelum mengambil *Viodin*®
4. Cara menggunakan *Viodin*®
5. Semasa menggunakan *Viodin*®
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *Viodin*®
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan *Viodin*®

Viodin® digunakan untuk rawatan jangkitan kulit bakteria dan mikrotik (kulat), katil kudis, dan ulser kaki, luka bakar yang ringan, luka dan melecet, dan herpes genital (penyakit kelamin).

Bagaimana *Viodin*® berfungsi

Povidone-Iodine 5% w/w adalah bahan aktif dalam *Viodin*® ointment. Ia beransur-ansur melepaskan iodine aktif yang berfungsi dengan cepat dan memusnahkan mikroorganisma seperti bakteria, kulat dan virus.

Sebelum mengambil *Viodin*®

- *Bila tidak boleh mengambil*
Jangan gunakan *Viodin*® jika:
 - Anda mempunyai alahan (hypersensitif) kepada *Povidone-Iodine* atau mana-mana bahan lain dari *Viodin*®
 - Anda dalam rawatan litium atau penyakit kelenjar tiroid
 - Anda adalah kanak-kanak di bawah umur dua tahun
- *Sebelum mula mengambil*
Anda mesti memberitahu doktor atau ahli farmasi anda jika:
 - Anda mempunyai alahan terhadap iodine
 - Anda mempunyai kelenjar tiroid yang diperbesar (benjolan di bahagian depan leher anda)
 - Anda mempunyai kekurangan buah pinggang yang sedia ada
 - Anda mengandung, merancang untuk mengandung atau menyusukan anak

Mengandung dan menyusukan anak

Jika anda tahu anda atau berfikir bahawa anda mungkin mengandung, atau sedang menyusukan bayi, tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat sebelum menggunakan *Viodin*® atau mana-mana ubat lain.

- *Jika mengambil ubat-ubat lain*

Selalu beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat-ubatan yang anda beli tanpa preskripsi.

Cara menggunakan *Viodin*®

Sentiasa menggunakan ubat ini seperti yang diberitahu oleh doktor. Anda perlu rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda tidak pasti.

Viodin® adalah untuk kegunaan luar sahaja. Elakkan sentuhan dengan mata.

- *Berapa banyak harus digunakan*

Digunakan sekali atau dua kali sehari, tetapi penggunaan berulang boleh dilakukan bergantung kepada sifat dan keterukan keadaan.

Bersihkan kawasan yang terjejas dan kemudian sapukan salap ke kulit.

- *Bila perlu digunakan*

Gunakan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda. Kawasan yang terjejas dan kulit di sekitarnya hendaklah dibersihkan dan dikeringkan dengan teliti sebelum menggunakan *Viodin*® ointment.

- *Berapa lama perlu digunakan*

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- *Jika terlupa menggunakan*

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan

dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- *Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)*

Menggunakan *Viodin*® yang berlebihan boleh menyebabkan kepekatan iodine yang tinggi dalam darah dan kesan pencernaan gastrousus (seperti muntah, cirit-birit dan sakit perut).

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda berfikir bahawa anda atau sesiapa lagi terambil dos berlebihan ubat ini.

Semasa menggunakan *Viodin*®

- *Perkara yang perlu dilakukan*

Elakkan penggunaan pada kawasan kulit koyak yang luas kerana penyerapan iodine yang berlebihan mungkin berlaku. Penyerapan iodine boleh mengganggu ujian-ujian fungsi tiroid.

Hentikan rawatan jika mengalami kerengsaan tempatan.

Hubungi doktor anda jika simptom anda melarat atau tidak menampakkan kemajuan.

- *Perkara yang tidak boleh dilakukan*

Jangan memberi *Viodin*® ointment kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom-simptom yang sama dengan keadaan anda. Doktor anda telah mempreskrib *Viodin*® untuk anda sahaja.

- *Perkara yang perlu diberi perhatian*

Jika tiada perubahan dalam keadaan anda, anda perlu hubungi doktor anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, *Viodin*® boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya. Kesan sampingan berikut mungkin terjadi dengan ubat ini:

- Kerengsaan tempatan
- Pembakaran kulit
- Sensitiviti kulit
- Reaksi alergi yang teruk (seperti ruam gatal, bengkak tekak atau lidah, sesak nafas, muntah, pening dan tekanan darah rendah)
- Goiter
- Gangguan tiroid (simptom termasuklah penurunan berat badan, peningkatan selera makan dan berpeluh, atau kekurangan tenaga dan berat badan)
- Kepekatan asid dan natrium yang tinggi dalam badan
- Kegagalan buah pinggang akut

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers* → *Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF)* or *Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan Viodin®

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan di bawah suhu 30°C. Melindungi dari cahaya.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Salap homogen coklat tua yang diisi dan dimeteraikan dalam tiub berlaminasi bercetak yang mempunyai cap warna putih.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Povidone-Iodine USP 5% w/w
- Bahan tidak aktif
Macrogol 4000 (PEG 4000),
Macrogol 400 (Polyethylene Glycol 400), Purified water

- Nombor MAL

MAL19126031XZ

Pengilang

Square Pharmaceuticals PLC.
Square Road, Salgaria,
Pabna,6600, BANGLADESH

® Registered Trade Mark

Pemegang Pendaftaran Produk

Medispec (M) Sdn Bhd
B-1-07, Jalan SS 25/22,
Taman Mayang,
47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

17/03/2025

Nombor Siri

NPRA (R2/1) 250314/1435