

MUCOSTOP 600mg Effervescent Tablet

Acetylcysteine (600 mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan MUCOSTOP
2. Bagaimana MUCOSTOP berfungsi
3. Sebelum mengambil MUCOSTOP
4. Cara menggunakan MUCOSTOP
5. Semasa menggunakan MUCOSTOP
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan MUCOSTOP
8. Deskripsi produk
9. Maklumat lanjut pengilang dan pemegang pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini

Apakah kegunaan MUCOSTOP

MUCOSTOP digunakan untuk rawatan penyakit pernafasan yang dicirikan oleh banyak rembesan yang tebal yang susah dikeluarkan seperti akut dan kronik *bronchitis* (keradangan saluran pernafasan yang membawa udara ke paru-paru), keradangan tekak, *sinus* dan trakea, jangkitan selsema, lelah dan *mucoviscodosis* (pengeluaran mukus yang tidak normal dalam paru-paru).

Bagaimana MUCOSTOP berfungsi

Acetylcysteine mempunyai aktiviti *fluidification* yang kuat terhadap rembesan mukus dan nanah. Ia bertindak dengan mengurangkan keradangan dan meningkatkan kelajuan pertumbuhan semula mukosa.

Sebelum mengambil MUCOSTOP

- Bila tidak boleh mengambil

JANGAN MENGGUNAKAN MUCOSTOP dalam situasi berikut:

- Jika anda mempunyai alahan terhadap MUCOSTOP atau mana-mana bahan lain dalam MUCOSTOP
- Dalam kanak-kanak di bawah dua (2) tahun
- Jika anda mempunyai *phenylketonuria*
- Jika anda mempunyai ulser perut yang aktif.

- Mengandung dan menyusukan anak

- Kategori kehamilan B.
- Tidak diketahui sama ada *acetylcysteine* diedarkan ke dalam susu.

- Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk nasihat sebelum mengambil sebarang ubat.

- Sebelum anda mula menggunakannya

Beritahu doktor anda jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk apa-apa yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan. Beritahu doktor anda juga jika anda mempunyai penyakit lelah.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk apa-apa ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan MUCOSTOP

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa:

1 effervescent tablet satu kali sehari (sebaik-baiknya pada waktu malam)

- Bila perlu digunakan

Larutkan dalam air sebelum minum.

- Berapa lama perlu digunakan

- Jangan melebihi dos yang disyorkan.
- Doktor anda mungkin mengesyorkan dos yang lebih tinggi atau lebih rendah, bergantung kepada tindak balas terhadap rawatan.
- Jangan ubah dos atau berhenti rawatan sebelum berbincang dengan doktor anda.

Cara dan kaedah pengambilan:

- MUCOSTOP hanya digunakan secara oral.
- Selepas makan, larutkan tablet effervescent dalam segelas air dan minum segera. Effervescent tablet tidak boleh dikunyah dan tidak boleh ditelan.

- Jika terlupa menggunakan

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda apa yang harus anda lakukan jika anda terlupa untuk menggunakannya.

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda ingat. Biarkan sahaja dos yang terlepas jika ia hampir masa untuk dos yang dijadualkan berikutnya. Jangan mengambil ubat lebih daripada yang diarahkan oleh doktor

- Jika mengambil berlebihan (lebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anda rasa anda atau sesiapa sahaja mungkin telah mengambil terlalu banyak ubat ini. Tindakan ini harus diambil walaupun tiada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera.

Pengambilan tablet yang terlalu banyak boleh menyebabkan loya, muntah-muntah dan cirit-birit.

Semasa anda menggunakannya

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda seperti mana yang diberitahu oleh doktor anda

Beritahu doctor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda mengambil MUCOSTOP.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa mengambil ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat kecuali dinasihatkan oleh doktor anda.

Jangan mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor anda.

Jangan berikan MUCOSTOP kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom yang sama atau keadaan seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

- Jika anda mempunyai masalah gastrik, MUCOSTOP perlu diberikan selepas makan.
- Jika anda lelah, sila beritahu doktor anda sebelum meneruskan pengambilan produk ini.

- Lebih baik jangan campur ubat lain dengan larutan *MUCOSTOP*.

Memandu dan menggunakan mesin

MUCOSTOP belum dilaporkan mempunyai apa-apa kesan sampingan terhadap penggunaan kenderaan dan mesin.

Kesan sampingan

Seperti semua ubat, ia mungkin ada kesan sampingan pada orang yang sensitif terhadap bahan-bahan yang terkandung dalam *MUCOSTOP*.

MUCOSTOP boleh menyebabkan alahan teruk dan tindak balas kulit yang serius. Berhenti menggunakan *MUCOSTOP* dan mendapatkan bantuan perubatan dengan segera jika anda mengalami sebarang gejala berikut:

- Alahan teruk: kesukaran bernafas, pening kepala, pembengkakan kulit atau ruam.
- Reaksi kulit yang teruk: kulit merah, lepuh, ruam, demam, sakit tekak atau kerengsaan mata.

Kesan sampingan lain yang dilaporkan dengan *acetylcysteine* termasuk loya, muntah-muntah, demam, kehilangan kesedaran sementara, berpeluh, sakit sendi, penglihatan kabur, gangguan fungsi hati.

Sila jumpa dengan doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas mengambil ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835490, atau laman web npra.gov.my [*Consumers* → *Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan *MUCOSTOP*

- Penyimpanan

Simpan *MUCOSTOP* di tempat yang tidak dapat dilihat dan dicapai oleh kanak-kanak, dan dalam pembungkusan mereka.

Simpan pada suhu bilik di bawah 30°C dan tempat kering.

Jangan lupa menutup penutup tiub selepas setiap penggunaan. Jangan tinggalkan penutup tiub terbuka.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi cara-cara untuk melupuskan ubat-ubatan yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu untuk melindungi alam sekitar.

Deskripsi Produk

- Rupa dan warna produk

Tablet yang putih, bulat dan muka rata. Warna larutan sepatutnya jernih selepas tablet dilarutkan dalam air.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif:

Acetylcysteine

- Bahan tidak aktif:

Micronized monosodium citrate, sodium hydrogen carbonate, aspartame, polyvinylpyrrolidone, sodium chloride dan lemon flavor

- No. MAL:

Pengilang

Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.

1. OSB 1. Yol No: 3

Adpazarı / SAKARYA / TURKEY

Pemegang Pendaftaran Produk

MEDISPEC (M) SDN BHD

55 & 57, Lorong Sempadan 2,

(Off Boundary Road)

11400 Ayer Itam, Penang,

Malaysia

Tarikh kemas kini RiMUP

14/10/2019

Nombor Siri

NPRA (R2) 19/156