

Etoxib F.C. Tablet 60mg

Etoricoxib 60mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan *Etoxib*
2. Bagaimana *Etoxib* berfungsi
3. Sebelum mengambil *Etoxib*
4. Cara menggunakan *Etoxib*
5. Semasa menggunakan *Etoxib*
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *Etoxib*
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan *Etoxib*

- rawatan akut dan kronik bagi tanda-tanda dan gejala osteoarthritis dan rheumatoid arthritis
- pengurusan *ankylosing spondylitis*
- sakit pinggang kronik (30mg dan 60mg sahaja)
- melegakan kesakitan akut
- untuk merawat arthritis gout akut

Bagaimana *Etoxib* berfungsi

Etoxib mengurangkan kesakitan dan keradangan dengan menghambat *COX-2*, enzim dalam badan.

Etoxib tidak menghambat *COX-1*, enzim yang terlibat dalam melindungi perut daripada ulser.

Sebelum mengambil *Etoxib*

- Bila tidak boleh mengambil

- anda mempunyai alahan terhadap *Etoxib* atau mana-mana bahan kandungan lain ubat ini ((lihat Maklumat Lanjut di akhir risalah ini).
- bungkusannya koyak atau menunjukkan tanda-tanda perubahan tarikh luput pada bungkusannya telah berlalu.
- Sekiranya anda mengambil ubat ini selepas tarikh luput, ia mungkin tidak akan berfungsi.
- Anda pernah mengalami kegagalan jantung, serangan jantung, pembedahan pintasan, sakit dada, arteri sempit atau tersumbat di hujung kaki (penyakit arteri perifer), strok atau strok ringan (*TIA* atau serangan iskemia sementara).

- Anda mempunyai tekanan darah tinggi yang tidak terkawal dengan baik pada ubat tekanan darah.
- Anda menjalani pembedahan besar dan boleh meningkatkan risiko penyakit arteri koronari atau aterosklerosis seperti tekanan darah tinggi, penyakit kencing manis, kolesterol tinggi atau merokok.
- Anda menjalani pembedahan besar pada jantung atau arteri.
- Anda hamil atau menyusukan anak

Mengandung dan menyusukan anak

Jangan ambil *Etoxib* jika anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung.

Jangan ambil *Etoxib* jika anda sedang menyusukan anak. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

- Sebelum mula mengambil

Memberitahu doktor jika anda:

- Anda hamil atau merancang untuk hamil. *Etoxib* tidak boleh digunakan semasa kehamilan.
- anda menyusukan anak atau merancang untuk menyusukan anak. Ia tidak diketahui jika *Etoxib* masuk ke dalam susu ibu. Jangan mengambil *Etoxib* jika anda menyusukan anak.
- anda sedang mengalami atau pernah mengalami sebarang masalah kesihatan, terutamanya yang berikut:
 - sejarah angina
 - serangan jantung atau arteri tersumbat di jantung anda
 - arteri sempit atau tersumbat di hujung kaki
 - penyakit buah pinggang
 - penyakit hati
 - kegagalan jantung
 - tekanan darah tinggi
- anda pernah mengalami reaksi alergi terhadap *aspirin* atau ubat-ubatan anti-radang lain (biasanya dikenali sebagai *NSAID*). Gejala tindak balas alahan termasuklah asma, bengkak gatal

kemerahan pada kulit (gatal-gatal), hidung berair atau tersumbat.

- Anda mempunyai jangkitan
Sekiranya anda mengambil *Etoxib* semasa anda mengalami jangkitan, ia mungkin menyembunyikan demam dan mungkin menyebabkan anda berfikir bahawa anda lebih baik atau jangkitan anda kurang serius daripada yang mungkin berlaku.
- anda mempunyai alahan terhadap ubat-ubatan lain atau bahan lain, seperti makanan, bahan pengawet atau pewarna.
- anda mempunyai sejarah strok atau strok mini
- anda mempunyai keadaan yang meningkatkan risiko penyakit arteri koronari atau aterosklerosis seperti tekanan darah tinggi, penyakit kencing manis, kolesterol tinggi atau merokok.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor anda jika anda sedang mengambil ubat lain, termasuk ubat yang anda beli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan anda.

Sesetengah ubat dan *Etoxib* mungkin boleh mengganggu satu sama lain

- *warfarin*, ubat yang digunakan untuk mencegah pembekuan darah
- *rifampin*, antibiotik yang digunakan untuk merawat batuk kering dan jangkitan lain
- pil air (diuretik)
- penghambat ACE dan penyekat reseptor angiotensin, ubat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi atau merawat kegagalan jantung
- *litium*, ubat yang digunakan untuk merawat jenis kemurungan tertentu
- ubat kawalan kelahiran
- terapi penggantian hormon
- *methotrexate*, ubat yang digunakan untuk menekan sistem imun

Cara menggunakan *Etoxib*

- Berapa banyak harus digunakan

Ambil *Etoxib* hanya apabila ditetapkan oleh doktor anda.

Untuk osteoarthritis, dos yang disyorkan adalah 30 mg atau 60 mg sekali sehari.

Untuk rheumatoid arthritis, dos yang disyorkan adalah 60 mg sekali sehari, dan boleh dinaikkan ke 90 mg sekali sehari jika diperlukan.

Untuk *ankylosing spondylitis*, dos yang disyorkan adalah 60 mg sekali sehari, dan boleh dinaikkan ke 90 mg sekali sehari jika diperlukan.

Untuk sakit pinggang kronik, dos yang disyorkan ialah 60mg sekali sehari.

Untuk melegakan serangan gout, dos yang disyorkan adalah 120 mg sekali sehari, yang hanya boleh digunakan untuk tempoh sakit akut.

Dos yang lebih besar daripada yang disyorkan untuk setiap keadaan sama ada tidak menunjukkan keberkesanan tambahan atau belum dikaji. Oleh itu, dos harian yang dinyatakan di atas untuk setiap keadaan tidak boleh dilebihi.

Sekiranya anda mempunyai penyakit hati yang ringan, anda tidak boleh mengambil lebih daripada 60 mg sehari. Sekiranya anda mempunyai penyakit hati yang sederhana, anda tidak boleh mengambil lebih daripada 60 mg setiap hari.

Ikuti semua arahan yang diberikan oleh doktor anda dengan berhati-hati. Mereka mungkin berbeza dengan maklumat yang terkandung dalam risalah ini.

Sekiranya anda tidak memahami arahan pada kotak, sila minta bantuan doktor atau ahli farmasi anda. *Etoxic* adalah dalam bentuk tablet.

Semasa mengambil tablet, telan dengan segelas air.

Ambil *Etoxic* anda pada masa yang hampir sama setiap hari.

Mengambil *Etoxic* pada masa yang sama setiap hari akan memberi kesan terbaik. Ini juga akan membantu anda mengingatkan bila harus mengambil dos.

Ia tidak kira jika anda mengambil *Etoxic* sebelum atau selepas makan.

Jangan gunakan *Etoxic* lebih lama daripada yang diberitahu oleh doktor anda.

- *Bila perlu digunakan*

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- *Berapa lama perlu digunakan*

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- *Jika terlupa menggunakan*

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- *Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)*

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Pengambilan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan masalah perut atau ginjal.

Semasa menggunakan *Etoxic*

- *Perkara yang perlu dilakukan*

Sekiranya anda hamil semasa mengambil *Etoxic*, beritahu doktor anda dengan segera.

Sekiranya anda mendapat jangkitan semasa mengambil *Etoxic*, beritahu doktor anda. *Etoxic* mungkin akan menyembunyikan demam dan mungkin menyebabkan anda berfikir bahawa anda lebih baik atau jangkitan

anda kurang serius daripada yang mungkin berlaku.

Sekiranya anda akan memulakan penggunaan ubat baru, beritahu doktor dan ahli farmasi anda bahawa anda mengambil *Etoxic*.

Jangan berikan *Etoxic* kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai keadaan yang sama seperti anda.

Beberapa langkah pertolongan diri yang disarankan di bawah boleh membantu keadaan anda. Memberitahu doktor atau ahli farmasi anda mengenai langkah-langkah ini dan untuk maklumat lebih lanjut.

- Bersenam- senaman yang kerap dapat membantu mengurangkan kesakitan dan kehilangan upaya disebabkan oleh osteoarthritis dengan meningkatkan kekuatan otot dan mengurangkan beban pada sendi, tetapi ia tidak boleh keterlaluan. Berjalan adalah senaman yang baik, namun, sebelum memulakan apa-apa senaman, tanyakan doktor anda mengenai jenis senaman terbaik untuk anda.
- Berat - doktor anda mungkin mencadangkan menurunkan berat badan untuk membantu mengurangkan ketegangan pada sendi anda. Seseorang mungkin memerlukan bantuan pakar diet untuk menurunkan berat badan.
- Rawatan panas dan sejuk.
- Menggunakan peranti sokongan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

- *Perkara yang tidak boleh dilakukan*

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi *Etoxic* dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera

Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, *Etoxib* boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Beritahu doktor anda jika anda mengetahui atau mengalami kesan sampingan berikut:

- berasa sakit (loya), muntah
- pedih ulu hati, senak, perasaan tidak selesa atau sakit di perut
- cirit-birit
- bengkak pada kaki atau pergelangan kaki
- tekanan darah tinggi
- pening
- sakit kepala

Selain itu, kesan sampingan berikut telah dilaporkan:

- reaksi alahan termasuk ruam dan gatal-gatal
- reaksi kulit yang teruk, yang mungkin berlaku tanpa amaran
- perubahan rasa
- nafas yang berdehit
- insomnia
- kegelisahan
- mengantuk
- ulser mulut
- cirit-birit
- peningkatan tekanan darah yang teruk
- kekeliruan
- halusinasi
- platelet menurun

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel., atau laman web npra.gov.my [Consumer → *Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan

Etoxib

- Penyimpanan

Jangan simpan melebihi 30°C.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Ia berlaku sebagai tablet bersalut filem yang berwarna hijau, berbentuk epal hijau dwicembung, bertanda "SCP" di satu sisi dan "978" di sisi lain.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Etoricoxib 60mg

- Bahan tidak aktif

Microcrystalline Cellulose, Hydroxypropylmethyl Cellulose, Purified Water, Dibasic Calcium Phosphate, Anhydrous, Croscarmellose Sodium, Magnesium Stearate, Triacetin, Lactose Monohydrate, Titanium Dioxide, Ferric Oxide Yellow, Indigo Carmine Aluminum Lake

- Nombor MAL

MAL22076022AZ

Pengilang

STANDARD CHEM. & PHARM. CO. Ltd.

No. 154, Kaiyuan Road, Sinying District, Tainan City 73055, Taiwan.

Pemegang Pendaftaran Produk

Medispec (M) Sdn Bhd

No. 55 & 57, Lorong Sempadan 2, (Off Boundary Road),
11400 Ayer Itam, Penang, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

22/02/2024

Nombor Siri

NPRA (R2) 21/062