

SOLIFEN FILM COATED TABLETS 5MG

Solifenacin Succinate (5mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan *SOLIFEN*
2. Bagaimana *SOLIFEN* berfungsi
3. Sebelum mengambil *SOLIFEN*
4. Cara menggunakan *SOLIFEN*
5. Semasa menggunakan *SOLIFEN*
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *SOLIFEN*
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan *SOLIFEN* dan bagaimana *SOLIFEN* berfungsi

SOLIFEN tergolong dalam kumpulan antikolinergik. Ubat-ubatan ini digunakan untuk mengurangkan aktiviti pundi kencing yang terlalu aktif. Gejala-gejala ini termasuk: mempunyai keinginan untuk kencing yang kuat secara tiba-tiba tanpa amaran sebelumnya, kerap membuang air kecil atau membasahi diri kerana tidak dapat sampai ke bilik mandi tepat pada masanya.

Sebelum mengambil *SOLIFEN*

- *Bila tidak boleh mengambil*
- Sekiranya anda tidak dapat mengosongkan pundi kencing anda sepenuhnya (penahan air kencing)
- Sekiranya anda mengalami keadaan perut atau usus yang teruk (termasuk megacolon toksik, komplikasi yang berkaitan dengan kolitis ulseratif)
- Sekiranya anda mempunyai otot penyakit *myasthenia gravis*, yang boleh menyebabkan kelemahan otot
- Sekiranya anda mengalami peningkatan tekanan di mata, dengan kehilangan penglihatan secara beransur-ansur (glaukoma)
- Sekiranya anda alah kepada solifenacin atau mana-mana bahan lain ubat ini
- Sekiranya anda menjalani dialisis buah pinggang
- Sekiranya anda menghidap penyakit hati yang teruk
- Sekiranya anda mempunyai penyakit buah pinggang yang teruk atau

sederhana dan pada masa yang sama dirawat dengan ubat yang mengurangkan penyingkiran Solifen dari badan (contohnya, ketokonazol). Doktor anda atau ahli farmasi akan memaklumkan anda sekiranya ini berlaku.

Maklumkan kepada doktor anda jika anda mempunyai keadaan yang dinyatakan sebelum rawatan dengan *SOLIFEN*.

Mengandung dan menyusukan anak

Jangan ambil *SOLIFEN* jika anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung.

Jangan ambil *SOLIFEN* jika anda sedang menyusukan anak. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

- *Jika mengambil ubat-ubat lain*

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Anda perlu memaklumkan kepada doktor anda jika anda sedang mengambil ubat-ubat berikut:

- Ubat antikolinergik lain, kesan sampingan kedua-dua ubat dapat ditingkatkan.
- Kolinergik kerana mereka dapat mengurangkan kesan Solifen
- Ubat seperti *metoclopramide* dan *cisparide* yang menjadikan sistem pencernaan berfungsi lebih cepat. *SOLIFEN* dapat mengurangkan kesannya.
- Ubat seperti *ketoconazole*, *ritonavir*, *nelfinavir*, *intraconazole*, *verapamil* dan *diltiazem*, yang mengurangkan kadar Solifen dicernakan oleh badan.
- Ubat seperti bifosfonat, yang boleh menyebabkan keradangan pada gullet (oesophagitis).

Cara menggunakan *SOLIFEN*

- *Berapa banyak harus digunakan*

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- *Bila perlu digunakan*

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- *Berapa lama perlu digunakan*

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- *Jika terlupa menggunakan*

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- *Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)*

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Pengambilan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan sakit kepala, mulut kering, pening, mengantuk dan penglihatan kabur, melihat perkara yang tidak ada di sana (halusinasi), teruja, sawan, kesukaran pernafasan, degupan jantung meningkat (takikardia), pengumpulan air kencing di pundi

<p>dan dilatasi anak mata (mydriasis).</p>	<p>Solifen boleh menyebabkan kesan sampingan berikut:</p>	<p><i>Pharmatose DCL 11 (Lactose Monohydrate), Avicel PH-102 (Microcrystalline Cellulose), Pregelatinized Starch, Magnesium Stearate.</i></p>
<p>Semasa menggunakan SOLIFEN - <u>Perkara yang perlu dilakukan</u></p>	<p><u>Sangat biasa</u> Mulut kering</p>	<p>Bahan pelapis filem: <i>Opadry White YS-1-7027</i></p>
<p>Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.</p>	<p><u>Biasa</u> Sembelit, loya, senak perut, sakit perut, penglihatan kabur.</p>	<p>- <u>Nombor MAL</u> MAL23036012AZ</p>
<p>Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan SOLIFEN.</p>	<p>Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.</p>	<p>Pengilang Getz Pharma (Pvt.) Limited, 29-30/27, Korangi Industrial Area, Karachi - 74900, Pakistan.</p>
<p>Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.</p>	<p>Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan <i>Adverse</i> Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [<i>Consumers</i> → <i>Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)</i>].</p>	<p>Pemegang Pendaftaran Produk Medispec (M) Sdn Bhd B-1-07, Jalan SS 25/22, Taman Mayang, 47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.</p>
<p><u>Mengambil SOLIFEN dengan makanan dan minuman</u> SOLIFEN boleh diambil dengan atau tanpa makanan, bergantung dengan pilihan anda.</p>	<p>Cara penyimpanan dan pelupusan SOLIFEN - <u>Penyimpanan</u></p>	<p>Tarikh kemaskini RiMUP 09/04/2025</p>
<p>- <u>Perkara yang tidak boleh dilakukan</u> Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.</p>	<p>Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.</p>	<p>Nombor Siri NPRA (R2) 21/187</p>
<p>Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.</p>	<p>Simpan di bawah suhu 30 °C.</p>	
<p>Jangan berkongsi SOLIFEN dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.</p>	<p>- <u>Pelupusan</u></p>	
<p>- <u>Perkara yang perlu diberi perhatian</u> <u>Memandu dan menggunakan jentera</u></p>	<p>Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.</p>	
<p>Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera, Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.</p>	<p>Maklumat lanjut - <u>Rupa dan warna produk</u> SOLIFEN TABLET 5MG</p>	
<p>Kesan-kesan sampingan</p>	<p>- Tablet putih, bujur, biconvex, dilapisi filem, garis dua bahagian di satu sisi dan timbul "GETZ" di sisi lain.</p>	
<p>Seperti ubat-ubatan lain, SOLIFEN boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.</p>	<p>- <u>Bahan-bahan kandungan</u> - Bahan aktif <i>Solifenacin succinate</i> - Bahan tidak aktif</p>	