

Belcid Forte Suspension

Belcid Forte Sachet (Oral Suspension)

Aluminum hydroxide/Magnesium hydroxide/Simethicone (306mg/110mg/30 mg per 5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan *Belcid Forte*
2. Bagaimana *Belcid Forte* berfungsi
3. Sebelum mengambil *Belcid Forte*
4. Cara menggunakan *Belcid Forte*
5. Semasa menggunakan *Belcid Forte*
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *Belcid Forte*
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan *Belcid Forte*

Sebagai *antacid* untuk melegakan simptom *hyperacidity* yang dikaitkan dengan diagnosis ulser peptik, gastritis, esophagitis peptik, *hyperacidity* gastrik, pedih ulu hati, atau hernia hiatal. Sebagai anti flatulen untuk mengurangkan simptom gas, termasuk sakit gas setelah operasi.

Bagaimana *Belcid Forte* berfungsi

Belcid Forte berfungsi dengan meningkatkan pH rembesan gastrik: Aluminium hidroksida atau oksida bertindak balas dengan asid hidroklorik untuk membentuk aluminium klorida dan air. Magnesium hidroksida bertindak balas cepat dengan asid hidroklorik untuk membentuk magnesium klorida dan air. *Simethicone* bertindak dengan membaurkan gelembung gas yang mengelilingi lendir dalam saluran GI dan mengusir mereka.

Sebelum mengambil *Belcid Forte*

- *Bila tidak boleh mengambil*
Pesakit yang hipersensitiviti kepada *simethicone* atau mana-mana bahan dalam ubat ini.

Mengandung dan menyusukan anak
Jangan ambil *Belcid Forte* jika anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung.

Jangan ambil *Belcid Forte* jika anda sedang menyusukan anak. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

- *Sebelum mula mengambil*
- Jangan mengambil ubat ini lebih lama daripada 2 minggu
- Jangan ambil ubat lain dalam masa 2 jam dari ubat ini
- *Jika mengambil ubat-ubat lain*
Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Belcid Forte boleh mengganggu ubat lain dengan:

- Pengurangan kesan ubat (contohnya *digoxin, phenytoin, chlorpromazine, isoniazid, chlorthalidone, indomethacin*, garam besi).
- Peningkatan kemungkinan keracunan atau kesan sampingan (contohnya *pseudoephedrine, levodopa*).
- Peningkatan bioavailabiliti (cth. *Tetracycline*)
- Menghalang ekskresi ubat (cth. *Quinidine, amphetamine*) dan meningkatkan ekskresi ubat (cth. *Salicylates*).

Cara menggunakan *Belcid Forte*

- *Berapa banyak harus digunakan*
Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Untuk orang dewasa dan kanak-kanak ≥ 12 tahun:

Belcid Forte Suspension: Ambil 1-3 sudu teh, 4 kali sehari antara waktu makan, pada waktu tidur.

Belcid Forte Sachet: Ambil 1 *sachet*, 4 kali sehari antara waktu makan, pada waktu tidur.

- *Bila perlu digunakan*
Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.
- *Berapa lama perlu digunakan*
Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh

doktor anda tetapi jangan mengambil ubat ini melebihi 2 minggu.

- *Jika terlupa menggunakan*
Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- *Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)*
Pengambilan berlebihan secara akut dengan *antacid* boleh menyebabkan cathartic osmotic, yang membawa kepada kehilangan cecair dan elektrolit. Hipermaagnesemia dan kemurungan system saraf pusat mungkin mengikuti pengambilan berlebihan *antacid* yang mengandungi *magnesium*.

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan *Belcid Forte*

- *Perkara yang perlu dilakukan*
Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan *Belcid Forte*

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan
Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi *Belcid Forte* dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian
Memandu dan menggunakan jentera
Secara umum, ubat ini tidak akan menjejaskan keupayaan anda untuk memandu atau menggunakan mesin. Walaubagaimanapun, jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, *Belcid Forte* boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Kesan sampingan yang paling biasa dengan pengambilan *antacid* yang berpanjangan adalah sembelit daripada *Aluminium* dan cirit-birit daripada *Magnesium*.

Tetapi, jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan *Belcid Forte*

- Penyimpanan
Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan dibawah suhu 30°C. Elakkan pembekuan.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk
Suspensi putih dengan rasa peppermint.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Aluminum hydroxide gel
Magnesium hydroxide
Simethicone

- Bahan tidak aktif

Belcid Forte Suspension:

Guar gum, Saccharin sodium, Sorbitol solution 70%, Propylparaben, Butylparaben, Propylene glycol, Peppermint oil, Purified Water

Belcid Forte Sachet:

Guar gum, Saccharin sodium, Sorbitol solution 70%, Propylparaben, Butylparaben, Propylene glycol, Peppermint oil, Purified Water, Glycerin

- Nombor MAL

Belcid Forte Suspension:

MAL19056125X

Belcid Forte Sachet:

MAL22046032X

Pengilang

Biolab Co., Ltd.
625 Bangpoo Industrial Estate,
Samutprakarn, Thailand.

Pemegang Pendaftaran Produk

Medispec (M) Sdn Bhd
B-1-07, Jalan SS 25/22,
Taman Mayang,
47301 Petaling Jaya, Selangor,
Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

28/08/2025

Nombor Siri

NPRA(R2)19/7