

RIVEIN 15MG and 20MG FILM-COATED TABLETS

Rivaroxaban 15mg and 20mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan *Rivein*
2. Bagaimana *Rivein* berfungsi
3. Sebelum mengambil *Rivein*
4. Cara menggunakan *Rivein*
5. Semasa menggunakan *Rivein*
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *Rivein*
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan *Rivein*

Rivein digunakan pada orang dewasa untuk:

- mencegah pembekuan darah dalam otak (strok) dan saluran darah lain dalam badan anda jika anda mempunyai bentuk irama jantung yang tidak teratur yang dipanggil fibrilasi atrium bukan injap.
- merawat pembekuan darah dalam urat kaki anda (trombosis vena dalam) dan dalam saluran darah paru-paru anda (embolisme pulmonari), dan untuk mengelakkan pembekuan darah daripada berulang dalam saluran darah kaki dan/atau paru-paru anda.

Rivein digunakan pada kanak-kanak dan remaja di bawah 18 tahun dan dengan berat badan 30 kg atau lebih untuk:

- merawat pembekuan darah dan mencegah berlakunya semula pembekuan darah dalam urat atau dalam saluran darah paru-paru, berikutan permulaan rawatan sekurang-kurangnya 5 hari dengan ubat suntikan yang digunakan untuk merawat pembekuan darah.

Bagaimana *Rivein* berfungsi

Rivein mengandungi bahan aktif rivaroxaban dan tergolong dalam kumpulan ubat yang dinamakan agen antitrombosis. Ia bertindak dengan menyekat faktor pembekuan darah (faktor Xa) dan dengan demikian mengurangkan kecenderungan pembentukan darah beku.

Sebelum mengambil *Rivein*

- *Bila tidak boleh mengambil*

Jangan mengambil *Rivein*

- jika anda alah kepada rivaroxaban atau mana-mana bahan lain dalam ubat ini
- jika anda mengalami pendarahan teruk
- jika anda menghidap penyakit atau mengalami masalah dalam sesuatu organ badan yang meningkatkan risiko pendarahan teruk (seperti *stomach ulcer*, kecederaan atau pendarahan dalam otak, baru menjalani pembedahan otak atau mata)
- jika anda mengambil ubat untuk mencegah pembekuan darah (seperti *warfarin*, *dabigatran*, *apixaban* atau *heparin*), kecuali apabila bertukar rawatan antikoagulan/antigumpal atau semasa mengambil *heparin* menerusi saluran vena atau arteri untuk mengekalkan keterbukaannya
- jika anda menghidap *liver disease* yang boleh meningkatkan risiko pendarahan
- jika anda mengandung atau menyusukan anak.

Jangan ambil *Rivein* dan beritahu doktor anda jika anda mengalami mana-mana keadaan ini.

- Sebelum mula menggunakan *Rivein*

Amaran dan peringatan

Bincangkan dengan doktor atau ahli fatmasi anda sebelum anda mengambil *Rivein*.

Berhati-hati dengan *Rivein*

- (1) Jika risiko anda mengalami pendarahan meningkat, seperti yang mungkin berlaku dalam keadaan seperti:
 - jika anda menghidap *severe kidney disease*, kerana fungsi buah pinggang anda boleh menjejaskan jumlah ubat yang bertindak dalam badan anda
 - jika anda mengambil ubat lain untuk mencegah pembekuan darah (seperti *warfarin*, *dabigatran*, *apixaban* atau *heparin*), kecuali apabila bertukar rawatan antikoagulan/antigumpal atau semasa mengambil *heparin* menerusi saluran vena atau arteri untuk mengekalkan keterbukaannya (lihat bahagian "Ubat lain dan *Rivein*")
 - *bleeding disorder*
 - tekanan darah terlalu tinggi, tidak dikawal oleh rawatan perubatan
 - penyakit dalam perut atau usus anda yang mungkin mengakibatkan pendarahan, seperti radang usus atau perut, atau radang esofagus

(kerongkong), seperti disebabkan *gastroesophageal reflux disease* (keadaan di mana asid perut naik ke atas dan masuk ke dalam esofagus)

- masalah pada saluran darah di belakang mata anda (*retinopathy*)
- penyakit paru-paru di mana bronkus anda berkembang dan bernanah (bronchiectasis), atau pernah mengalami pendarahan dari paru-paru anda

(2) Jika anda mempunyai injap jantung prostetik atau palsu

(3) Jika anda tahu bahawa anda mempunyai penyakit yang

disebut *antiphospholipid syndrome* (gangguan sistem

imun yang menyebabkan risiko

peningkatan darah beku),

beritahu doktor anda yang akan menentukan sama ada rawatan

mungkin perlu diubah.

(4) Juga berhati-hati jika anda menghidap kanser aktif - ini juga

mungkin bermakna anda mempunyai peningkatan risiko pendarahan.

Kanser aktif bermakna dalam tempoh 6 bulan

yang lalu anda:

- telah disahkan menghidap kanser

- menghidap kanser berulang

- sedang dirawat untuk kanser

Jika anda mengalami mana-mana keadaan di atas, beritahu doktor anda

sebelum anda mengambil *Rivein*.

Doktor anda akan memutuskan sama ada anda patut dirawat dengan ubat ini

dan sama ada anda perlu diletakkan di bawah pemerhatian rapi.

Jika anda perlu menjalani pembedahan

- *Rivein* hendaklah diambil sebelum dan selepas pembedahan tepat pada masa anda diarahkan oleh doktor anda
- jika pembedahan anda membabitkan kateter atau suntikan ke dalam tulang belakang (contohnya untuk epidural atau anestesia spina atau untuk mengurangkan kesakitan):
 - *Rivein* hendaklah diambil sebelum dan selepas suntikan atau kateter ditanggalkan tepat pada masa anda diarahkan oleh doktor anda

RIVEIN 15MG and 20MG FILM-COATED TABLETS

Rivaroxaban 15mg and 20mg

- beritahu doktor anda dengan serta- merta jika kaki anda rasa kebas atau lemah atau anda mengalami masalah usus atau pundi kencing selepas tamat anesthesia (habis ubat bius), kerana anda memerlukan perhatian dan penjagaan segera.

Kanak-kanak dan remaja

Rivein tidak disyorkan untuk kanak-kanak dengan berat badan di bawah 30 kg. Tidak ada maklumat yang mencukupi mengenai penggunaannya pada kanak-kanak dan remaja dalam petunjuk dewasa.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Ubat lain dan Rivein

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil atau baru-baru ini mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang boleh diperolehi tanpa preskripsi.

- Jika anda mengambil

- sesetengah ubat untuk *fungus infections* (seperti *fluconazole*, *itraconazole*, *voriconazole*, *posaconazole*), melainkan ubat tersebut hanya disapu pada kulit
- pil *ketoconazole* (digunakan untuk merawat *Cushing's syndrome* – apabila badan mengeluarkan kortisol secara berlebihan)
- sesetengah ubat untuk jangkitan bakteria (seperti *clarithromycin*, *erythromycin*)
- ubat antivirus untuk HIV / AIDS (seperti *ritonavir*)
- ubat lain untuk mengurangkan pembekuan darah (seperti *enoxaparin*, *clopidogrel* atau *vitamin K* antagonists seperti *warfarin* dan *acenocoumarol*, *prasugrel* dan *ticagrelor* (lihat bahagian “Amaran dan Langkah Berjaga-jaga”)
- ubat antiradang dan pelega kesakitan (seperti *naproxen* atau *acetylsalicylic acid*)
- *dronedarone*, ubat untuk merawat degupan jantung tidak normal
- sesetengah ubat untuk merawat *depression* (*selective serotonin reuptake inhibitors* (SSRIs) atau

serotonin norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs))

Jika anda mengalami mana-mana keadaan di atas, beritahu doktor anda

sebelum anda mengambil *Rivein*, kerana kesan *Rivein* mungkin bertambah. Doktor anda akan menentukan, sama ada anda perlu dirawat dengan *Rivein* atau anda perlu diletakkan di bawah pemerhatian rapi.

Jika doktor anda rasa risiko anda mendapat *stomach* atau *bowel ulcer* meningkat, beliau boleh juga menggunakan rawatan mencegah ulser.

- Jika anda sedang mengambil

- ubat untuk merawat sawan atau *epilepsy* (*phenytoin*, *carbamazepine*, *phenobarbital*)
- St John's Wort (*Hypericum perforatum*), produk herba yang digunakan untuk *depression*
- rifampicin, sejenis antibiotik

Jika anda mengalami mana-mana keadaan di atas, beritahu doktor anda

sebelum anda mengambil *Rivein*, kerana kesan *Rivein* mungkin berkurangan. Doktor anda akan menentukan, sama ada anda perlu dirawat dengan *Rivein* atau anda perlu diletakkan di bawah pemerhatian rapi.

Mengandung dan Menyusukan Anak

Jika anda mengandung atau menyusukan anak, jangan ambil *Rivein*. Jika terdapat kemungkinan anda akan mengandung, gunakan kontraseptif (kaedah pencegah kehamilan) yang boleh dipercayai sepanjang masa anda mengambil *Rivein*. Jika anda mengandung semasa mengambil *Rivein*, segera beritahu doktor anda, yang akan menentukan cara untuk merawat anda.

Rivein mengandungi lactose dan sodium

Jika anda telah diberitahu oleh doktor anda bahawa anda tidak tolerans kepada sesetengah gula, hubungi doktor anda sebelum anda mengambil ubat ini.

Ubat ini mengandungi kurang daripada 1 mmol sodium (23 mg) dalam setiap pil, yang boleh dikatakan “sodium-free”.

Cara menggunakan Rivein

- Berapa banyak harus digunakan

Sentiasa ambil *Rivein* mengikut arahan doktor anda. Jika tidak pasti, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.

Berapa banyak harus digunakan Dewasa

- Untuk mengelakkan pembekuan darah dalam otak (strok) dan saluran darah lain dalam badan anda Dos yang disyorkan ialah satu tablet Rivein 20 mg sekali sehari. Jika anda mempunyai masalah buah pinggang, dos boleh dikurangkan kepada satu tablet Rivein 15 mg sekali sehari.

- Untuk merawat pembekuan darah dalam urat kaki anda dan pembekuan darah dalam saluran darah paru-paru anda, dan untuk mengelakkan pembekuan darah daripada berulang. Dos yang disyorkan ialah satu tablet Rivein 15 mg dua kali sehari untuk 3 minggu pertama. Untuk rawatan selepas 3 minggu, dos yang disyorkan ialah satu tablet Rivein 20 mg sekali sehari. Selepas sekurang-kurangnya 6 bulan rawatan pembekuan darah, doktor anda mungkin memutuskan untuk meneruskan rawatan dengan sama ada satu tablet 10 mg sekali sehari atau satu tablet 20 mg sekali sehari. Jika anda mempunyai masalah buah pinggang dan mengambil satu tablet Rivein 20 mg sekali sehari, doktor anda mungkin memutuskan untuk mengurangkan dos untuk rawatan selepas 3 minggu kepada satu tablet Rivein 15 mg sekali sehari jika risiko pendarahan lebih besar daripada risiko untuk mempunyai satu lagi bekuan darah.

Kanak-kanak dan remaja

Dos Rivein bergantung kepada berat badan, dan akan dikira oleh doktor.

- Dos yang disyorkan untuk kanak-kanak dan remaja dengan berat badan antara 30 kg dan kurang daripada 50 kg ialah satu tablet Rivein 15 mg sekali sehari.
- Dos yang disyorkan untuk kanak-kanak dan remaja dengan berat badan 50 kg atau lebih ialah satu tablet Rivein 20 mg sekali sehari.

Ambil setiap dos Rivein dengan minuman (cth air atau jus) semasa makan. Ambil tablet setiap hari pada

RIVEIN 15MG and 20MG FILM-COATED TABLETS

Rivaroxaban 15mg and 20mg

masa yang sama. Pertimbangkan untuk menetapkan penggera untuk mengingatkan anda. Untuk ibu bapa atau penjaga: sila perhatikan anak untuk memastikan dos penuh diambil.

Memandangkan dos Rivein adalah berdasarkan berat badan, adalah penting untuk mengekalkan lawatan doktor yang dijadualkan kerana dos mungkin perlu diselaraskan apabila berat badan berubah. Jangan sekali-kali laraskan dos Rivein sendiri. Doktor akan menyesuaikan dos jika perlu.

Jangan belah tablet dalam usaha untuk memberikan sebahagian kecil daripada dos tablet. Jika dos yang lebih rendah diperlukan sila gunakan pembentangan alternatif butiran Rivein untuk penggantian oral.

Bagi kanak-kanak dan remaja yang tidak dapat menelan tablet keseluruhan, sila gunakan butiran Rivein untuk penggantian oral.

Jika anda sukar menelan pil bulat-bulat, bincang dengan doktor anda tentang cara lain untuk mengambil Rivein. Pil ini boleh dihancurkan dan dicampur dengan air atau puri epal sebelum anda terus mengambilnya dengan serta-merta. Jika perlu, doktor anda boleh juga memberi pil *Rivein* yang telah dihancurkan melalui tiub perut.

Jika anda memuntahkan dos atau muntah

- kurang daripada 30 minit selepas anda mengambil Rivein, ambil dos baharu.
- lebih daripada 30 minit selepas anda mengambil Rivein, **jangan** ambil dos baharu. Dalam kes ini, ambil dos Rivein seterusnya pada masa biasa.

Hubungi doktor jika anda berulang kali meludahkan dos atau muntah selepas mengambil Rivein.

Bila mula menggunakan Rivein

- Bila perlu digunakan

Ambil tablet setiap hari sehingga doktor anda memberitahu anda untuk berhenti.

Cuba ambil tablet pada masa yang sama setiap hari untuk membantu anda mengingatnya.

Doktor anda akan menentukan berapa lama anda mesti meneruskan rawatan.

Jika anda mengambil Rivein lebih daripada yang sepatutnya

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera jika anda telah mengambil terlalu banyak pil *Rivein*. Pengambilan terlalu banyak *Rivein* meningkatkan risiko pendarahan.

Jika anda terlupa mengambil Rivein

- Jika terlupa menggunakan

Dewasa, kanak-kanak dan remaja:
Jika anda mengambil satu tablet 20 mg atau satu tablet 15 mg sekali sehari dan telah terlepas dos, ambilnya sebaik sahaja anda ingat. Jangan mengambil lebih daripada satu tablet dalam satu hari untuk menggantikan dos yang terlupa. Ambil tablet seterusnya pada hari berikutnya dan kemudian teruskan pengambilan satu tablet sekali sehari.

Dewasa:

Jika anda mengambil satu tablet 15 mg dua kali sehari dan terlepas satu dos, ambilnya sebaik sahaja anda ingat. Jangan mengambil lebih daripada dua tablet 15 mg dalam satu hari. Jika anda terlupa mengambil satu dos, anda boleh mengambil dua tablet 15 mg pada masa yang sama untuk mendapatkan jumlah dua tablet (30 mg) pada satu hari. Pada hari berikutnya anda perlu meneruskan pengambilan satu tablet 15 mg dua kali sehari.

Jika anda berhenti mengambil Rivein

- Berapa lama perlu digunakan

Jangan berhenti mengambil Rivein tanpa berbincang dengan doktor anda terlebih dahulu, kerana Rivein merawat dan mencegah keadaan yang serius.

Jika anda mempunyai pertanyaan lanjut mengenai penggunaan produk ini, sila tanya doktor atau ahli farmasi anda.

Semasa menggunakan Rivein

- Perkara yang perlu dilakukan

Jangan berhenti mengambil Rivein tanpa berbincang dengan doktor anda terlebih dahulu, kerana Rivein merawat dan mencegah keadaan yang serius.

Jika anda mempunyai sebarang soalan lanjut tentang penggunaan ubat ini, tanya doktor atau ahli farmasi anda.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat melainkan dinasihatkan oleh doktor anda.

Jangan ambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan beri *Rivein* kepada orang lain, walaupun mereka mengalami gejala atau keadaan yang sama seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera
Rivein boleh menyebabkan kesan rasa pening (kesan sampingan umum) atau pitam (kesan sampingan tidak umum). Anda tidak harus memandu atau menggunakan jentera jika anda mengalami kesan sampingan tersebut.

Kesan-kesan Sampingan

Seperti semua ubat, *Rivein* boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Seperti ubat lain sepertinya (agen antitrombosis), *Rivein* boleh menyebabkan pendarahan yang boleh mengancam nyawa. Pendarahan secara berlebihan boleh menyebabkan tekanan darah jatuh secara tiba-tiba (*shock*). Dalam sesetengah kes, pendarahan mungkin tidak ketara

Kesan sampingan boleh dialami yang mungkin menandakan pendarahan

Segera beritahu doktor anda, jika anda mengalami mana-mana kesan sampingan berikut:

- pendarahan berlarutan atau berlebihan
- kelemahan yang luar biasa, keletihan, pucat, pening, sakit kepala, bengkak tanpa sebab, sesak nafas, sakit dada atau *angina pectoris*, yang mungkin menandakan pendarahan.

Doktor anda boleh memutuskan untuk meletakkan anda di bawah pemerhatian

RIVEIN 15MG and 20MG FILM-COATED TABLETS

Rivaroxaban 15mg and 20mg

rapi atau menukar cara untuk merawat anda.

Kesan sampingan boleh dialami yang mungkin menandakan tindak balas kulit yang teruk

Segera beritahu doktor anda jika anda mengalami tindak balas kulit seperti:

- ruam kulit teruk yang merebak, lepuh atau luka mukosa, seperti dalam mulut atau mata (*Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis*).

Kesan sampingan ini sangat jarang berlaku (sehingga 1 dalam 10,000).
- tindak balas ubat yang menyebabkan ruam, demam, radang organ dalaman, ketaknormalan hematologi dan penyakit sistemik (*DRESS syndrome*).
Kesan sampingan ini sangat jarang berlaku (sehingga 1 dalam 10,000).

Kesan sampingan boleh dialami yang mungkin menandakan tindak balas alahan yang teruk

Segera beritahu doktor anda, jika anda mengalami mana-mana kesan sampingan berikut:

- muka, bibir, mulut, lidah atau tekak bengkak; kesukaran untuk menelan; geligata dan sukar bernafas; tekanan darah turun secara mendadak. Kesan sampingan ini sangat jarang berlaku (*anaphylactic reactions*, termasuk *anaphylactic shock*; boleh dialami oleh 1 dalam 10,000 orang) dan luar biasa (*angioedema* dan *allergic oedema*; boleh dialami oleh sehingga 1 dalam 100 orang).

Senarai keseluruhan kesan sampingan yang mungkin dialami

Biasa (boleh dialami 1 dalam 10 orang)

- pengurangan sel darah merah yang boleh menjadikan kulit pucat dan menyebabkan kelemahan atau sesak nafas

- pendarahan dalam perut atau usus, pendarahan urogenital (termasuk darah dalam air kencing dan pendarahan haid secara berlebihan), pendarahan hidung, gusi berdarah

- pendarahan dalam mata (termasuk pendarahan bahagian putih mata)
- pendarahan dalam tisu atau rongga badan (*haematoma*, lebam)
- batuk berdarah
- pendarahan daripada kulit atau bawah kulit
- pendarahan selepas pembedahan
- darah atau bendalir keluar daripada luka pembedahan
- bengkak anggota
- kesakitan anggota
- gangguan fungsi buah pinggang (boleh diperhatikan dalam ujian yang dijalankan oleh doktor anda)
- demam
- sakit perut, makanan tidak hadam, rasa tidak sihat, sembelit, cirit-birit
- tekanan darah rendah (tanda mungkin rasa pening atau pitam apabila berdiri)
- kekurangan tenaga dan kekuatan secara umum (kelemahan, keletihan), sakit kepala, pening
- ruam, kulit gatal
- ujian darah mungkin menunjukkan peningkatan sesetengah enzim hati

Luar Biasa (boleh dialami 1 dalam 100 orang)

- pendarahan dalam otak atau dalam tempurung kepala
- pendarahan dalam sendi menyebabkan kesakitan dan bengkak
- *thrombocytopenia* (bilangan platelet rendah, iaitu sel-sel yang membantu darah untuk membeku)
- tindak balas alahan, termasuk tindak balas alahan kulit
- gangguan fungsi hati (boleh diperhatikan dalam ujian yang dijalankan oleh doktor anda)
- ujian darah mungkin menunjukkan peningkatan bilirubin, sesetengah enzim pankreas atau hati atau bilangan platelet
- pitam
- rasa tidak sihat
- denyutan jantung lebih pantas
- mulut kering
- geligata

Jarang (boleh dialami 1 dalam 1000 orang)

- pendarahan dalam otot
- *cholestasis* (pengurangan aliran hempedu), *hepatitis* termasuk kecederaan hepatoselular (radang hati termasuk kecederaan hati)

- kekuningan kulit dan mata (*jaundice*)
- bengkak setempat
- pengumpulan darah (*haematoma*) dalam bahagian selangang sebagai komplikasi prosedur jantung di mana kateter dimasukkan ke dalam arteri kaki anda (*pseudoaneurysm*)

Sangat jarang berlaku (boleh dialami 1 dalam 10,000 orang)

- pengumpulan eosinofil, sejenis sel darah granulositik putih yang menyebabkan keradangan pada paru-paru (*pneumonia eosinofilik*)

Tidak diketahui (*kekerapan tidak dapat dianggarkan daripada data yang ada*)

- kegagalan buah pinggang selepas pendarahan teruk
- tekanan meningkat dalam otot kaki atau lengan selepas pendarahan, yang menyebabkan kesakitan, bengkak, perubahan rasa, kebas atau lumpuh (sindrom pemetakan selepas pendarahan)

Kesan sampingan pada kanak-kanak dan remaja

Secara umumnya, kesan sampingan yang diperhatikan pada kanak-kanak dan remaja yang dirawat dengan Rivein adalah serupa dari segi jenis dengan yang diperhatikan pada orang dewasa dan terutamanya ringan hingga sederhana dalam keterukan.

Kesan sampingan yang diperhatikan lebih kerap pada kanak-kanak dan remaja:

Sangat biasa (boleh menjejaskan lebih daripada 1 dalam 10 orang)

- sakit kepala
- demam
- hidung berdarah
- muntah

Biasa (boleh menjejaskan sehingga 1 dalam 10 orang)

- degupan jantung meningkat
- ujian darah mungkin menunjukkan peningkatan bilirubin (pigmen hempedu)
- trombositopenia (bilangan platelet rendah iaitu sel yang membantu darah membeku)
- pendarahan haid yang banyak

Tidak biasa (boleh menjejaskan sehingga 1 dalam 100 orang)

RIVEIN 15MG and 20MG FILM-COATED TABLETS

Rivaroxaban 15mg and 20mg

- ujian darah mungkin menunjukkan peningkatan dalam subkategori bilirubin (bilirubin langsung, pigmen hempedu)

Jika anda mengalami sebarang kesan sampingan, beritahu doktor atau ahli farmasi anda. Ini termasuk sebarang kesan sampingan yang tidak tersenarai dalam risalah ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web nppra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara Penyimpanan Dan Pelupusan Rivein

- Penyimpanan

Simpan di tempat yang tidak boleh dilihat dan dicapai oleh kanak-kanak.

Simpan di bawah suhu 30°C.

Jangan gunakan *Rivein* selepas tarikh luput yang dinyatakan pada label. Tarikh luput merujuk kepada hari terakhir bulan yang dinyatakan.

Ubat ini tidak perlu disimpan dalam keadaan tertentu.

- Pelupusan

Ubat tidak sepatutnya dilupuskan menerusi air buangan atau sampah sarap rumah. Tanya ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat yang tidak lagi diperlukan. Langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

MAKLUMAT LANJUT

- Rupa dan warna produk

RIVEIN 15MG FILM-COATED TABLETS

Tablet berwarna merah, bulat, bersalut filem, dwicembung, dinyahbos dengan 'A' pada satu permukaan & '2' pada permukaan yang lain.

RIVEIN 20MG FILM-COATED TABLETS

Tablet berwarna merah coklat, bulat, bersalut filem, dwicembung, dinyahbos dengan 'A' pada satu permukaan & '3' pada permukaan yang lain.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Bahan aktif ialah rivaroxaban. Setiap pil bersalut mengandungi 15mg atau 20mg rivaroxaban.

- Bahan-bahan tidak aktif

Teras pil:

- Microcrystalline cellulose,
- Lactose monohydrate,
- Croscarmellose sodium,
- Sodium Laurilsulfate
- Hypromellose 6 cps,
- Magnesium stearate.

Salutan:

- Iron oxide red,
- Hypromellose,
- Macrogol/PEG,
- Titanium dioxide

- Nombor MAL

Rivein 15mg: MAL25046024AZ

Rivein 20mg: MAL25046025AZ

Pengilang

RV LIFESCIENCES LIMITED

Plot No. H-19, M.I.D.C., Waluj,
Aurangabad 431133,
Maharashtra State, India.

Pemegang Pendaftaran Produk

Medispec (M) Sdn Bhd

B-1-07, Jalan SS 25/22,

Taman Mayang,

47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

27/08/2025

Nombor Siri

NPRA (R2) 24/050