

Lotemp Suspension 250 mg/5 mL

Paracetamol (250mg/5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Lotemp Suspension
2. Bagaimana Lotemp Suspension berfungsi
3. Sebelum menggunakan Lotemp Suspension
4. Cara menggunakan Lotemp Suspension
5. Semasa menggunakan Lotemp Suspension
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Lotemp Suspension
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP
11. Nombor siri

Apakah kegunaan Lotemp Suspension

Lotemp Suspension digunakan untuk melegakan demam, sakit kepala, gejala selesema dan selesema biasa, sakit gigi, ketidakselesaan akibat pertumbuhan gigi, dan demam selepas vaksinasi.

Bagaimana Lotemp Suspension berfungsi

Lotemp Suspension mengandungi paracetamol, ubat yang berfungsi dengan melegakan kesakitan dan mengurangkan suhu dan demam yang tinggi.

Sebelum menggunakan Lotemp Suspension

Ubat ini mengandungi PARACETAMOL. Dilarang mengambil ubatan lain yang mengandungi PARACETAMOL dalam masa yang sama.

Amaran alergi: Paracetamol boleh menyebabkan reaksi kulit yang teruk. Gejala mungkin termasuk kemerahan kulit, lepuh atau ruam. Ini mungkin tanda-tanda keadaan serius. Sekiranya reaksi ini berlaku, hentikan penggunaan dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera.

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil Lotemp Suspension dan berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda jika:

- anda alah kepada Paracetamol atau bahan lain di dalamnya
- anda tidak pasti jika anda perlu mula mengambil ubat ini.

- Sebelum menggunakannya

Awas jika anda mengalami kerosakan fungsi buah pinggang atau hati. Ia juga harus diberikan dengan berhati-hati kepada individu yang ketagih dengan alkohol.

Mengandung dan menyusukan anak

Berbincang dengan doktor anda sebelum mengambil ubat ini jika anda mengandung, mungkin mengandung atau menyusukan anak.

Berhati-hati jika anda mengalami gangguan fungsi buah pinggang.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil ubat ini, termasuk mana-mana yang anda dapatkan tanpa preskripsi dari kedai farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan anda.

Beritahu doktor anda jika anda menggunakan Lotemp Suspension dengan kombinasi ubat yang berikut:

- Ubat antikoagulan (menghalang darah beku) seperti warfarin dan coumarin.
- Ubat pencetus enzim hati seperti barbiturates dan alkohol.
- Cholestyramine (untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah).
- Antikonvulsan (untuk merawat serangan epilepsi)

Cara menggunakan Lotemp Suspension

- Berapa banyak harus diambil

Sentiasa gunakan Lotemp Suspension seperti yang ditetapkan oleh doktor anda. Anda perlu menyemak dengan doktor atau ahli farmasi jika tidak pasti.

Dos yang disyorkan boleh dikira sebagai 15 mg bagi setiap kilogram berat badan untuk setiap dos, setiap 4 hingga 6 jam mengikut keperluan.

*** Jangan ambil lebih daripada 4 kali dalam tempoh 24 jam;**

Tidak disyorkan untuk kanak-kanak di bawah umur 1 bulan.

Jadual di bawah menunjukkan dos paracetamol suspension 250 mg/5 mL yang perlu diberikan, berdasarkan purata berat badan mengikut umur kanak-kanak.

Berat Badan Kanak-kanak (kg)	Dos (ml)
12 – 13 kg	3 mL
14 – 16 kg	4 mL
17 – 19 kg	5 mL
20 – 23 kg	6 mL
24 – 26 kg	7 mL
27 – 29 kg	8 mL
30 – 33 kg	9 mL
34 – 39 kg	10 mL
40 – 42 kg	12 mL

- Bila perlu diambil

Amil seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu diambil

Teruskan pengambilan Lotemp Suspension seperti yang dicadangkan oleh doktor anda. Jika gejala berterusan, dapatkan nasihat doktor anda.

- Jika terlupa mengambil

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Amil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, tunggu sehingga sampai masa untuk mengambil dos seterusnya dan abaikan dos yang tertinggal. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa telah terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Pengambilan Lotemp Suspension secara berlebihan mungkin menyebabkan:

Lotemp Suspension 250 mg/5 mL

Paracetamol (250mg/5ml)

- Loya, muntah, sakit perut, kerosakan buah pinggang dan masalah pembekuan darah.

Semasa menggunakan Lotemp Suspension

- Perkara yang perlu dilakukan

- Beritahu ahli farmasi atau doktor anda sekiranya simptom berterusan selepas mengambil ubat ini.
- Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Lotemp Suspension.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan ambil dos lebih daripada yang disarankan melainkan diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan ambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan berkongsi Lotemp Suspension dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

- Jangan mengambil minuman beralkohol dengan ubat ini.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, Lotemp Suspension boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mengalaminya. Jika simptom berterusan, jangan ambil ubat ini dan rujuk doktor.

Beritahu doktor anda jika anda dapati mana-mana kesan sampingan berikut atau mengalami apa-apa kesan lain yang tidak disenaraikan:

- Ruam atau reaksi kulit yang teruk, keadaan serius seperti sindrom Stevens-Johnson

- Tahap *serum bicarbonate*, *calcium* dan *sodium* yang rendah
- Tahap *ammonia*, *chloride*, *uric acid* atau gula dalam darah yang tinggi
- *Anemia* (sel darah merah rendah)
- *Leukopenia* (sel darah putih rendah)
- Tahap sel darah yang rendah
- Peningkatan *serum alkaline phosphatase* dan *serum bilirubin*
- Reaksi alahan
- Kerosakan buah pinggang

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan *Adverse Ubat* Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers* → *Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF)* or *Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan Lotemp Suspension

- Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C. Lindungi daripada cahaya dan pembekuan.

- Pelupusan

Ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Dapatkan maklumat daripada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Suspensi berwarna oren, likat dengan perisa oren.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Paracetamol

- Bahan-bahan tidak aktif

Sodium Citrate Dihydrate, Saccharin Sodium, Edetate Disodium, Sucrose, Sorbitol Solution 70%, Propylene Glycol, Methylparaben, Propylparaben, Xanthan Gum, Tragacanth, Sunset Yellow Dye C.I. 15985, Orange Flavor, Purified Water.

- Nombor MAL:

Pengilang

Biolab Co., Ltd.
625 Soi 7A Bangpoo Industrial Estate,
Sukhumvit Road,
Moo 4, Prakasa, Muang,
Samutprakarn, 10280, Thailand.

Pemegang Pendaftaran Produk

Medispec (M) Sdn Bhd
B-1-07, Jalan SS 25/22,
Taman Mayang,
47301 Petaling Jaya,
Selangor, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

21/08/2026

Nombor siri

NPRA (R2) 26/145