

UNIREN Spray 1% w/w

Diclofenac diethylammonium bersamaan dengan Diclofenac sodium (1% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan UNIREN Spray
2. Bagaimana UNIREN Spray berfungsi
3. Sebelum menggunakan UNIREN Spray
4. Cara menggunakan UNIREN Spray
5. Semasa menggunakan UNIREN Spray
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan UNIREN Spray
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan UNIREN Spray

UNIREN Spray digunakan untuk melegakan sakit dan bengkak yang melibatkan sendi, otot dan tisu di sekitarnya yang bersaiz kecil atau sederhana.

Bagaimana UNIREN Spray berfungsi

UNIREN Spray mengandungi bahan aktif *Diclofenac sodium*, yang tergolong dalam kumpulan ubat anti-radang bukan steroid (NSAID).

Sebelum mengambil UNIREN Spray

-Bila tidak boleh mengambil

- Jika anda ada alahan terhadap *Diclofenac* atau bahan kandungan lain UNIREN Spray
- Jika anda pernah mengalami alahan terhadap *acetylsalicylic acid* atau NSAID lain
- Sila rujuk bahagian “Mengandung dan menyusukan anak”
- Jika anda berumur 14 tahun ke bawah

Mengandung dan menyusukan anak

Ubat ini tidak patut digunakan oleh wanita yang mengandung atau menyusukan anak.

Dapatkan maklumat lanjut daripada doktor jika anda mengandung atau sedang menyusukan anak.

-Sebelum mula mengambil

Gunakan UNIREN Spray dengan berhati-hati:

- Jika anda mempunyai ulser perut.
- Jika anda pernah menghidapi penyakit lelah atau sebarang alahan.

- Jangan gunakan untuk mata, hidung atau mulut dan luka terbuka atau kawasan kulit yang berjangkit.
- Jangan menelan UNIREN Spray
- Jangan membalut kawasan yang dirawat dengan pembalut atau plaster yang kalis air atau kedap udara.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

- Beritahu doktor atau ahli farmasi jika:
- anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi.
- Jika anda mengambil tablet, kapsul atau supositori untuk kesakitan termasuk apa-apa yang mengandungi *Diclofenac*, *Aspirin* atau mana-mana ejen anti-keradangan yang lain.

Bincang dengan doktor anda sebelum menggunakan UNIREN Spray.

Cara menggunakan UNIREN Spray

- Berapa banyak harus digunakan

Topikal

Untuk dewasa dan remaja berumur 14 tahun ke atas

- UNIREN Spray harus disembur pada permukaan kulit.
- UNIREN Spray harus digunakan 3-4 kali sehari.

UNIREN Spray adalah untuk penggunaan kulit sahaja. Ia hanya boleh digunakan pada kulit yang tidak mempunyai luka terbuka. Penggunaan UNIREN Spray dengan betul adalah penting. Ikut arahan dengan teliti:

- Basuh tangan anda selepas penggunaan kecuali tangan adalah kawasan yang dirawat.
- Satu tempoh sekurang-kurangnya 4 jam harus dibiarkan antara aplikasi. Semburan tidak boleh digunakan lebih daripada 4 kali dalam tempoh 24 jam.
- Jika tiada penambahbaikan untuk gejala anda selepas 7 hari, dapatkan nasihat doktor.
- Jika gejala anda bertambah baik tetapi tidak sembuh sepenuhnya, jangan gunakan lebih daripada 7 hari tanpa mendapatkan nasihat doktor.

- Bila perlu digunakan

Selalu gunakan UNIREN Spray mengikut arahan di atas. Anda

sepatutnya bertanya kepada doktor atau ahli farmasi jika anda tidak pasti.

- Berapa lama perlu digunakan

Apabila kesakitan dan bengkak hilang, hentikan penggunaan ubat ini.

- Jika terlupa menggunakan

- Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat, tetapi jangan gunakan melebihi dos yang ditetapkan. Kemudian, ikut seperti yang sebelumnya.
- Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

- Jika anda terlebih menggunakan ubat ini, anda sepatutnya mengelap UNIREN Spray yang berlebihan dengan tisu.
- Jika anda tertelan semburan ini, hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Bawakan botol dan risalah ini dengan anda.

Jika anda mempunyai soalan yang selanjutnya mengenai produk ini, rujuk kepada doktor anda atau ahli farmasi.

Semasa menggunakan UNIREN Spray

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor. Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan UNIREN Spray. Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mengandung semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan telan larutan UNIREN Spray. Ia adalah untuk kegunaan luaran sahaja.
- Jangan gunakan pada luka terbuka atau kulit yang pecah.
- Jangan mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian
Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

Memandu dan menggunakan jentera

UNIREN Spray sepatutnya tidak akan menyebabkan anda pening atau mengantuk.

Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, UNIREN Spray boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Hentikan penggunaan jika sebarang ruam kulit dikesan atau jika terdapat alahan kepada bahan kandungannya. Berikutan penggunaan penyediaan *Diclofenac* topikal yang lain, tindak balas pada kawasan penggunaan ubat biasanya dilaporkan. Ini termasuk ruam, gatal, kemerahan, sensasi membakar atau kulit yang bersisik.

Jika NSAID topikal digunakan ke atas kawasan kulit yang besar secara berterusan untuk tempoh yang panjang, kesan sampingan yang lain boleh berlaku. Terdapat kes-kes yang jarang seperti asma boleh menjadi lebih teruk, penyakit kulit, sakit perut, dan gastrik boleh berlaku. Ini mungkin disebabkan oleh sejarah penyakit asma atau penyakit alahan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan UNIREN Spray

- Penyimpanan
Simpan di bawah suhu 30°C.
- Pelupusan
Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk

melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk
Larutan kuning yang pucat, jernih dan mempunyai wangian menthol-kapur barus. Ia dibekal dalam botol 60 mL.
- Bahan-bahan kandungan
 - Bahan aktif: Setiap 100g semburan mengandungi *Diclofenac diethylammonium* bersamaan dengan *Diclofenac sodium* 1 g (1% w/w)
 - Bahan-bahan lain: *Propylene glycol*, *Menthol*, *Kapur barus*, *Minyak bunga lawang*, *Minyak kayu putih*, *Minyak pudina*, *Ketone 1650B*, *Butylated Hydroxytoluene*, *Isopropyl alcohol*, *Ethyl alcohol 95%* dan *Air suling*
- Nombor MAL: MAL16015071AZ

Pengilang

UNISON LABORATORIES CO., LTD.
39 Moo 4, Klong Udomcholjorn, Muang Chachoengsao, Chachoengsao 24000 Thailand

Pemegang Pendaftaran Produk

Medispec (M) Sdn Bhd
B-1-07, Jalan SS 25/22,
Taman Mayang,
47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

12/06/2023