

LORAZIN 10MG ORODISPERSIBLE TABLET

Loratadine 10 mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Lorazin
2. Bagaimana Lorazin berfungsi
3. Sebelum mengambil Lorazin
4. Cara menggunakan Lorazin
5. Semasa menggunakan Lorazin
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Lorazin
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Lorazin

Ubat ini mengandungi *Loratadine* yang tergolong dalam kumpulan ubat yang dikenali sebagai antihistamin, yang bertindak untuk melegakan gejala-gejala alahan.

Ia boleh digunakan untuk melegakan gejala-gejala demam alergi (contohnya bersin, hidung berair dan gatal dan kerengsaan mata) dan alahan lain seperti alahan haiwan kesayangan dan habuk. Ia juga boleh digunakan untuk merawat kulit merah gatal (tanda-tanda urtikaria, yang sering dikenali sebagai *hives* atau *nettle rash*).

Bagaimana Lorazin berfungsi

Ia berfungsi dengan menyekat bahan dalam badan yang dipanggil histamin. Ini membantu untuk mengurangkan gejala alahan.

Sebelum mengambil Lorazin

- Bila tidak boleh mengambil

Jika anda ada alahan (hipersensitif) kepada *loratadine* atau mana-mana bahan-bahan yang lain dalam Lorazin

Mengandung dan menyusukan anak

Jangan ambil Lorazin jika anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung.

Jangan ambil Lorazin jika anda sedang menyusukan anak. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

- Sebelum mula mengambil

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mempunyai penyakit hati.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Lorazin

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa dan Kanak-kanak 12 tahun dan ke atas:

Satu loratadine tablet *dispersible* (10 mg) diletakkan di dalam mulut sekali sehari. Biarkan tablet untuk disintegrasi dalam mulut dan menelan. Air atau cecair lain tidak diperlukan.

Sebelum mengambil, mengelupas foil dengan berhati-hati tanpa menghancurkan tablet untuk mengeluarkannya daripada pek lepuh .

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir

masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Pengambilan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan mengantuk, degupan jantung yang pantas dan sakit kepala.

Semasa menggunakan Lorazin

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Lorazin.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi Lorazin dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera

Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera, Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Lorazin boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Pesakit sangat jarang mengalami tindak balas hipersensitif, seperti kesukaran bernafas, bengkak pada muka, leher, lidah atau tekak selepas penggunaan produk ini. Jika anda mengalami sebarang kesan sampingan, berhenti mengambil ubat ini dan menghubungi ahli farmasi atau doktor anda segera.

Kesan-kesan sampingan yang paling biasa dilaporkan di kalangan orang dewasa dan remaja termasuk mengantuk, sakit kepala, peningkatan selera makan, dan kesukaran tidur.

Kesan sampingan lain yang dilaporkan yang sangat jarang berlaku ialah pening, degupan jantung yang tidak teratur atau cepat, loya (rasa sakit), mulut kering, sakit perut, masalah hati, keguguran rambut, ruam dan keletihan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau laman web portal.bpfk.gov.my (Consumers →Reporting).

Cara penyimpanan dan pelupusan

Lorazin

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan dibawah suhu 30°C.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Satu tablet rata putih bujur dengan tepi sedikit serong mempunyai garisan pada satu belah dan terukir "SPL" di sebelah lain.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Setiap tablet mengandungi *Loratadine* 10 mg

- Bahan tidak aktif

Pharmaburst B2 [Mannitol, Crospovidone, Sorbitol, Silicon Dioxide], Croscarmellose sodium, Aspartame, Strawberry Flavour, Purified Talc, Colloidal Anhydrous Silica, Magnesium Stearate

- Nombor MAL

Pengilang

SQUARE PHARMACEUTICALS LTD.
Dhaka Unit, Kaliakoir, Gazipur,
1750,
Bangladesh

Pemegang Pendaftaran Produk

Medispec (M) Sdn Bhd
No. 55 & 57, Lorong Sempadan 2
11400 Ayer Itam, Penang, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

4/11/2014