

# ALATROL SYRUP 5MG/5ML

Cetirizine Hydrochloride (5mg/5ml)

## Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Alatrol Syrup
2. Bagaimana Alatrol Syrup berfungsi
3. Sebelum mengambil Alatrol Syrup
4. Cara mengambil Alatrol Syrup
5. Semasa mengambil Alatrol Syrup
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Alatrol Syrup
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

## Apakah kegunaan Alatrol Syrup

Alatrol Syrup digunakan untuk rawatan gejala bermusim. Ia boleh digunakan untuk merawat:

- Rinitis (kerengsaan dan keradangan membran mukus dalam hidung).
- Perennial rinitis alergi (simptom sepanjang tahun disebabkan oleh alergen tertutup dari haiwan, kulat, hama dan sisa lipas).
- Urtikaria (kegatalan kulit) asal alahan.

## Bagaimana Alatrol Syrup berfungsi

Alatrol Syrup mengandungi antihistamina dipanggil cetirizine yang menghalang kesan-kesan histamina yang dihasilkan semasa reaksi alahan. Alatrol Syrup juga mengurangkan reaksi alahan yang dicetuskan oleh alergen (bahan yang mencetuskan tindak balas alahan) tertentu.

## Sebelum mengambil Alatrol Syrup

### - Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil Alatrol Syrup jika:

- Jika anda mempunyai hipersensitiviti kepada mana-mana bahan-bahan.
- Jika anda ibu menyusukan.
- Jika anda kerosakan buah pinggang teruk.

### - Mengandung atau menyusukan anak

Jangan mengambil Alatrol Syrup jika anda hamil, cuba untuk hamil atau fikir anda mungkin hamil.

Jangan mengambil Alatrol Syrup jika anda sedang menyusukan bayi. Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk nasihat sebelum mengambil sebarang ubat.

### - Sebelum anda mula menggunakannya

Beritahu doktor anda jika:

- Jika anda mempunyai alahan terhadap sebarang ubat-ubatan, makanan dan pewarna.
- Jika anda mengambil mana-mana ubat-ubatan lain (termasuk yang tidak ditetapkan oleh doktor anda).
- Jika anda mengandung atau menyusukan.

### - Mengambil ubat-ubatan lain

Beritahu doktor anda jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk apa-apa yang anda beli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan esihatan kerana ia boleh berinteraksi dengan Alatrol Syrup anda:

- Alkohol atau depressants sistem saraf pusat (CNS) lain.

## Cara menggunakan Alatrol Syrup

### - Berapa banyak harus digunakan

Digunakan secara oral.

**Dewasa:** 10 mg (20 titis atau 10 ml ubat cair atau 1 tablet) sekali sehari. Dos permulaan 5 mg (10 titik atau 5 ml ubat cair atau separuh daripada tablet) boleh dicadangkan jika ini membawa kepada kawalan gejala yang memuaskan.

### Kanak-kanak:

Kanak-kanak berumur 2-6 tahun 2.5 mg (5 titik atau 2.5 ml ubat cair) dua kali sehari.

Kanak-kanak berumur dari 6 hingga 12 tahun 5 mg (10 titik atau 5 ml ubat cair atau separuh daripada tablet) dua kali sehari.

Kanak-kanak lebih 12 tahun 10 mg (20 titis atau 10 ml ubat cair atau 1 tablet) sekali sehari.

### Orang tua

Data tidak mencadangkan bahawa dos perlu dikurangkan dalam subjek warga tua dengan syarat bahawa fungsi buah pinggang adalah normal.

Dalam pesakit masalah buah pinggang, dos perlu individu mengikut fungsi buah pinggang.

Ikut nasihat dari doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza daripada maklumat yang menyediakan dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami pada arahan label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.

### - Bila untuk menggunakannya

Doktor anda akan menentukan masa yang sesuai untuk anda gunakan Alatrol Syrup mengikut jenis penyakit anda mempunyai.

### - Berapa lama untuk menggunakannya

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda

### - Jika anda terlupa untuk menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini. Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat, dengan syarat bahawa anda tidak menggunakan lebih daripada dos yang disyorkan dalam masa 24 jam.

Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

### - Jika anda menggunakannya terlalu banyak (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Mengambil terlalu banyak tablet boleh menyebabkan keresahan dan cepat marah, diikuti oleh rasa mengantuk. Sekiranya berlebihan berlaku, rawatan perlu menjadi gejala atau sokongan, dengan mengambil kira apa-apa ubat-ubatan concomitantly ditelan. Jika terlebih dos besar-besaran, lavage gastrik perlu dilakukan secepat mungkin. langkah-langkah sokongan

# ALATROL SYRUP 5MG/5ML

Cetirizine Hydrochloride (5mg/5ml)

biasa perlu disediakan dan pemerhatian rutin yang dilakukan secara teratur

## Semasa anda menggunakannya

### - Perkara yang perlu anda lakukan

Ambil ubat anda seperti yang doktor anda telah memberitahu anda.

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda mengambil Alatrol Syrup.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa mengambil ubat ini.

### - Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat kecuali dinasihatkan oleh doktor anda.

Jangan mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor anda.

Jangan berikan Alatrol Syrup kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom yang sama atau keadaan seperti anda.

### - Perkara yang perlu diperhatikan

- Elakkan penggunaan dengan alkohol.
- Awas apabila anda mempunyai masalah dengan kesukaran membuang air kecil.
- Awas jika anda mempunyai sawan.
- Langkah berjaga-jaga perlu diberikan kepada kanak-kanak di bawah umur 2 tahun.

## Memandu dan mengendalikan mesin

Ubat ini boleh menjejaskan keupayaan anda untuk memandu atau mesin digunakan. Jika tablet membuat anda merasa sakit, pening atau letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau menggunakan mesin dan hubungi doktor anda dengan segera.

## Kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Alatrol Syrup boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Berjumpalah dengan doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas mengambil ubat ini. Cetirizine pada dos yang disyorkan mempunyai kesan yang tidak diingini kecil seperti

mengantuk, keletihan, pening, sakit kepala, kesukaran membuang air kecil, mata gangguan, mulut kering, dan fungsi hati yang tidak normal dengan peningkatan enzim hati yang pulih normal selepas berhenti rawatan cetirizine.

Berikut adalah kesan sampingan yang dilaporkan yang dianggar oleh kekerapannya. Frekuensi adalah ditakrifkan seperti berikut: Sangat biasa; biasa; tidak biasa; jarang; sangat jarang; tidak diketahui.

### Gangguan darah dan limfa

Sangat jarang: *thrombocytopenia* (kekurangan platelet dalam darah)

### Gangguan sistem imun

Jarang: hipersensitiviti

Sangat jarang: kejutan anaphylactic

### Metabolisme dan pemakanan gangguan

Tidak diketahui: meningkat selera makan

### Gangguan psikiatri

Tidak biasa: gelisah

Jarang: keagresifan, kekeliruan,

kemurungan, halusinasi, insomnia

Sangat jarang: *tics* (tidak disengajakan, cepat dan berulang-ulangan pergerakan otot)

Tidak diketahui: ideation membunuh diri

### Gangguan sistem saraf

Tidak biasa: *paraesthesia* (sensasi yang tidak normal, biasanya kesemutan atau tusukan)

Jarang: sawan

Sangat jarang: *dysgeusia* (busuk, masin, tengik, atau logam rasa sensasi akan berterusan dalam mulut), pengsan, gegaran, *dystonia* (gangguan pergerakan di mana kontrak otot seseorang tanpa kawalan), *dyskinesia* (pergerakan otot luar kawal)

Tidak diketahui: *amnesia* (hilang ingatan), kemerosotan ingatan

### Gangguan mata

Sangat jarang: penglihatan gangguan, penglihatan kabur, *oculogyration* (pergerakan bola mata)

### Telinga dan labirin gangguan

Tidak diketahui: vertigo

### Gangguan jantung

Jarang: *tachycardia* (peningkatan kadar jantung)

### Gangguan gastro-usus

Tidak biasa: cirit-birit

### Gangguan hepatobiliary

Jarang: fungsi hepatic yang tidak normal (meningkatkan *transaminases*, *phosphatase alkali*,  $\gamma$ -GT dan *bilirubin*)

### Kulit dan gangguan tisu subkutaneus

Tidak biasa: pruritus, ruam

Jarang: urtikaria

Sangat jarang: edema angioneurotic, letusan dadah tetap

### Gangguan buah pinggang dan kencing

Sangat jarang: kesukaran membuang air kecil, buang air kecil tidak sukarela

Tidak diketahui: pengekalan kencing

### Gangguan umum dan keadaan tapak pentadbiran

Tidak biasa: *asthenia* (kelemahan), kelesuan

Jarang: edema

### Siasatan

Jarang: berat meningkat

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web [npra.gov.my](http://npra.gov.my) [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

## Cara penyimpanan dan pelupusan Alatrol Syrup

### - Penyimpanan

Jauhkan dari jangkauan dan penglihatan kanak-kanak.

Simpan di bawah suhu 30°C. Lindungi daripada cahaya.

### - Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat-ubatan tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu untuk melindungi alam sekitar.

# ALATROL SYRUP 5MG/5ML

Cetirizine Hydrochloride (5mg/5ml)

---

## Deskripsi Produk

- Rupa dan warna produk

Cecair jernih berwarna kuning cahaya dan berperisa lemon.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif adalah

Cetirizine hydrochloride

- Bahan kandungan bukan aktif

Glycerol, Liquid Sorbitol (Non-crystallising), Saccharin Sodium, Anhydrous Citric Acid Sodium Citrate, Menthol, Propylene Glycol, Polyoxyl-40 Hydrogenated Castor Oil, Methyl Hydroxybenzoate, Propyl Hydroxybenzoate, Lemon Tetraome 987317, D & C Yellow No. 10, Purified Water

- No. MAL :

MAL17035030AZ

## Pengilang

SQUARE PHARMACEUTICALS PLC.

Square Road, Salgaria, Pabna 6600

Bangladesh.

## Pemegang Pendaftaran Produk

Medispec (M) Sdn Bhd

B-1-07, Jalan SS 25/22,

Taman Mayang,

47301 Petaling Jaya, Selangor,

Malaysia.

## Tarikh kemas kina

04/03/2025

## Nombor Siri

NPRA(R2/1)250304/1424