

MEMXA 10MG TABLET

Risalah Maklumat Untuk *Pengguna (RiMUP)*

Memantine hydrochloride 10mg eq. to Memantine 8.31mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan *MEMXA 10mg Tablet*
2. Bagaimana *MEMXA 10mg Tablet* berfungsi
3. Sebelum mengambil *MEMXA 10mg Tablet*
4. Cara menggunakan *MEMXA 10mg Tablet*
5. Semasa menggunakan *MEMXA 10mg Tablet*
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *MEMXA 10mg Tablet*
8. Deskripsi produk
9. Maklumat lanjut pengilang dan pemegang pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini

Apakah kegunaan *MEMXA 10mg Tablet*

MEMXA 10mg Tablet tergolong dalam kumpulan ubat-ubatan yang dikenali sebagai ubat *anti-dementia*.

MEMXA 10mg Tablet digunakan untuk merawat pesakit *Alzheimer* yang sederhana hingga teruk.

Bagaimana *MEMXA 10mg Tablet* berfungsi

Kehilangan pengingatan dalam penyakit *Alzheimer* adalah disebabkan oleh gangguan isyarat mesej di dalam otak. Otak mengandungi reseptor *N-methyl-D-aspartate (NMDA)* yang terlibat dalam menghantar isyarat saraf yang penting dalam pembelajaran dan ingatan. *MEMXA 10* tergolong dalam kumpulan ubat-ubatan yang dipanggil NMDA reseptor antagonis. *MEMXA 10mg Tablet* bertindak ke atas reseptor NMDA dengan meningkatkan penghantaran isyarat saraf dan ingatan.

Sebelum mengambil *MEMXA 10mg Tablet*

- *Bila tidak boleh mengambil*

- Anda mempunyai alahan terhadap Memantine hydrochloride atau bahan-bahan lain dalam ubat ini (disenaraikan dalam bahan-bahan)
- Tanya doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat
- Beritahu doktor anda jika mengandung atau bersedia untuk mengandung. Penggunaan

Memantine dalam perempuan mengandung adalah tidak digalakkan.

- Jangan menyusu anak jika perempuan mengambil *MEMXA 10mg Tablet*

Kanak-kanak dan remaja

- *MEMXA 10mg Tablet* tidak digalakkan untuk kanak-kanak dan remaja bawah umur 18 tahun.

- *Sebelum anda mula menggunakannya*

Beritahu doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil *MEMXA 10mg Tablet*:

- Jika anda ada sejarah sawan.
- Jika anda baru-baru mengalami sakit jantung, atau tengah mengalami kegagalan jantung kongestif atau daripada tekanan darah tinggi yang tidak terkawal

Dalam situasi ini, rawatan perlu diselia dengan teliti, dan manfaat klinikal *MEMXA 10mg Tablet* dinilai oleh doktor anda secara tetap.

Jika anda mengalami sakit buah pinggang, doktor anda perlu menyelia fungsi buah pinggang anda dengan teliti jika perlu menyesuaikan dos Memantine sewajarnya.

- *Jika mengambil ubat-ubat lain*

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang mengambil, baru-baru ini diambil atau mungkin mengambil sebarang ubat lain.

Khususnya, *MEMXA 10mg Tablet* mungkin berubah kesan ubat-ubatan berikut dan keperluan dos mungkin perlu diselaraskan oleh doktor anda:

- Penggunaan ubat bernama *Amantadine* (untuk rawatan penyakit *Parkinson*), *Ketamine* (ubat biasa digunakan sebagai anestetik), *Dextromethorphan* (biasa digunakan untuk merawat batuk) dan ubat NMDA-antagonis lain pada masa yang sama harus dielakkan.
- *Dantrolene*, *Baclofen*
- *Imeidine*, *Ranitidine*, *Procainamide*, *Quinidine*, *Quinine*, *Nicotine*
- *Hydrochlorothiazide* (atau apa gabungan dengan *Hydrochlorothiazide*)

- *Anticholinergics* (bahan biasa guna untuk rawatan gangguan pergerakan atau kekejangan usus.
- *Anticonvulsants* (bahan guna untuk mencegah dan melegakan sawan)
- *Barbiturates* (bahan biasa guna untuk memudahkan tidur)
- *Dopaminergic agonists* (bahan seperti *L-dopa*, *Bromocriptine*)
- *Neuroleptics* (bahan digunakan untuk rawatan gangguan mental)
- *Oral anticoagulants*

Cara menggunakan *MEMXA 10mg Tablet*

- *Berapa banyak untuk menggunakan*

Sentiasa mengambil ubat ini seperti yang diarahkan oleh doktor anda. Semak dengan doktor atau farmasi anda jika anda tidak pasti.

Dos

Dos yang disyorkan *MEMXA 10mg Tablet* untuk dewasa dan pesakit tua adalah 20mg sekali sehari.

Untuk mengelakan risiko kesan sampingan, dos ini dicapai dengan perlahan-lahan mengikut jadual rawatan:

Minggu 1	Separuh dari tablet 10mg
Minggu 2	Satu tablet 10mg
Minggu 3	Satu setengah tablet 10mg
Minggu 4 dan berikut	Dua tablet 10mg sekali sehari

Dos permulaan biasanya adalah setengah daripada 10mg tablet sekali sehari (5 mg sekali sehari) untuk minggu pertama. Kemudian sehari sebiji 10mg tablet untuk minggu kedua, dan diikuti 1 setengah dan sebiji 10mg tablet sekali sehari (15mg sehari sekali) untuk minggu ketiga. Dari minggu keempat dan seterusnya, dos yang biasa adalah dua 10mg tablet sekali sehari.

Dos dalam pesakit sakit buah pinggang

Jika anda mengalami sakit buah pinggang, doktor anda akan membuat keputusan apa dos yang sesuai dengan keadaan anda. Dalam kes ini, memantau fungsi buah pinggang harus dilakukan oleh doktor anda pada jangka masa yang ditetapkan.

Cara mengambil

MEMXA 10 harus diambil secara mulut sekali sehari. Untuk mendapat manfaat daripada ubat anda, anda perlu mengambil ia kerap setiap hari pada masa yang sama dalam sehari.

- Bila untuk menggunakannya

Sentiasa mengambil ubat ini seperti yang diarahkan oleh doktor anda. Tablet sepatutnya diambil secara telan dengan sedikit air. Tablet boleh diambil dengan atau tanpa makanan.

- Berapa lama untuk menggunakannya

Teruskan pengambilan *MEMXA 10mg Tablet* kerana ia adalah manfaat kepada anda. Doktor anda harus menyelia rawatan anda pada masa yang ditetapkan.

- Jika anda terlupa untuk menggunakannya

Jika anda terlupa untuk mengambil dos *MEMXA 10mg Tablet*, tunggu and ambil dos seterusnya pada masa yang ditetapkan.

Jangan mengambil dua dose untuk menggantikan dos yang terlupa.

- Jika anda menggunakan terlalu banyak (terlebih dos)

Khususnya, mengambil terlalu banyak *MEMXA 10mg Tablet* tidak boleh menyebabkan apa-apa kemudaratan kepada anda. Anda mungkin mengalami peningkatan gejala seperti yang dinyatakan dalam seksyen kesan sampingan.

Jika anda mengambil terlebih dos besar *MEMXA 10mg Tablet*, hubungi doktor anda atau mendapatkan nasihat perubatan kerana anda mungkin memerlukan rawatan perubatan

Semasa anda menggunakannya**- Perkara yang perlu anda lakukan**

Tanya doktor atau ahli farmasi untuk nasihat sebelum mengambil sebarang ubat.

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang mengambil, baru-baru mengambil atau mungkin mengambil ubat lain.

Jika anda masuk hospital, bagitahu doktor anda bahawa anda sedang mengambil *MEMXA 10mg Tablet*.

Jika anda ada sebarang pertanyaan dengan penggunaan ubat ini, Tanya doktor atau ahli farmasi anda.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat atau menukar dos sebelum bertanya doktor anda.

- Perkara yang perlu diperhatikan

Memandu dan menggunakan mesin
Doktor anda akan memberitahu anda sama ada penyakit anda membolehkan anda untuk memandu dan menggunakan mesin dengan selamat. Juga, *MEMXA 10mg Tablet* mungkin berubah kereaktifan anda, membuat memandu atau mengendalikan mesin tidak sesuai

MEMXA 10 dengan makanan dan minuman

- Anda haru memberitahu doktor anda kalau anda baru-baru ini mengubah atau mahu mengubah diet anda dengan ketara (cth. Dari diet biasa ke diet vegetarian yang ketat). Doktor anda mungkin perlu mengubah dos ubat anda
- Jika anda mengalami *renal tubular acidosis* (RTA, kelebihan bahan asid dalam darah disebabkan oleh masalah buah pinggang) atau jangkitan teruk saluran kencing, doktor anda mungkin akan mengubah dos ubat anda.

Kesan sampingan

Seperti semua ubat, *MEMXA 10mg Tablet* juga boleh menyebabkan kesan- kesan sampingan, walaupun tidak semua orang akan mengalaminya. Kesan-kesan sampingan yang paling biasa dilaporkan oleh orang-orang yang mengambil *MEMXA 10mg Tablet* disenaraikan di bawah:

Sakit kepala, mengantuk, sembelit, pening, tekanan darah tinggi Penyakit *Alzheimer* telah dikaitkan dengan kemurungan, cubaan membunuh diri dan membunuh diri

Jika mana-mana kesan sampingan menjadi serius, atau jika anda melihat apa-apa kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam risalah ini, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [*Consumers* → *Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF)* or *Vaccines (AEFI)*].

**Cara penyimpanan dan pelupusan
MEMXA 10mg Tablet****- Penyimpanan**

Simpan di bawah suhu 30 ° C.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi bagaimana untuk melupuskan ubat-ubatan tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu untuk melindungi alam sekitar.

Deskripsi Produk**- Rupa dan warna produk**

Putih, berpusat, tirus bujur, sewaktu dua, filem bersalut tablet dengan berukir MMT di satu pihak dan menjaringkan di pihak yang lain

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif adalah:

Memantine hydrochloride 10mg eq. to Memantine 8.31mg

- Bahan kandungan bukan aktif:

Silicified microcrystalline cellulose (Prosolv SMCC 90), Mannitol, Croscarmellose sodium, Edetate disodium, sodium metabisulfite, Talc, Magnesium stearate, hypromellose (Methocel E15 LV Premium/ HPMC 2910), Titanium dioxide, Polyethylene glycol (PEG 400), Butylated hydroxytoluene, Isopropyl alcohol, Methylene chloride dan purified water

- *No. MAL:*

MAL17117029AZ

Pengilang

UNISON LABORATORIES CO., LTD.
39 Moo 4, Klong Udomcholjorn,
Muang Chachoengsao,
Chachoengsao 24000 Thailand.

Pemegang Pendaftaran Produk

MEDISPEC (M) SDN BHD

B-1-07, Jalan SS 25/22,

Taman Mayang,

47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

Tarikh kemas kini

12/09/2023

Nombor Siri

NPRA(R2/1)230911/1138