

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan *SANBEACETIN® 600* Tablet
2. Bagaimana *SANBEACETIN® 600* Tablet berfungsi
3. Sebelum mengambil *SANBEACETIN® 600* Tablet
4. Cara menggunakan *SANBEACETIN® 600* Tablet
5. Semasa menggunakan *SANBEACETIN® 600* Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *SANBEACETIN® 600* Tablet
8. Deskripsi produk
9. Maklumat lanjut pengilang dan pemegang pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini

Apakah kegunaan

SANBEACETIN® 600 Tablet

SANBEACETIN digunakan untuk rawatan penyakit pernafasan yang dicirikan oleh banyak rembesan yang tebal dan likat: *acute bronchitis*, *chronic bronchitis* (keradangan saluran pernafasan yang membawa udara ke paru-paru) and *its exacerbations* (keadaan yang semakin teruk); *pulmonary emphysema* (kerosakan kepada alveoli dalam paru-paru), *mucoviscidosis* (pengeluaran mukus yang tidak normal dalam paru-paru) dan *bronchieactasis* (pelebaran abnormal saluran pernafasan).

Bagaimana *SANBEACETIN® 600* Tablet berfungsi

Acetylcysteine mempunyai aktiviti fluidification yang kuat terhadap rembesan mukus dan nanah. Ia bertindak dengan mengurangkan keradangan dan meningkatkan kelajuan pertumbuhan semula mukosa.

Sebelum mengambil

SANBEACETIN® 600 Tablet

- Bila tidak boleh mengambil

- Anda mempunyai alahan terhadap *SANBEACETIN® 600*
- Anda mempunyai alahan kepada mana-mana bahan lain dalam *SANBEACETIN® 600*
- Anda adalah kanak-kanak di bawah dua (2) tahun

Jika anda tidak pasti, berbincang dengan doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil *SANBEACETIN® 600*.

- Mengandung dan menyusukan anak

Kategori kehamilan B.

Tidak diketahui sama ada acetylcysteine diedarkan ke dalam susu .

Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk nasihat sebelum mengambil sebarang ubat .

- Sebelum anda mula menggunakannya

Beritahu doktor anda jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk apa-apa yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk apa-apa ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan .

Cara menggunakan

SANBEACETIN® 600 Tablet

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa:

1 effervescent *SANBEACETIN® 600* tablet satu kali sehari (sebaik-baiknya pada waktu malam)

- Bila perlu digunakan

Cairkan 1 effervescent tablet dalam satu gelas air ($\pm$ 200 mL).

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan pengambilan *SANBEACETIN® 600* selama yang doktor anda mencadangkan.

- Jika terlupa menggunakan

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda apa yang harus anda lakukan jika anda terlupa untuk menggunakannya.

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda ingat. Biarkan sahaja dos yang terlepas jika ia hampir masa untuk dos yang dijadualkan berikutnya. Jangan mengambil ubat lebih daripada yang diarahkan oleh doktor

- Jika mengambil berlebihan (lebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anda rasa anda atau sesiapa sahaja mungkin telah mengambil terlalu banyak ubat ini . Tindakan ini harus diambil walaupun tiada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera.

Pengambilan tablet yang terlalu banyak boleh menyebabkan kerengsaan, *pyrosis* (perasaan pedih pada bahagian atas abdomen), sakit perut, loya, muntah-muntah dan cirit-birit.

Semasa anda menggunakannya

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda seperti mana yang diberitahu oleh doktor anda

Beritahu doctor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda mengambil *SANBEACETIN® 600*.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa mengambil ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat kecuali dinasihatkan oleh doktor anda.

Jangan mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor anda.

Jangan berikan *SANBEACETIN® 600* kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom yang sama atau keadaan seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Pesakit dengan masalah gastrik, *SANBEACETIN® 600* perlu diberikan selepas makan.

Kesan sampingan

Tindak balas alahan (hipersensitiviti) telah dilaporkan dalam pesakit yang menerima acetylcysteine, ia termasuklah *bronchospasm* (penyempitan saluran pernafasan), bengkak, ruam dan kegatalan kulit.

Kesan sampingan yang lain dilaporkan dengan acetylcysteine termasuklah rasa loya, muntah-muntah, demam, pengsan, berpeluh, sakit sendi, penglihatan kabur, gangguan fungsi hati.

SANBEACETIN®600 mungkin akan menyebabkan alahan dan reaksi kulit yang teruk. Berhenti menggunakan *SANBEACETIN®600* dan mendapatkan rawatan perubatan dengan segera jika anda mengalami mana-mana gejala seperti berikut:

- Alahan teruk: kesukaran bernafas, pening kepala, kulit bengkak atau ruam.
- Reaksi kulit yang teruk: kemerahan kulit, lepuh, ruam, demam, sakit tekak atau kerengsaan mata.

Sila jumpa dengan doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas mengambil ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan *SANBEACETIN®600 Tablet*

- Penyimpanan
Jauhkan dari jangkauan dan penglihatan kanak-kanak.

Simpan di dalam bekas yang tertutup rapat di bawah 30 ° C dan tempat kering.

- Pelupusan
Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi cara-cara untuk melupuskan ubat-ubatan yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu untuk melindungi alam sekitar.

Deskripsi Produk

- Rupa dan warna produk
SANBEACETIN® 600 adalah tablet bulat rata, putih dengan tempat kuning. 1 tablet dilarutkan dalam 200 mL, larutan yang agak keruh, tidak berwarna dan rasa manis -masam.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif adalah:
Acetylcysteine. Setiap effervescent tablet mengandungi 600 mg acetylcysteine.
- Bahan kandungan bukan aktif:
Bahan kandungan bukan aktif adalah citric acid monohydrate, sodium hydrogen carbonate, propylene glycol 6000, sucralose, orange durarome, beta cyclodextrin dan mannitol DC.

- No. MAL:

MAL16065028XC

Pengilang

PT CAPRIFARMINDO LABS.
JL.Industri Cimareme No.8, Desa Cipeundeuy,
Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Indonesia.

Pemegang Pendaftaran Produk

MEDISPEC (M) SDN BHD
B-1-07, Jalan SS 25/22,
Taman Mayang,
47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

Tarikh kemas kini

26/06/2023

Nombor Siri

NPRA(R2/1)230623/1088