

SISALON 50MG TABLET

Sertraline hydrochloride eq to Sertraline 50mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Sisalon 50
2. Bagaimana Sisalon 50 berfungsi
3. Sebelum mengambil Sisalon 50
4. Cara mengambil Sisalon 50
5. Semasa mengambil Sisalon 50
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Sisalon 50
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Sisalon 50

Sisalon 50 digunakan untuk rawatan gejala kemurungan, gangguan obsesif kompulsif, gangguan panik, gangguan tekanan post-traumatik (PTSD) dan fobia sosial, dan untuk mencegah pengulangan keadaan perubatan yang disebut.

Bagaimana Sisalon 50 berfungsi

Sisalon mengandungi bahan aktif Sertraline dan merupakan salah satu kumpulan ubat yang dipanggil *Selective Serotonin Re-uptake Inhibitors (SSRIs)*; Serotonin adalah salah satu bahan kimia di otak anda yang membantu mengawal mood anda. *Sertraline* menyekat reabsorpsi serotonin oleh sel-sel saraf, sehingga meningkatkan jumlah serotonin di otak anda.

Sebelum mengambil Sisalon 50

- Bila tidak boleh mengambil

- Jika anda alahan kepada sertraline atau mana-mana bahan-bahan lain ubat ini (yang disenaraikan dalam Bahan-bahan)
- Jika anda mengambil atau telah mengambil ubat-ubatan yang dipanggil *Monoamine Oxidase Inhibitors* (MAOI)
- Jika anda mengambil ubat dipanggil *Pimozide* (ubat untuk gangguan mental seperti psikosis).
- Jika anda kanak-kanak.

- Mengandung atau menyusukan anak

Jangan mengambil Sisalon 50 jika anda hamil, cuba untuk hamil atau fikir anda mungkin hamil.

Jangan mengambil Sisalon 50 jika anda sedang menyusukan bayi. Tanya doktor

atau ahli farmasi anda untuk nasihat sebelum mengambil sebarang ubat.

- Sebelum anda mula menggunakannya

Beritahu doktor anda sebelum anda mengambil Sisalon 50, jika anda mengalami atau telah mengalami pada masa lalu dari mana-mana syarat-syarat berikut:

- Jika anda mempunyai epilepsi atau sejarah sawan.
- Jika anda telah mengalami penyakit kemurungan manik (gangguan apabila anda mengalami tempoh kebahagiaan dan kemurungan) atau skizofrenia (dicirikan oleh pengeluaran daripada realiti, corak tidak logik pemikiran, khayalan dan halusinasi).
- Jika anda mempunyai atau pernah mempunyai pemikiran mencederakan/membunuh diri sendiri.
- Sekiranya anda mempunyai Sindrom Serotonin seperti suhu badan tinggi, agitasi, refleks meningkat, gegaran, berpeluh, perluasan anak-mata, dan cirit-birit atau Sindrom *Neuroleptic Malignant* seperti demam, ketegangan otot, dan perubahan status mental.
- Jika anda mempunyai atau dengan sejarah gangguan pendarahan
- Jika anda mempunyai masalah buah pinggang atau hati.
- Jika anda mempunyai masalah jantung.
- Jika anda mempunyai tahap sodium yang rendah dalam darah anda.
- Jika anda seorang warga tua.
- Jika anda mempunyai diabetes (gula darah tinggi).

Jika anda mengambil *Sisalon 50* pada penghujung kehamilan anda, mungkin terdapat peningkatan risiko pendarahan dari faraj yang banyak sejurus selepas kelahiran, terutamanya jika anda mempunyai sejarah gangguan pendarahan. Doktor anda harus sedar bahawa anda mengambil *Sisalon 50* supaya mereka boleh menasihati anda.

- Mengambil ubat-ubatan lain

Beritahu doktor anda jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk apa-apa yang anda beli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Mengambil *Sisalon 50* bersama-sama dengan ubat-ubatan berikut boleh menyebabkan kesan sampingan yang serius:

- *Monoamine Oxidase Inhibitors* (MAOIs) - tidak boleh digunakan bersama-sama dengan sertraline atau dalam tempoh 14 hari dari tarikh pemberhentian dengan MAOI atau sekurang-kurangnya 14 hari harus dibenarkan selepas berhenti sertraline sebelum memulakan MAOI.
- intravena *Diazepam*
- *Digitoxin* dan *Warfarin*
- *Lithium*
- *Tricyclic antidepressants* dan Jenis *IC antiarrhythmics*, *Propafenone*, dan *Flecainide*.

Cara menggunakan Sisalon 50

- Berapa banyak harus digunakan

Ikut semua arahan yang diberikan oleh doktor dan ahli farmasi anda dengan teliti. Mereka mungkin berbeza daripada maklumat yang terkandung di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label, bertanya kepada doktor atau ahli farmasi anda untuk bantuan.

Kemurungan dan *Obsessive-Compulsive Disorder*: Satu dos 50mg/hari disyorkan sebagai dos awal. Dos harian boleh dinaikan setiap 50 mg pada selang waktu sekurang-kurangnya satu minggu dalam tempoh beberapa minggu. Dos maksimum yang disyorkan adalah 200mg/hari.

Gangguan Panik, Gangguan Kecemasan Sosial dan Gangguan Tekanan Pos Traumatik: Rawatan Sertraline perlu dimulakan dengan dos 25mg sekali sehari, dan meningkat kepada 50mg/hari selepas satu minggu.

Dos harian boleh dinaikan setiap 50mg dalam tempoh beberapa minggu. Dos maksimum yang disyorkan adalah 200 mg/hari.

Dos pengekalan: Semasa terapi jangka panjang untuk apa-apa indikasi, dos harus dikekalkan pada dos yang paling rendah dan anda perlu dikaji semula secara berkala untuk menentukan keperluannya rawatan berterusan.

- Bila untuk menggunakannya

Gunakan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi.

SISALON 50MG TABLET

Sertraline hydrochloride eq to Sertraline 50mg

Sisalon 50 perlu diambil sekali sehari, sama ada pada waktu pagi atau petang dengan makanan atau tiada.

- Berapa lama untuk menggunakannya

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doctor anda

- Jika anda terlupa untuk menggunakannya

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini. Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat, dengan syarat bahawa anda tidak menggunakan lebih daripada dos yang disyorkan dalam masa 24 jam.

Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika anda menggunakan terlalu banyak (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anda fikir anda atau sesiapa sahaja mungkin telah mengambil terlalu banyak ubat ini. Lakukan ini walaupun tidak ada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera.

Mengambil terlalu banyak tablet boleh menyebabkan kematian. Gejala berlebihan termasuk mengantuk, loya, muntah, tachycardia (peningkatan denyutan jantung), gegaran, agitasi dan pening

Semasa anda menggunakannya

- Perkara yang perlu anda lakukan

Ambil ubat anda seperti yang doktor anda telah memberitahu anda.

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda mengambil Sisalon 50.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa mengambil ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat kecuali dinasihatkan oleh doktor anda.

Jangan mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor anda.

Jangan berikan Sisalon 50 kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom yang sama atau keadaan seperti anda.

- Perkara yang perlu diperhatikan

Memandu dan mengendalikn mesin

Ubat ini boleh menjejaskan keupayaan anda untuk memandu atau mesin digunakan. Jika tablet membuat anda merasa sakit, pening atau letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau menggunakan mesin dan hubungi doktor anda dengan segera.

Ubat seperti Sisalon 50 (dipanggil SSRI/SNRI) boleh menyebabkan gejala kegagalan fungsi seksual. Dalam sesetengah kes, gejala ini berterusan selepas rawatan dihentikan.

Kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, Sisalon 50 boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapat mereka.

Berjumpalah dengan doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas mengambil ubat ini.

Kesan-kesan sampingan dilaporkan termasuk rasa loya, cirit-birit, mulut kering, senak, anoreksia, pening, gementar, insomnia, disfungsi seksual, peningkatan berpeluh, peningkatan kadar jantung, penglihatan yang tidak normal, sakit perut, sembelit, sakit dada, keletihan, demam, reaksi alergi, penurunan atau peningkatan berat badan, keradangan kolon (menyebabkan cirit-birit) dan lain-lain.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers* → *Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF)* or

Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Sisalon 50

- Penyimpanan

Jauhkan dari jangkauan dan penglihatan kanak-kanak.

Simpan di bawah 30 ° C.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat-ubatan tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu untuk melindungi alam sekitar.

Deskripsi Produk

- Rupa dan warna produk

Tablet putih, bujur, dwicembung, bersalut filem dengan berukir S L pada satu permukaan dan 50 di permukaan lain yang garis skor.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif adalah:
Sertraline hydrochloride eq to Sertraline 50mg.

- Bahan kandungan bukan aktif:

Microcrystalline cellulose (Avicel PH 101), Dibasic calcium phosphate dehydrate, Croscarmellose sodium, Sodium starch glycolate, Propylene glycol, Povidone (PVP K-90), Colloidal silicon dioxide, Magnesium stearate, Hypromellose (Pharmacoat 615), Titanium dioxide, Talc, Simithicone emulsion 30%, dan Polyethylene glycol (PEG 6000)

- No. MAL:

MAL18116061AZ

Pengilang

UNISON LABORATORIES CO. LTD
39 Moo 4, Klong Udomcholjorn,
Muang Chachoengsao,
Chachoengsao 24000 Thailand.

Pemegang Pendaftaran Produk

MEDISPEC (M) SDN BHD
55 & 57, Lorong Sempadan 2
(Off Boundary Road)
1400 Ayer Itam, Penang, Malaysia

SISALON 50MG TABLET

Sertraline hydrochloride eq to Sertraline 50mg

Tarikh kemas kini

17/10/2025

Nombor siri

NPRA(R2/2)230222/1019