

VULTIN 600MG TABLET

Gabapentin (600mg)

Risalah Maklumat Ubat untuk Pesakit (RiMUP)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan *Vultin 600*
2. Bagaimana *Vultin 600* berfungsi
3. Sebelum mengambil *Vultin 600*
4. Cara menggunakan *Vultin 600*
5. Semasa menggunakan *Vultin 600*
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *Vultin 600*
8. Deskripsi produk
9. Maklumat lanjut pengilang dan pemegang pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini

Apakah kegunaan *Vultin 600*

Vultin 600 digunakan

- Sebagai terapi tambahan dalam rawatan sawan separa (berlaku di dalam kawasan otak yang terhad dengan atau tanpa generalisasi sekunder (mempengaruhi seluruh otak) di kalangan orang dewasa dan kanak-kanak berumur 3 tahun dan ke atas.
- Untuk merawat sakit neuropatik (sakit yang disebabkan oleh kerosakan saraf) yang termasuk neuropati diabetik (kerosakan saraf kencing manis), postherpetik neuralgia (sakit saraf pada bahagian badan yang sebelum ini mengalami jangkitan kayap) dan neuralgia trigeminal (sakit di bahagian muka) di kalangan orang dewasa umur 18 tahun ke atas.

Bagaimana *Vultin 600*

berfungsi

Ubat ini tergolong dalam kumpulan ubat antikonvulsan. Ubat ini dikatakan berfungsi dengan mengawal bahan kimia dalam otak yang menghantar isyarat-isyarat ke saraf untuk mengawal sawan dan sakit neuropatik.

Sebelum mengambil *Vultin 600*

- Bila tidak boleh mengambil

Jangan ambil ubat ini jika:

- Anda alah terhadap *Vultin 600* atau mana-mana eksipien
- Anak anda mengalami epilepsi dan berumur di bawah 3 tahun
- Anak anda mengalami sakit neuropatik dan berumur di bawah 18 tahun.

- Sebelum anda mula menggunakannya
Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika:

- Anda alah terhadap ubat-ubat lain, ubat antikonvulsan atau mana-mana makanan, pengawet atau bahan pewarna
- Anda mempunyai sawan *absence* (keadaan “blinking out” atau memandang kosong untuk tempoh yang singkat)
- Anda hamil atau merancang untuk hamil atau anda hamil ketika anda mengambil gabapentin.
- Anda sedang menyusukan bayi atau merancang untuk menyusukan bayi. Gabapentin dikumuhkan dalam susu ibu.
- Anda mempunyai masalah buah pinggang, masalah sistem saraf, masalah pernafasan, atau anda lebih dari 65 tahun umur, doktor anda mungkin akan bagi dose rejimen yang berbeza.
- Anda sedang atau baru baru ini pernah mengambil apa-apa ubat untuk sawan, masalah tidur, kemurungan, kebimbangan, atau sebarang masalah neurologi atau psikiatri lain.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda mengambil ubat-ubatan lain, termasuk yang dibeli tanpa preskripsi di farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan. Sesetengah ubat akan mengganggu fungsi bahan aktif yang ada pada *Vultin 600*. Antaranya:

- Morphine
- Antasid, ubat yang mengandungi aluminium dan magnesium
- Cimetidine

Interaksi lain yang tidak tersenarai mungkin berlaku. Rujuk doktor atau ahli farmasi jika anda mempunyai sebarang pertanyaan.

Cara menggunakan *Vultin 600*

- Berapa banyak untuk menggunakan

Ikut arahan yang diberi oleh doktor dan farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin akan berbeza daripada informasi kandungan risalah ini. Jika anda tidak memahani arahan pada label, tanya doktor atau farmasi anda.

Dewasa dan kanak-kanak berumur 12 tahun ke atas:

900 sehingga 3600 mg/hari, dibahagi kepada 3 dos.

Kanak-kanak berumur 3-12 tahun:

Dos permulaan adalah dari 10 hingga 15/mg/kg/hari.

Dewasa dengan sakit neuropatik:

900 mg hingga 3600 mg/hari

Pesakit dengan masalah buah pinggang:

Pelarasan dos adalah disyorkan.

Doktor akan menyelaraskan dos anda bermula daripada dos rendah dan meningkat dengan perlahan-lahan kepada dos paling minimum yang diperlukan untuk mengawal sawan atau sakit neuropatik anda.

Telan kapsul dengan segelas penuh air.

- Bila untuk menggunakannya

Ubat ini boleh diambil sebelum atau selepas makan.

Jika anda mengambil ubat ini 3 kali sehari, jangan biar tempoh di antara waktu untuk makan ubat melebihi 12 jam.

- Berapa lama untuk menggunakannya

Terus mengambil *Vultin 600* selama yang doktor anda mencadangkan.

- Jika anda terlupa untuk menggunakannya

Jika anda terlupa untuk mengambil satu dos, ambil sebaik sahaja anda ingat selain ia tiba masa untuk dos seterusnya. Jangan mengambil dua dos untuk menggantikan dos yang terlepas.

- Jika anda menggunakan terlalu banyak (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anda ingin anda atau sesiapa mungkin mengambil berlebihan dos. Melakukan ini walaupun tidak ada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan yang segera.

Anda mungkin mengalami gejala-gejala berikut jika anda mengambil berlebihan:

- Pening

- Pertuturan tidak jelas
- Penglihatan berganda
- Mengantuk
- Kelesuan (selalunya letih/lemah)
- Cirit-birit ringan

Semasa anda menggunakannya

- Perkara yang perlu anda lakukan

Ambil ubat anda seperti doktor anda telah memberitahu anda.

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda mengambil *Vultin 600*

Ingatkan doktor atau pegawai farmasi bahawa anda sedang mengambil ubat ini atau anda akan mula mengambil ubat lain.

Beritahu doktor jika:

- Anda mempunyai pemikiran membunuh diri atau mencederakan diri sendiri, perubahan dalam mood dan tingkah laku, atau tanda-tanda kemurungan
- Anda hamil

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti ubat ini atau menukar dos sendiri selain dinasihat oleh doctor anda.

Jangan ambil ubat baru tanpa perundingan dengan doctor anda.

Jangan memberi *Vultin 600* kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom yang sama atau keadaan seperti yang anda.

- Perkara yang perlu diperhatikan

Memandu dan menggunakan mesin

Ubat ini boleh menjejaskan keupayaan anda untuk memandu atau menggunakan mesin. Jika tablet membuat anda merasa sakit, pening atau letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mesin penggunaan dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan sampingan

Seperti semua ubat, *Vultin 600* boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua akan mengalaminya.

Jumpa doctor atau farmasi anda segera jikalau anda mengalami mana-mana

kesan sampingan selepas mengambil ubat ini.

Kesan sampingan termasuk:

- Kesakitan otot
- Cemerlap dan ketidakstabilan
- Oergerakan mata ke arah depan dan belakang yang berterusan dan tidak terkawal dan/atau pergerakan mata bergolek-golek
- Pening, kelesuan
- Edema periferi (pembengkakan di tangan, kaki/bahagian bawah kaki)
- Mengantuk
- Terketar-ketar
- Penglihatan abnormal contohnya penglihatan kabur dan penglihatan berganda.
- Kekeliruan
- Kemurungan
- Gemuruh

Kesan-kesan sampingan lain yang tidak tersenarai mungkin berlaku. Beritahu doktor dengan segera.

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat and ajika anda mengalami masalah pernafasan seperti pernafasan yang lambat, cetek atau lemah selepas mengambil ubat ini kerana ini mungkin tanda kesesakan pernafasan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan *Vultin 600*

- Penyimpanan

Jauhkan daripada kanak-kanak
Simpan di bawah suhu 30 ° C.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Deskripsi Produk

- Rupa dan warna produk

Putih, bujur, dwicembung, filem disalut dengan terukir GBP 600 pada satu permukaan dan skor pembahagi dua sama di satu lagi permukaan.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif adalah:
Gabapentin 600mg

- Bahan kandungan bukan aktif:
Calcium carbonate, Croscarmellose sodium, Edetate disodium, Sodium metabisulfite, Povidone (PVP K-90), Dibasic sodium phosphate, Butylated hydroxytoluene, Isopropyl alcohol, Sodium lauryl sulfate, Magnesium stearate, Hypromellose (MPMC 2910), Propylene glycol dan Methylene Chloride

- No. MAL:

MAL18046141AZ

Pengilang

UNISON LABORATORIES CO., LTD
39 Moo 4, Klong Udomcholjorn,
Muang Chachoengsao,
Chachoengsao 24000 Thailand

Pemegang Pendaftaran Produk

MEDISPEC (M) SDN BHD
55 & 57, Lorong Sempadan 2,
11400 Ayer Itam, Penang,
Malaysia

Tarikh kemaskini RIMUP

30/08/2024

Nombor siri

NPRA(R2/1)201217/579