

Avadol-Fast Tablet 500mg

Paracetamol 500 mg

Apakah yang ada pada risalah ini?

1. Apakah kegunaan Avadol-Fast
2. Bagaimana Avadol-Fast berfungsi
3. Sebelum mengambil Avadol-Fast
4. Cara mengambil Avadol-Fast
5. Semasa mengambil Avadol-Fast
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara Penyimpanan dan pelupusan
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang & Pemegang pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

1. Apakah kegunaan Avadol-Fast

Avadol-Fast digunakan untuk melegakan demam, kesakitan dari ringan kepada sederhana termasuk: sakit kepala, migrain, sakit belakang, sakit otot, myalgia, senggugut, sakit osteoarthritis, sakit gigi, ketidakselesaan dari selsema, dan sakit tekak.

2. Bagaimana Avadol-Fast Berfungsi

Avadol-Fast diserap dengan cepat melalui pengambilan dari mulut. Ia diserap dalam usus kecil. Paracetamol juga dikumuh dengan cepat melalui urin.

3. Sebelum mengambil Avadol-Fast

-Bila tidak boleh mengambil

Jika anda

- hipersensitiviti terhadap paracetamol atau bahan-bahan yang terkandung dalam produk ini.
- sedang mengambil ubat lain yang juga mengandungi paracetamol
- menghadapi kemerosotan fungsi hati yang teruk

-Sebelum mula mengambil

Semak dengan doktor anda, jika anda

- menghidapi sebarang penyakit ginjal atau hati, termasuk penyakit hati alkohol.
- menghidapi arthritis yang sederhana dan perlu mengambil ubat tahan sakit setiap hari
- mempunyai buah pinggang atau hati yang lemah.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda ada mengambil ubat-ubatan lain seperti

- Anti-pembeku (seperti warfarin) dan anda perlu mengaambil ubat tahan sakit setiap hari
- Ubat-ubatan lain yang anda sedang guna, seperti ubat dibeli tanpa preskripsi

Hamil dan penyusuan anak

Kegunaan dalam Kehamilan:

- Dianggap pilihan analgesic terhadap pesakit yang hamil.
- Walaupun ia akan melalui plasenta, paracetamol dianggap selamat dalam normal dos terapeutic untuk tempoh yang pendek sebagai minor analgesic/antipiretik dalam kehamilan.

Kegunaan dalam penyusuan:

- Didapati dalam susu ibu jika ibu menggunakan.
- Pengambilan paracetamol mengikut dos terapeutik oleh ibu, tidak akan membawa risiko kepada bayi yang diberi susu.

Memandu kereta dan mengendali mesin
Paracetamol mempunyai potensi yang kecil untuk menjejaskan keupayaan seseorang pesakit mengendali mesin atau memandu.

4. Cara mengambil Avadol-Fast

-Berapa banyak harus digunakan

Dewasa: Ambil 1-2 biji untuk 3 atau 4 kali sehari. Maximum: 8 biji sehari.

Tidak sesuai untuk kanak-kanak.

-Bila perlu ambil

Avadol-Fast patut ditelan dengan air.

-Berapa lama perlu diambilkan

Tempoh rawatan ditentukan oleh doktor anda

-Jika terlupa mengambil

Ambil dos yang seterusnya. Jangan mengambil dos berganda untuk mengganti dos yang terlupa ambil.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

5. Semasa mengambil Avadol-Fast

-Perkara yang perlu dilakukan

Simpan RiMUP, anda mungkin perlu membaca semula. Jika anda ada sebarang pertanyaan, sila tanya doktor atau ahli farmasi.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Ubat ini adalah preskripsi untuk anda sahaja. Jangan bagi orang lain. Ia mungkin tidak sesuai untuk orang lain walaupun mereka mempunyai simptom-simptom yang sama.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Jangan mengambil melebihi dos yang disyorkan. Jika simptom-simptom kekal (jika kesakitan tersebut mengekal 10 hari ke atas) atau sakit kepala kekal, sila jumpa doktor anda.

6. Kesan-kesan Sampingan

Kesan-kesan sampingan paracetamol adalah jarang dan biasanya ringan, walaupun reaksi hematologic pernah dilaporkan. Tindak balas hipersensitiviti kulit termasuk ruam kulit, angioedema, *Stevens Johnson Syndrome/ Toxic Epidermal Necrolysis* telah dilaporkan.

Amaran alahan: Paracetamol mungkin menyebabkan reaksi kulit yang serius. Simptom-simptom termasuk kemerahan kulit, lepuh dan ruam. Jika berlaku simptom-simptom tersebut, sila berhenti dan mendapatkan rawatan segera.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumer → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Avadol-Fast Tablet 500mg

Paracetamol 500 mg

7. Cara Penyimpanan and Pelupusan

-Penyimpanan

Simpan bawa 30°C. Jangan menggunakan jika tarikh yang dicetak pada komponen pembungkusan telah luput.

-Pelupusan

Ubat tidak boleh dilupuskan melalui air buangan atau buangan isi rumah. Sila bertanya kepada ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat yang tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi persekitaran.

Jauhi daripada kanak-kanak

8. Maklumat Lanjut

-Rupa and warna produk

Tablet, berbentuk bulat, berwarna putih dengan 500 pada satu permukaan, dan licin pada permukaan belakang.

-Bahan-bahan kandungan

Bahan Aktif: Paracetamol

Bahan tidak aktif:

Sodium starch glycolate, sodium lauryl sulphate, pre-gelatinised starch, plasdone, colloidal silica dan magnesium stearate.

-Nombor Pendaftaran

**Avadol-Fast Tablet 500mg
(MAL15125042XZ)**

9. Pengilang & Pemegang pendaftaran produk

AV Manufacturing Sdn. Bhd. (667760-v)
Lot 10621(PT16700), Jalan Permata 2,
Arab Malaysian Industrial Park
71800 Nilai, Negeri Sembilan.

10. Tarikh kemaskini RiMUP

03 May 2024

Nombor siri

NPRA(R2/1) 220726/923