

REXOMTM FOLIC ACID TABLET

Folic Acid (5mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan REXOMTM Folic Acid
2. Bagaimana REXOMTM Folic Acid berfungsi
3. Sebelum menggunakan REXOMTM Folic Acid
4. Cara menggunakan REXOMTM Folic Acid
5. Semasa menggunakan REXOMTM Folic Acid
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan REXOMTM Folic Acid
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan REXOMTM Folic Acid

Untuk pencegahan dan rawatan kekurangan folate dan pencegahan kecacatan tiub neural pada janin.

Bagaimana REXOMTM Folic Acid berfungsi

REXOMTM Folic Acid mengandungi asid folik, vitamin yang tergolong di dalam kumpulan vitamin B yang penting dalam penghasilan dan pengekalan sel-sel darah baharu.

Sebelum menggunakan REXOMTM Folic Acid

-Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil REXOMTM Folic Acid jika anda:

- hipersensitif kepada asid folik atau bahan-bahan lain yang terkandung di dalam produk ini.
- mempunyai sel darah merah yang rendah dan lain-lain kekurangan vitamin B12.
- mempunyai kanser
- mempunyai masalah intoleransi gula.

-Sebelum menggunakan ubat ini

Mengandung dan menyusukan anak

Berbincang dengan doktor anda sebelum mengambil ubat ini jika anda mengandung, mungkin mengandung atau menyusukan anak.

Penggunaan semasa mengandung selalunya bermanfaat. Asid folik dirembeskan ke dalam susu badan.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil ubat ini, termasuk mana-mana yang anda dapatkan tanpa preskripsi dari kedai farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan anda.

Sesetengah ubat lain dan REXOMTM Folic Acid mungkin boleh mengganggu tindakan satu sama lain. Sebagai contoh :

- Anti-sawan termasuk *phenytoin*, *sodium valproate*, *carbamazepine* dan *barbiturates*.
- Antibiotik seperti *chloramphenicol* dan *trimethoprim/sulfamethoxazole*
- Terapi litium
- Ubat bius nitrous oxide
- Etanol dan aspirin

Cara menggunakan REXOMTM Folic Acid

-Berapa banyak harus diambil

Sentiasa gunakan REXOMTM Folic Acid seperti yang ditetapkan oleh doktor anda.

Anda perlu menyemak dengan doktor atau ahli farmasi jika tidak pasti.

Dos biasa

Untuk pencegahan dan rawatan kekurangan folate.

Dewasa:

Dimulakan dengan: 2 – 4 tablet setiap hari selama 14 hari, atau sehingga respons yang mencukupi diperolehi.

Dos dikekalkan dengan: Setengah sehingga 2 tablet setiap hari.

Kanak-kanak sehingga umur 1 tahun: 0.25mg/kg setiap hari.

1 – 5 tahun: Setengah tablet setiap hari

6 – 12 tahun: 1 tablet setiap hari

Untuk pencegahan kecacatan tiub neural pada janin:

1 tablet setiap hari dimulakan sebelum kehamilan dan berterusan sehingga trimester pertama.

-Bila perlu digunakan

Ambil seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

-Berapa lama perlu digunakan

Gunakan REXOMTM Folic Acid seperti yang disyorkan oleh doktor anda. Jika gejala berterusan, dapatkan nasihat doktor anda.

-Jika terlupa mengambil

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, tunggu sehingga sampai masa untuk mengambil dos seterusnya dan abaikan dos yang tertinggal. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika mengambil berlebihan (terlebi dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa telah terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang tanda keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan REXOMTM Folic Acid

-Perkara yang perlu dilakukan

- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan REXOMTM Folic Acid.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan ambil dos lebih daripada yang disarankan melainkan diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan ambil sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan berkongsi REXOMTM Folic Acid dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama.

REXOMTM FOLIC ACID TABLET

Folic Acid (5mg)

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Produk ini tidak sesuai untuk wanita hamil yang sihat dan memerlukan dos yang lebih rendah, tetapi untuk wanita hamil yang mengalami kekurangan asid folik atau wanita yang berisiko mengalami kecacatan tiub neural berulang.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, REXOMTM Folic Acid boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mengalaminya.

Jika kesan-kesan sampingan berterusan, jangan ambil ubat ini dan rujuk doktor.

Kesan sampingan yang berkaitan dengan penggunaan asid folik termasuk:

- Gangguan gastrousus: gangguan makan, loya ketidakselesaan abdomen dan kembung perut.
- Gangguan sistem imun: tindak balas alahan yang terdiri daripada kemerahan atau kegatalan pada kulit, ruam, sesak nafas dan alergi yang serius.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan REXOMTM Folic Acid

-Penyimpanan

Pastikan bekas ditutup ketat. Simpan di bawah suhu 30°C. Lindungi daripada haba dan cahaya.

Jauhi ubat daripada kanak-kanak.

-Pelupusan

Ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Dapatkan maklumat daripada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Tablet bulat berwarna kuning dengan garis skor di bahagian atas.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Asid folik

- Bahan-bahan tidak aktif

Lactose monohydrate, magnesium stearate, corn starch dan deionised water.

-Nombor MAL

MAL19911375XZ

Pengilang dan Pemegang

Pendaftaran Produk

KCK Pharmaceutical Industries Sdn. Bhd.

Plot 61, Bayan Lepas Industrial Park Phase 4, Lintang Bayan Lepas 1, 11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

29/12/2025

Nombor Siri:

NPRA(R4/1)151222/00116