

REXOMTM WINA ANTISEPTIC LIQUID

Chlorhexidine Gluconate/Cetrimide (0.3% w/v / 3.0% w/v)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan REXOMTM Wina Antiseptic
2. Bagaimana REXOMTM Wina Antiseptic berfungsi
3. Sebelum menggunakan REXOMTM Wina Antiseptic
4. Cara menggunakan REXOMTM Wina Antiseptic
5. Semasa menggunakan REXOMTM Wina Antiseptic
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan REXOMTM Wina Antiseptic
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan REXOMTM Wina Antiseptic

Ia digunakan sebagai antiseptik untuk luka akibat terbakar yang ringan, luka dan ruam. Juga digunakan untuk membasmi kuman biasa, membasmi kuman di rumah dan kebersihan diri.

Bagaimana REXOMTM Wina Antiseptic berfungsi

REXOMTM Wina Antiseptic mengandungi dua antiseptik yang membantu menghilangkan bakteria dan mencegah jangkitan.

Sebelum menggunakan REXOMTM Wina Antiseptic

-Bila tidak boleh menggunakan

Ia tidak sepatutnya digunakan jika anda hipersensitif kepada *chlorhexidine gluconate* dan *cetrimide* atau komponen lain dalam formulasi ini.

-Sebelum menggunakan ubat ini

Hipersensitiviti terhadap *chlorhexidine gluconate* dan *cetrimide* mungkin berlaku selepas penggunaan dalam jangka masa panjang dan berulang.

Mengandung dan menyusukan anak

Berbincang dengan doktor anda sebelum mengambil ubat ini jika anda mengandung, mungkin mengandung atau menyusukan anak.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil ubat ini,

termasuk ubat-ubatan yang anda perolehi tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan anda.

Cara menggunakan REXOMTM Wina Antiseptic

-Berapa banyak harus digunakan

Sentiasa gunakan REXOMTM Wina Antiseptic seperti yang disyorkan.

Dos biasa

Kebersihan diri, luka dan luka akibat terbakar: cairkan 1 penutup penuh (10 ml) dalam 125 ml air.

Disinfektan rumah: cairkan 1 penutup penuh (10 ml) dalam 250 ml air.

Semasa menggunakan REXOMTM Wina Antiseptic

-Perkara yang perlu dilakukan

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan REXOMTM Wina Antiseptic

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan ambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan berkongsi REXOMTM Wina Antiseptic dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Rexom Wina Antiseptic Liquid mengandungi *chlorhexidine*. Maklumkan kepada penasihat perubatan anda jika anda mempunyai alergi terhadap *chlorhexidine*.

Berhenti menggunakan produk ini dan dapatkan bantuan perubatan segera sekiranya anda mengalami ruam, gatal, bengkak, kesukaran bernafas, pening kepala atau degupan jantung yang cepat.

Elakkan terkena mata dan telinga. Sekiranya terdapat kerengsaan, hentikan penggunaannya.

Cuci mata dengan air secara terbuka sekurang-kurangnya sepuluh minit jika

berlaku percikan secara langsung dan dapatkan nasihat perubatan.

Sekiranya tertelan, bilas mulut dengan air dan minum susu atau air dengan banyak; dapatkan nasihat perubatan dan tunjukkan bekas produk kepada doktor.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, REXOMTM Wina Antiseptic boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mengalaminya.

Antara kesan sampingannya:

- Masalah system imuniti: Hipersensitiviti termasuk reaksi alergik.
- Kesan kimia terbakar pada bayi baru lahir.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan REXOMTM Wina Antiseptic

-Penyimpanan

Simpan dibawah 30°C. Pastikan penutup ditutup ketat. Lindungi daripada cahaya.

Jauhi ubat daripada kanak-kanak.

-Pelupusan

Ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Dapatkan maklumat daripada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Larutan oren yang jelas.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Chlorhexidine Gluconate (0.3% w/v) dan *Cetrimide* (3.0% w/v)

- Bahan-bahan tidak aktif

REXOMTM WINA ANTISEPTIC LIQUID

Chlorhexidine Gluconate/Cetrimide (0.3% w/v / 3.0% w/v)

Orange red, Botanical astringent essence, Isopropyl alcohol dan Purified water.

-Nombor MAL

MAL19991207X

Pemegang Pendaftaran Produk
KCK Pharmaceutical Industries Sdn.
Bhd.

Plot 61, Bayan Lepas Industrial Park
Phase 4, Lintang Bayan Lepas 1,
11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang,
Malaysia.

Pengilang
KCK Pharmaceutical Industries Sdn.
Bhd.

No. 5 & 7 Hala Beringin,
Diamond Valley Industrial Park,
11960 Bayan Lepas,
Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP
24/01/2025

Nombor Siri
NPRA(R2/3)250120/1408