

ALLER SYRUP 2.5MG/5ML

Chlorpheniramine Maleate (2.5mg/5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Aller Syrup
2. Bagaimana Aller Syrup berfungsi
3. Sebelum mengambil Aller Syrup
4. Cara mengambil Aller Syrup
5. Semasa menggunakan Aller Syrup
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RIMUP

Apakah kegunaan Aller Syrup

Digunakan untuk rawatan simptomatik alahan akibat demam alahan (bersin dan hidung berair akibat selesema), urtikaria (ruam gatal dan merah yang timbul pada kulit) dan iritasi kulit.

Bagaimana Aller Syrup berfungsi

Bahan aktif Aller Syrup, chlorpheniramine maleate adalah antihistamina. Histamina adalah bahan kimia yang dirembeskan ke dalam badan semasa berlaku reaksi alergik. Ia menyebabkan kegatalan dan inflamasi.

Chlorpheniramine berfungsi dengan menyekat kesan histamina ini, mengurangkan tindak balas alahan dan seterusnya meredakan gejala alahan tersebut.

Sebelum menggunakan Aller Syrup

-Bila tidak boleh menggunakan

- Jangan menggunakan Aller Syrup jika:
- anda mempunyai hipersensitif kepada antihistamina atau sebarang bahan di dalam sirap ini.
 - anda mengambil ubat yang dikenali sebagai 'perencat monoamine oxidase' (MAOIs) (diambil untuk merawat kemurungan), atau anda telah mengambil ubat tersebut dalam masa 14 hari sebelumnya.

-Mengandung dan penyusuan

Aller Syrup tidak boleh diambil semasa mengandung melainkan dianggap penting oleh doktor.

Chlorpheniramine maleate dan antihistamina yang lain boleh menghalang pengeluaran susu dan mungkin dirembeskan ke dalam susu

badan. Tidak boleh digunakan melainkan dianggap penting oleh doktor.

-Sebelum menggunakan ubat ini

Beritahu doktor anda jika:

- anda hamil atau merancang untuk hamil.
- anda sedang atau merancang untuk menyusukan bayi

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Anda perlu memberitahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil ubat-ubatan di bawah kerana ia boleh berinteraksi dengan Aller Syrup.

Ini termasuk:

- Hipnotik atau *anxiolytics* - untuk merawat gangguan panik
- phenytoin, untuk merawat penyakit epilepsi (sawan)
- Monoamine oxidase inhibitor (MAOI) (ubat untuk merawat kemurungan)

Cara mengambil Aller Syrup

-Berapa banyak harus diambil

Sentiasa gunakan Aller Syrup seperti yang ditetapkan oleh doktor anda. Anda perlu menyemak dengan doktor atau ahli farmasi jika tidak pasti.

Dos biasa

Dewasa: 4mg, setiap 4-6 jam.

Maksimum: 24mg/hari.

Kanak-kanak 6-12 tahun: 2mg, setiap 4-6 jam. Maksimum: 12mg/hari.

Kanak-kanak 2-5 tahun: 1mg, setiap 4-6 jam. Maksimum: 6mg/hari.

-Bila perlu diambil

Ambil seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

-Berapa lama perlu diambil

Teruskan pengambilan Aller Syrup seperti yang dicadangkan oleh doktor anda. Jika gejala berterusan, dapatkan nasihat doktor anda.

-Jika terlupa mengambil

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, tunggu sehingga sampai masa untuk mengambil dos seterusnya dan abaikan dos yang tertinggal. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa telah terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Simptom-simptom terlebih dos termasuk:

- kesan antikolinergik - cemerlap atau tidak stabil, mulut, hidung atau tekak kering yang teruk, muka memerah atau merah, sesak nafas atau pernafasan bermasalah
- Kemurungan CNS - mengantuk teruk
- Rangsangan CNS – halusinasi, sawan, masalah tidur
- tekanan darah rendah yang teruk – terasa seperti pita
- aritmia jantung - degupan jantung yang cepat atau tidak teratur

Semasa menggunakan

-Perkara yang perlu dilakukan

- Beritahu ahli farmasi atau doktor anda sekiranya simptom berterusan selepas mengambil ubat ini.
- Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Aller Syrup
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan ambil dos lebih daripada yang disarankan melainkan diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan ambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

ALLER SYRUP 2.5MG/5ML

Chlorpheniramine Maleate (2.5mg/5ml)

- Jangan berkongsi dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Ubat ini boleh menyebabkan rasa mengantuk dan mengurangkan kosentrasi mental. Individu yang mengambil ubat ini tidak boleh mengendalikan mesin atau memandu jika mengalami rasa mengantuk.

Jangan ambil minuman beralkohol bersama ubat kerana ini boleh meningkatkan kesan sedatif.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, Aller Syrup boleh menyebabkan kesan sampingan walaupun bukan semua orang mendapatnya.

Jika mengalami symptom berterusan, jangan mengambil ubat ini and rujuk kepada doktor. Kesan-kesan sampingan biasa berikut telah dilaporkan:

- lali, termasuk sedikit mengantuk kepada tidur nyenyak dan termasuk kelesuan
- pening dan tiada koordinasi
- gangguan dalam menumpukan perhatian
- sakit kepala
- gangguan gastro-usus seperti loya, muntah, cirit-birit atau sembelit
- anoreksia atau selera makan meningkat
- sakit epigastrik.
- penglihatan kabur
- kesukaran membuang air kecil
- disuria – sakit/ pedih semasa membuang air kecil.
- kekeringan mulut
- sesak dada.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan Aller Syrup

-Penyimpanan

Tutup botol dengan ketat. Simpan di bawah 30°C. Lindungi daripada cahaya.

Jauhi ubat dari kanak-kanak.

-Pelupusan

Ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Dapatkan maklumat daripada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Larutan oren dengan perasa lemon.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Chlorpheniramine Maleate

- Bahan-bahan tidak aktif

Glycerin, Methyl Paraben, Propyl Paraben, Ethanol 96%, Sunset Yellow, Lemon Flavor, Purified Water dan Sugar Syrup

-MAL number

MAL19860097AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

KCK Pharmaceutical Industries Sdn. Bhd.

Plot 61, Bayan Lepas Industrial Park Phase 4, Lintang Bayan Lepas 1, 11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

24/04/2025

Nombor Siri

NPRA(R2/2)240306/1218