

BETA CREAM 0.1%

Betamethasone 17-Valerate BP (0.1% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Beta Cream
2. Bagaimana Beta Cream berfungsi
3. Sebelum menggunakan Beta Cream
4. Cara menggunakan Beta Cream
5. Semasa menggunakan Beta Cream
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini

Apakah kegunaan Beta Cream 0.1%

Beta Cream 0.1% mengandungi bahan aktif *betamethasone 17-valerate*, iaitu sejenis ubat yang dipanggil kortikosteroid topikal. Betamethasone Valerate adalah kortikosteroid poten yang boleh digunakan secara topikal untuk merawat ekzema termasuk *infantile* (tompok, mengelupas pada kulit bayi), atopik (kulit kering, gatal dan meradang), *contact*, *Seborrhoeic* (tompok bersisik, kulit meradang dan kelemumur yang degil) dan *neuro-dermatitis* (gatal-gatal kronik atau bersisik). Rawatan lain termasuk *dermatitis herpetiformis* (ruam kulit, gatal pada individu yang mempunyai penyakit *celiac*), *psoriasis* (gatal kronik, tompok bersisik) dan *intertrigo* (keradangan kulit yang biasa).

Bagaimana Beta Cream 0.1% berfungsi

Betamethasone Valerate adalah sejenis kortikosteroid dan digunakan bagi tindakan anti-inflamasi, anti-kegatalan dan vasokonstriksi (pengecutan salur darah) pada kulit.

Sebelum menggunakan Beta Cream 0.1%

Bila tidak boleh mengambil

- Jika anda alergi (hipersensitif) kepada Betamethasone 17-Valerate atau sebarang kandungan dalam Beta Cream 0.1%.
- Sekiranya anda mempunyai jangkitan tuberkulosis pada kulit, jangkitan fungus, *herpes simplex*,

vaccinia, *varicella* dan luka yang besar.

Sebelum mula mengambil

Anda harus beritahu doktor anda sekiranya:

- Anda alergi terhadap ubat yang anda pernah ambil untuk merawat keadaan semasa anda.
- Anda hamil, atau sedang cuba untuk hamil atau sedang menyusukan anak.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor dan ahli farmasi anda sekiranya anda sedang mengambil mana-mana ubat, termasuk tonik herbal, pelengkap tambahan dan ubat yang dibeli tanpa preskripsi.

Cara menggunakan Beta Cream 0.1%

Sentiasa menggunakan ubat dengan tepat seperti yang diberitahu oleh doktor anda. Anda perlu merujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda tidak pasti. Tidak boleh mengambil ubat ini melalui mulut. Ubat ini hanya untuk kegunaan topikal sahaja

Berapa banyak harus digunakan

Sapukan lapisan nipis ke kawasan kulit yang terlibat satu hingga tiga kali sehari. Jika pencairan diperlukan, krim yang dicairkan tidak boleh digunakan dua minggu selepas disediakan.

Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

Berapa lama perlu digunakan

Ambil Beta Cream 0.1% seperti dicadangkan oleh doktor anda.

Jika terlupa mengambilnya

- Sekiranya anda terlupa menggunakannya, gunakan sebaik sahaja anda teringat.
- Tetapi, sekiranya telah hampir masa untuk dos yang berikutnya, abaikan dos yang terlepas.

- Jangan menggunakan dos berganda untuk menggantikan dos yang dilupakan.

Jika mengambil berlebihan (terlebi dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakannya

Perkara yang perlu dilakukan

Hubungi doktor jika simptom anda bertambah buruk atau tiada perubahan.

Beritahu doktor sekiranya anda hamil semasa menggunakan Beta Cream 0.1%.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berikan Beta Cream 0.1% kepada orang lain walaupun symptom mereka seolah-olah serupa ataupun mereka mempunyai keadaan yang sama seperti anda. Doktor anda telah mempreskripsikan Beta Cream 0.1% untuk anda dan keadaan anda.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Penggunaan dalam tempoh lama atau penggunaan dalam kuantiti yang banyak perlu dielakkan.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, Beta Cream 0.1% boleh juga menyebabkan kesan sampingan walaupun tidak semua orang mengalaminya. Kesan sampingan berikut mungkin terjadi dengan ubat ini

- Menjejaskan penyembuhan luka
- *petchiae* (kesan merah/ungu pada kulit) dan *ecchymoses* (lebam).
- *erythema* muka
- banyak berpeluh
- boleh menyekat reaksi kepada ujian kulit

BETA CREAM 0.1%

Betamethasone 17-Valerate BP (0.1% w/w)

Sekiranya mana-mana kesan sampingan menjadi serius, atau anda mengalami kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam risalah ini, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Berjumpa dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda was-was atau untuk maklumat selanjutnya.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan Penyimpanan

Pastikan bekas ditutup rapat. Simpan di bawah 30°C. Lindungi daripada pembekuan, haba dan cahaya.

Jauhi daripada kanak-kanak.

Pelupusan

Ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Dapatkan maklumat daripada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Keterangan Produk

Rupa dan warna produk

Krim berwarna putih, licin dan homogen.

Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif

Betamethasone 17-Valerate BP

Bahan tidak aktif

Emulsifying Wax, Liquid Paraffin BP, White Soft Paraffin BP, Methyl Paraben, Propyl Paraben dan air yang ditapis.

Nombor MAL

MAL19860147AZ

Pengilang dan Pemegang

Pendaftaran Produk

KCK Pharmaceutical Industries Sdn. Bhd.

Plot 61, Bayan Lepas Industrial Park Phase 4, Lintang Bayan Lepas 1, 11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini

14/11/2022

Nombor Siri

NPRA(R2/1)221109/973