

REXOM ASCORBIC ACID TABLET

Ascorbic Acid (100mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Rexom Ascorbic Acid
2. Bagaimana Rexom Ascorbic Acid berfungsi
3. Sebelum mengambil Rexom Ascorbic Acid
4. Cara mengambil Rexom Ascorbic Acid
5. Semasa menggunakan Rexom Ascorbic Acid
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Rexom Ascorbic Acid
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Rexom Ascorbic Acid

Untuk kekurangan Vitamin C.

Bagaimana Rexom Ascorbic Acid berfungsi

Rexom Ascorbic acid mengandungi asid askorbik yang membantu menghalang kekurangan asid askorbik di dalam badan.

Sebelum menggunakan Rexom Ascorbic Acid

-Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil ubat ini sekiranya anda mempunyai

- Alahan kepada mana-mana bahan yang disenaraikan di dalam risalah ini.
- Hiperoksalia (terlalu banyak kristal oxalate dalam air kencing).

-Sebelum menggunakan ubat ini

Berbincang dengan doktor anda sebelum mengambil ubat ini.

Mengandung dan menyusukan anak

Berbincang dengan doktor anda sebelum mengambil ubat ini jika anda mengandung mungkin mengandung atau menyusukan anak.

Wanita mengandung disarankan menggunakan dengan berhati-hati. Asid askorbik dirembeskan ke dalam susu ibu.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil ubat ini, termasuk mana-mana yang anda dapatkan tanpa preskripsi dari kedai farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan anda.

Sesetengah ubat dan Rexom Ascorbic acid boleh mengganggu antara satu sama lain. Mereka mungkin terjejas oleh Rexom Ascorbic acid atau boleh menjejaskan fungsinya.

- Asid askorbik meningkatkan perkumuhan amphetamine pada ginjal.
- Merokok dan kontraseptif oral mengurangkan kepekatan plasma askorbat.
- Asid askorbik meningkatkan penyerapan zat besi.
- Pemberian aspirin dan asid askorbik secara serentak boleh mengganggu penyerapan asid askorbik.
- Perkumuhan salisilat pada ginjal tidak terjejas dan tidak menyebabkan penurunan kesan anti-radang aspirin.
- Pemberian antasid yang mengandungi aluminium boleh meningkatkan perkumuhan aluminium dalam air kencing.
- Pemberian antasid dan asid askorbik secara serentak tidak digalakkan, terutama pada pesakit dengan masalah buah pinggang.
- Pemberian bersama amigdalin boleh menyebabkan ketoksikan sianida.
- Pemberian asid askorbik secara serentak dengan deferoxamine meningkatkan perkumuhan zat besi dalam air kencing.

Cara mengambil Rexom Ascorbic Acid

-Berapa banyak harus diambil

Sentiasa gunakan Rexom Ascorbic acid seperti yang ditetapkan oleh doktor anda. Anda perlu menyemak dengan doktor atau ahli farmasi jika tidak pasti.

Dos biasa

Dewasa : 100-250 mg sekali atau dua kali sehari

Kanak- Kanak berumur 6 tahun dan ke atas: 100 mg tiga kali sehari selama satu minggu diikuti dengan 100mg setiap hari sehingga gejala reda.

-Bila perlu diambil

Ambil seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

-Berapa lama perlu diambil

Teruskan pengambilan Rexom Ascorbic acid seperti yang dicadangkan oleh doktor anda. Jika gejala berterusan, dapatkan nasihat doktor anda.

-Jika terlupa mengambil

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, tunggu sehingga sampai masa untuk mengambil dos seterusnya dan abaikan dos yang tertinggal. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa telah terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Mengambil dos yang banyak boleh menyebabkan cirit-birit dan pembentukan calculi ginjal oksalat (batu ginjal), asidosis (terlalu banyak asid dalam cecair badan) atau anemia hemolitik (hemolisis sel darah merah) pada individu tertentu dengan kekurangan glukosa 6-fosfat dehydrogenase

Semasa menggunakan Rexom Ascorbic acid

-Perkara yang perlu dilakukan

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Rexom Ascorbic acid.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

REXOM ASCORBIC ACID TABLET

Ascorbic Acid (100mg)

- Jangan ambil dos lebih daripada yang disarankan melainkan diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan ambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan berkongsi Rexom Ascorbic acid dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Peningkatan pengambilan asid askorbik dalam jangka masa yang lama boleh mengakibatkan peningkatan pembersihan asid askorbik pada buah pinggang, dan kekurangan dapat terjadi jika pengambilan dikurangkan atau ditarik dengan cepat.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, Rexom Ascorbic acid boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun jarang terjadi apabila digunakan mengikut preskripsi. Sekiranya kesan sampingan berterusan, jangan ambil ubat dan rujuk kepada doktor.

Sila rujuk dengan doktor anda jika anda mengalami mana mana kesan yang tersenarai atau tidak tersenarai.

- Gangguan sistem saraf: sakit kepala.
- Gangguan vaskular: kemerahan.
- Gangguan saluran gastrousus: loya, muntah dan kekejangan perut. Dosis besar asid askorbik boleh menyebabkan cirit-birit.
- Gangguan kulit dan tisu subkutan: kemerahan kulit.
- Gangguan ginjal dan kencing: Pesakit yang diketahui berisiko mengalami hiperoksaluria (perkumuhan oksalat dalam air kencing yang berlebihan) tidak boleh mengambil dos asid askorbik melebihi 1 g setiap hari kerana terdapat peningkatan perkumuhan oksalat urin.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Rexom Ascorbic Acid

-Penyimpanan

Pastikan bekas ditutup rapat. Simpan di tempat kering di bawah 30°C. Lindungi daripada cahaya.

Jauhi ubat daripada kanak-kanak.

-Pelupusan

Ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Dapatkan maklumat daripada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Oren, bulat dengan garis pemisah pada satu belah.

-Bahan-bahan kandungan

Setiap tablet mengandungi:

- Bahan aktif
Ascorbic Acid (100mg)

- Bahan-bahan tidak aktif
Icing Sugar, Lactose, Sodium Saccharin, Sunset Yellow, Kollidon PVP, Corn Starch, Orange Captarome, and Magnesium Stearate.

-Nombor MAL

MAL19911363XZ

Pengilang dan Pemegang

Pendaftaran Produk

KCK Pharmaceutical Industries Sdn. Bhd.

Plot 61, Bayan Lepas Industrial Park
Phase 4, Lintang Bayan Lepas 1,
11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

18/03/2025

Serial Number

NPRA (R2/1)

211102/775