

# MILI SYRUP 120MG/5ML

Paracetamol (120mg/5ml)

---

## Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Mili
2. Bagaimana Mili berfungsi
3. Sebelum mengambil Mili
4. Cara mengambil Mili
5. Semasa menggunakan Mili
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Mili
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RIMUP

## Apakah kegunaan Mili

Untuk demam & melegakan kesakitan biasa sehingga sederhana.

## Bagaimana Mili berfungsi

Mili mengandungi paracetamol, ubat yang berfungsi dengan melegakan kesakitan dan mengurangkan suhu dan demam yang tinggi.

## Sebelum menggunakan Mili

### -Bila tidak boleh menggunakan

- Jangan mengambil Mili jika alah kepada paracetamol atau bahan lain di dalamnya.
- Jangan ambil ubat lain yang mengandungi Paracetamol pada masa yang sama.
- Pemberitahuan alergi: Paracetamol boleh menyebabkan reaksi kulit yang teruk. Gejala mungkin termasuk kemerahan kulit, lepuh atau ruam. Ini boleh menjadi tanda-tanda keadaan yang serius. Sekiranya tindak balas ini berlaku, hentikan penggunaan dan dapatkan bantuan perubatan dengan serta-merta.

### -Sebelum mengambil

Awas jika anda mengalami kerosakan fungsi buah pinggang atau hati. Ia juga harus diberikan dengan berhati-hati kepada individu yang ketagih dengan alkohol.

### *Mengandung dan menyusukan anak*

Berbincang dengan doktor anda sebelum mengambil ubat ini jika anda mengandung, mungkin mengandung atau menyusukan anak.

Berhati-hati jika anda mengalami gangguan fungsi buah pinggang.

## Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil ubat ini, termasuk mana-mana yang anda dapatkan tanpa preskripsi dari kedai farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan anda.

Sesetengah ubat dan Mili mungkin berinteraksi antara satu sama lain. Ia mungkin terjejas oleh Mili atau mungkin menjejaskan cara ia berfungsi terutamanya:

- Meningkatkan kesan antikoagulan warfarin (mencegah serangan jantung, strok, dan pembekuan darah) dan coumarin lain dengan peningkatan risiko pendarahan.

## Cara mengambil Mili

### -Berapa banyak harus diambil

Sentiasa gunakan Mili seperti yang ditetapkan oleh doktor anda. Anda perlu menyemak dengan doktor atau ahli farmasi jika tidak pasti.

### Dos biasa

10 hingga 15mg/kg/dos setiap 4 hingga 6 jam

3 bulan-1 tahun: 2.5 hingga 5ml/dos

1 tahun-5 tahun: 5 to 10ml/dos

Dos ini boleh diberikan setiap 4 hingga 6 jam jika perlu sehingga maksimum 4 dos dalam masa 24 jam.

### -Bila perlu diambil

Ambil seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

### -Berapa lama perlu diambil

Teruskan pengambilan Mili seperti yang dicadangkan oleh doktor anda. Jika gejala berterusan, dapatkan nasihat doktor anda.

### -Jika terlupa mengambil

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, tunggu sehingga sampai masa untuk mengambil dos seterusnya dan abaikan

dos yang tertinggal. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

### -Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa telah terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Pengambilan Mili secara berlebihan mungkin menyebabkan:

- Muntah, sakit perut, tekanan darah rendah dan berpeluh. Kesan buruk yang paling serius dari terlebih dos paracetamol adalah bergantung kepada dos, berpotensi menyebabkan kegagalan hati yang membawa maut.

## Semasa menggunakan Mili

### -Perkara yang perlu dilakukan

- Beritahu ahli farmasi atau doktor anda sekiranya simptom berterusan selepas mengambil ubat ini.
- Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Mili.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

### -Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan ambil dos lebih daripada yang disarankan melainkan diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan ambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan berkongsi Mili dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama.

### -Perkara yang perlu diberi perhatian

- Jangan mengambil minuman beralkohol dengan ubat ini.

# MILI SYRUP 120MG/5ML

Paracetamol (120mg/5ml)

---

## Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, Mili boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mengalaminya. Jika simptom berterusan, jangan ambil ubat ini dan rujuk doktor.

Beritahu doktor anda jika anda dapati mana-mana kesan sampingan berikut atau mengalami apa-apa kesan lain yang tidak disenaraikan:

- Reaksi penyakit darah.
- Reaksi hipersensitiviti kulit termasuk ruam kulit, angioedema (bengkak di permukaan bawah kulit), Stevens Johnson Syndrome / Toksik Epidermal Nekrolisis telah dilaporkan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web [npra.gov.my](http://npra.gov.my) [Consumers - > Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

## Cara penyimpanan dan pelupusan Mili

### -Penyimpanan

Pastikan penutup ditutup ketat. Simpan di bawah 30°C. Lindungi daripada cahaya. Jauhi daripada kanak-kanak.

### -Pelupusan

Ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Dapatkan maklumat daripada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

## Maklumat lanjut

### -Rupa dan warna produk

Sirap berwarna merah dengan perasa raspberi and strawberi.

### -Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Setiap 5ml mengandungi Paracetamol

- Bahan-bahan tidak aktif

Sodium benzoate, Saccharin sodium, Citric acid anhydrous, Menthol crystal, Raspberry red, Glycerine, Propylene glycol, Raspberry flavour, Strawberry flavour, Sorbitol Solution 70%, Purified water dan sugar syrup.

### -MAL number:

MAL19962480XZ

## Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

KCK Pharmaceutical Industries Sdn. Bhd.  
Plot 61, Bayan Lepas Industrial Park Phase 4, Lintang Bayan Lepas 1, 11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang, Malaysia.

## Tarikh kemaskini RIMUP

18/05/2021

## Nombor siri

NPRA (R2/1) 210512/676