

# UNIDINE Povidone Iodine Solution 10% w/v

Povidone Iodine (10% w/v)

## Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan UNIDINE
2. Bagaimana UNIDINE berfungsi
3. Sebelum menggunakan UNIDINE
4. Cara menggunakan UNIDINE
5. Semasa menggunakan UNIDINE
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan UNIDINE
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RIMUP

## Apakah kegunaan UNIDINE

Ia digunakan sebagai disinfektan dan antiseptik untuk rawatan luka, terhiris dan luka terbakar yang terkontaminasi dan juga untuk persediaan pada kulit dan membran mukus sebelum pembedahan.

## Bagaimana UNIDINE berfungsi

UNIDINE mengandungi povidone iodine yang merupakan antiseptik dengan spektrum yang luas untuk aplikasi topikal dalam rawatan dan pencegahan jangkitan luka.

## Sebelum menggunakan UNIDINE

### -Bila tidak boleh menggunakan

Ia tidak sepatutnya digunakan jika anda:

- Mengalami hipersensitif kepada iodine, polyvinylpyrrolidone atau komponen lain dalam formulasi ini.
- Mempunyai sejarah tiroid yang tidak berfungsi dengan normal atau goiter (bengkak pada leher).
- Sedang menjalani terapi lithium (untuk kemurungan).

Tidak boleh digunakan pada kanak-kanak di bawah umur 2 tahun.

### -Sebelum menggunakan ubat ini

- Penggunaan ubat ini boleh mengganggu ujian fungsi tiroid.
- Individu yang mengalami kekurangan atau kerosakan fungsi buah pinggang perlu berhati-hati.

Mengandung dan menyusukan anak  
Berbincang dengan doktor anda sebelum mengambil ubat ini jika anda mengandung, mungkin mengandung atau menyusukan anak.

Iodine bebas melepasi plasenta dan dirembeskan dalam susu ibu. Oleh itu, disyorkan supaya penyusuan harus dihentikan semasa rawatan, melainkan jika tiada alternatif yang lain.

Gangguan fungsi tiroid telah dilaporkan pada kanak-kanak yang ibunya terdedah kepada dos farmakologikal iodine. Povidone Iodine tidak boleh digunakan selalu semasa kehamilan melainkan tiada rawatan alternatif yang tersedia.

### -Jika mengambil ubat-ubat lain

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil ubat ini, termasuk ubat-ubatan yang anda perolehi tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan anda.

- Lithium boleh berinteraksi dengan UNIDINE untuk menjejaskan fungsi kelenjar tiroid. Oleh itu, penggunaan secara serentak harus dielakkan.
- Penyerapan iodine melalui kulit atau kulit yang pecah boleh mengganggu ujian fungsi tiroid.
- Pencemaran povidone iodine terhadap beberapa jenis ujian untuk mengesan darah dalam najis atau darah dalam air kencing boleh menghasilkan keputusan positif yang salah.

## Cara menggunakan UNIDINE

### -Berapa banyak harus digunakan

Sentiasa gunakan UNIDINE seperti yang disyorkan.

### Dos biasa

Untuk digunakan tanpa dicairkan. Saoukan terus ke kulit. Biarkan sehingga kering sebelum meletakkan kain, fabric atau acuan.

### Bila perlu digunakan

Gunakan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi.

### Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan UNIDINE seperti doktor anda syorkan. Sekiranya gejala berterusan, berjumpa dengan doktor anda.

### Jika anda terlupa mengambil

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi mengenai apa yang perlu anda lakukan jika anda terlupa menggunakannya.

### Jika anda menggunakan terlalu banyak (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anda mengangap anda atau sesiapa mungkin mengambil terlalu banyak ubat ini. Lakukan ini walaupun tidak ada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Mengambil terlalu banyak UNIDINE mungkin menyebabkan:

- goiter (bengkak pada leher) dan tiroid yang tidak aktif atau tiroid yang terlalu aktif.
- Rasa logam di dalam mulut
- peningkatan air liur
- terbakar atau sakit di tekak atau mulut
- kerengsaan dan pembengkakan mata
- pengumpulan cecair di dalam paru-paru
- tindak balas kulit
- kesakitan gastrousus dan cirit-birit
- asidosis metabolik
- Tahap tinggi natrium dalam darah dan gangguan buah pinggang.
- Pengambilan yang disengajakan atau tidak disengajakan dengan jumlah besar povidone iodine akan mengakibatkan kadar iodine yang tinggi di dalam darah dan keracunan gastrousus termasuk muntah-muntah dan cirit-birit.

## Semasa menggunakan UNIDINE

### -Perkara yang perlu dilakukan

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan UNIDINE.

### -Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan ambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan berkongsi UNIDINE dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama.

# UNIDINE Povidone Iodine Solution 10% w/v

Povidone Iodine (10% w/v)

---

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Untuk kegunaan luar sahaja.

-Nombor MAL

MAL18056086XZ

**Kesan-kesan sampingan**

Seperti semua ubat-ubatan, UNIDINE boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mengalaminya.

Beritahu doktor anda jika anda melihat mana-mana kesan sampingan berikut:

- Kerengsaan, kulit terbakar dan tindak balas sensitiviti.
- tindak balas hipersensitif.
- kekurangan iodine dan tiroid yang kurang aktif atau tiroid yang terlalu aktif.
- asidosis metabolik dan kegagalan buah pinggang akut.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web [npra.gov.my](http://npra.gov.my) [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

**Cara penyimpanan dan pelupusan UNIDINE**

-Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C & Lindungi daripada cahaya.

-Pelupusan

Ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Dapatkan maklumat daripada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

**Maklumat lanjut**

-Rupa dan warna produk

Larutan berwarna coklat gelap.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Povidone Iodine (10% w/v)

- Bahan-bahan tidak aktif

Citric Acid Anhydrous, Anhydrous Disodium Hydrogen Phosphate, Glycerine, Potassium Iodide, Potassium Iodate, Hydroxy Propyl Methyl Cellulose E15, Purified Water

**Pemegang Pendaftaran Produk**

**KCK Pharmaceutical Industries Sdn. Bhd.**

Plot 61, Bayan Lepas Industrial Park  
Phase 4, Lintang Bayan Lepas 1,  
11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang,  
Malaysia.

**Pengilang**

**KCK Pharmaceutical Industries Sdn. Bhd.**

No. 5 & 7 Hala Beringin,  
Diamond Valley Industrial Park,  
11960 Bayan Lepas,  
Pulau Pinang, Malaysia

**Tarikh kemaskini RiMUP**

14/05/2024

**Nombor Siri**

NPRA(R2/2)240430/1264