

WINAMOL Drops for Infants

Paracetamol (100 mg/ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan WINAMOL Drops
2. Bagaimana WINAMOL Drops berfungsi
3. Sebelum mengambil WINAMOL Drops
4. Cara mengambil WINAMOL Drops
5. Semasa menggunakan WINAMOL Drops
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan WINAMOL Drops

Untuk melegakan demam dan kesakitan ringan hingga sederhana. WINAMOL Drops adalah analgesik untuk pertumbuhan gigi.

Bagaimana WINAMOL Drops berfungsi

WINAMOL Drops mengandungi Paracetamol. Ia berfungsi dengan melegakan kesakitan dan mengurangkan suhu dan demam yang tinggi.

Sebelum menggunakan WINAMOL Drops

-Bila tidak boleh menggunakan

Beritahu doktor anda sebelum menggunakan WINAMOL Drops jika anda mempunyai hipersensitiviti terhadap mana-mana kandungannya.

-Mengandung dan penyusuan

Tiada kesan buruk ketika paracetamol digunakan dalam dos yang disyorkan, tetapi pesakit harus mengikuti nasihat doktor mengenai penggunaannya. Paracetamol dirembeskan di dalam susu ibu tetapi tidak dalam jumlah yang ketara secara klinikal.

- Sebelum menggunakan ubat ini

Penyediaan ini mengandungi PARACETAMOL. Jangan mengambil apa-apa paracetamol lain yang mengandungi ubat-ubatan pada masa yang sama.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil ubat ini, termasuk mana-mana yang anda dapatkan tanpa preskripsi dari kedai farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan anda.

Sesetengah ubat dan WINAMOL Drops mungkin berinteraksi antara satu sama lain. Mereka mungkin terjejas oleh WINAMOL Drops atau mungkin menjejaskan cara ia berfungsi.

Sebelum mengambil WINAMOL Drops for Infants, pastikan untuk berunding dengan doktor jika pesakit sedang mengambil warfarin atau ubat-ubatan serupa yang digunakan untuk mencairkan darah.

Cara mengambil WINAMOL Drops

-Berapa banyak harus diambil

Sentiasa gunakan seperti yang ditetapkan oleh doktor anda. Anda perlu menyemak dengan doktor atau ahli farmasi jika tidak pasti.

Dos biasa

- 1-3 bulan (4-6 kg): 0.6-0.9 mL (60-90mg)
- 3-6 bulan (6-8 kg): 0.9-1.2 mL (90-120mg)
- 6-12 bulan (8-10 kg): 1.2-1.5 mL (120-150mg)
- 1-2 tahun (10-12 kg): 1.5-1.8 mL (150-180mg)

- Untuk dos yang tepat, timbang berat anak anda dan tentukan dos yang diberikan berdasarkan paracetamol 15 mg untuk setiap berat badan dalam kg.
- Jangan berikan lebih daripada 4 dos dalam mana-mana tempoh 24 jam.
- Tinggalkan sekurang-kurangnya 4 jam antara dos.
- Jangan berikan ubat ini kepada anak anda selama lebih dari 3 hari tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

-Bila perlu diambil

Ambil seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

-Berapa lama perlu diambil

Teruskan pengambilan WINAMOL Drops seperti yang dicadangkan oleh

doktor anda. Jika gejala berterusan, dapatkan nasihat doktor anda.

-Jika terlupa mengambil

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, tunggu sehingga sampai masa untuk mengambil dos seterusnya dan abaikan dos yang tertinggal. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa telah terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Gejala awal terlebih dos paracetamol termasuk pucat, mual, muntah, anoreksia dan sakit perut. Kerosakan hati boleh menjadi jelas 12 hingga 48 jam selepas diambil. Ketidakseimbangan metabolisme glukosa dan asidosis metabolik mungkin berlaku.

Semasa menggunakan

-Perkara yang perlu dilakukan

- Beritahu ahli farmasi atau doktor anda sekiranya simptom berterusan selepas mengambil ubat ini.
- Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan WINAMOL Drops
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan ambil dos lebih daripada yang disarankan melainkan diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi anda.

WINAMOL Drops for Infants

Paracetamol (100 mg/ml)

- Jangan ambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan berkongsi dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Alahan alergi: Paracetamol boleh menyebabkan reaksi kulit yang teruk. Gejala mungkin termasuk kemerahan kulit, lepuh atau ruam. Ini boleh menjadi tanda-tanda keadaan yang serius. Sekiranya tindak balas ini berlaku, hentikan penggunaan dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera.

Rujuk doktor sebelum digunakan jika kanak-kanak mempunyai masalah hati atau buah pinggang dan jika gejala kanak-kanak tidak bertambah baik. Jangan melebihi dos yang dinyatakan.

WINAMOL Drops for Infants mengandungi paracetamol. Ia tidak boleh digunakan dengan produk yang mengandungi paracetamol yang lain.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mengalaminya.

Jika simptom berterusan, jangan ambil ubat ini dan rujuk doktor.

Beritahu doktor anda jika anda dapati mana-mana kesan sampingan berikut atau mengalami apa-apa kesan lain yang tidak disenaraikan.

Reaksi hipersensitiviti kulit termasuk ruam kulit, *angioedema*, *Stevens Johnson Syndrome* / *Toxic Epidermal Necrolysis* telah dilaporkan.

Berhenti mengambil WINAMOL Drops for Infants dan beritahu segera kepada doktor jika kanak-kanak: Mengalami tindak balas alahan contohnya ruam atau gatal-gatal kulit, kadangkala dengan masalah pernafasan atau bengkak bibir, lidah, tekak atau muka; mengalami ruam kulit atau mengelupas, atau ulser mulut; sebelum

ini mengalami masalah pernafasan dengan ubat anti-radang aspirin atau nonsteroid, dan mengalami tindak balas yang sama dengan WINAMOL Drops for Infants; mengalami lebam atau pendarahan yang tidak dapat dijelaskan, tindak balas ini jarang berlaku.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumer* → *Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan WINAMOL Drops

-Penyimpanan

Pastikan botol ditutup rapat lindungi dari cahaya. Simpan di bawah 30°C. Jauhi ubat dari kanak-kanak.

-Pelupusan

Ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Dapatkan maklumat daripada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Sirap berwarna merah dengan perasa rasberi.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Paracetamol

- Bahan-bahan tidak aktif
Propylene Glycol, *Polyethylene Glycol-PEG 400*, *Glycerin*, *Methyl Paraben*, *Propyl Paraben*, *Sucralose*, *Sodium Chloride*, *Raspberry Flavour*, *Citric Acid Anhydrous*, *Carmoisine Colour*, *Sodium Citrate* dan *purified water*.

-MAL number

MAL19086013XZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

KCK Pharmaceutical Industries Sdn. Bhd.

Plot 61, Bayan Lepas Industrial Park Phase 4, Lintang Bayan Lepas 1, 11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini RIMUP

24/07/2023

Nombor Siri

NPRA(R2)19/100