

OroThymol Gargle 0.15% w/v

Thymol (0.15% w/v)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan OroThymol
2. Bagaimana berfungsi
3. Sebelum mengguna OroThymol
4. Cara mengguna OroThymol
5. Semasa menggunakan OroThymol
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RIMUP

Apakah kegunaan

Sebagai permbersih mulut atau kumuran untuk kebersihan mulut dan melegakan sakit tekak.

Bagaimana berfungsi

Thymol merupakan antiseptik dengan aktiviti antibakteria dan antikulat.

Sebelum menggunakan OroThymol

-Bila tidak boleh menggunakan

Ia tidak boleh digunakan pada individu yang hipersensitif kepada bahan-bahan yang terkandung di dalamnya.

-Sebelum menggunakan ubat ini

Tidak boleh ditelan. Elakkan penggunaan pada pesakit dengan ulser mulut yang besar.

Mengandung dan menyusukan anak

Tiada kesan sampingan telah dilaporkan. Seperti semua ubat, ia hanya boleh digunakan di bawah pengawasan perubatan pada ibu mengandung atau ibu yang menyusukan.

-Jika mengguna ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengguna ubat ini, termasuk mana-mana yang anda dapatkan tanpa preskripsi dari kedai farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan anda.

Sesetengah ubat dan OroThymol boleh mengganggu satu sama lain. Mereka mungkin terjejas oleh OroThymol atau mungkin menjejaskan cara ia berfungsi.

Cara menggunakan OroThymol

-Berapa banyak harus diguna

Sentiasa gunakan OroThymol sama seperti yang ditetapkan doktor anda.

Anda perlu menyemak dengan doktor atau ahli farmasi anda jika ragu-ragu.

Dos biasa:

Dewasa:

Cairkan dengan menambah satu bahagian cecair dengan tiga bahagian air suam sebelum digunakan. Ia boleh digunakan 3-4 kali sehari.

Jangan telan.

Buang sebarang larutan yang tidak digunakan

Kanak-kanak di bawah umur 12 tahun:

Rujuk doktor gigi atau doktor.

-Bila perlu diguna

Gunakan seperti yang diarahkan oleh doktor, doktor gigi atau ahli farmasi anda.

-Berapa lama perlu diguna

Teruskan menggunakan OroThymol sebagaimana disyorkan oleh doktor anda. Sekiranya gejala berterusan, berjumpa dengan doktor anda.

-Jika terlupa mengguna

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi mengenai apa yang perlu anda lakukan jika anda terlupa menggunakannya.

Guna dos terlepas sebaik sahaja anda ingat. Sekiranya hampir masa untuk dos seterusnya anda, tunggu sehingga sampai masa untuk mengguna dos seterusnya dan abaikan dos yang tertinggal. Jangan guna dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa telah mengguna dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Langkah-langkah rawatan termasuk lavage gastrik dengan terapi penyokong simptomatik yang intensif.

Semasa menggunakan OroThymol

-Perkara yang perlu dilakukan

- Beritahu ahli farmasi atau doktor anda sekiranya simptom berterusan selepas mengguna ubat ini.
- Guna ubat anda mengikut arahan doktor.
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan OroThymol.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengguna ubat ini.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan guna dos lebih daripada yang disarankan melainkan diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan guna sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan berkongsi OroThymol dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Tidak boleh ditelan. Penggunaan dalam jangka masa panjang perlu dielakkan.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, OroThymol boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mengalaminya.

Jika simptom berterusan, jangan guna ubat ini dan rujuk doktor.

Beritahu doktor anda jika anda dapati mana-mana kesan sampingan berikut atau mengalami apa-apa kesan lain yang tidak disenaraikan:

- kerengsaan gastrik mukosa
- Ruam

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

OroThymol Gargle 0.15% w/v

Thymol (0.15% w/v)

Cara penyimpanan dan pelupusan **Nombor Siri**
Winamol NPRA(R2/2)240430/1262

-Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C. Lindungi daripada cahaya.

-Pelupusan

Ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Dapatkan maklumat daripada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Cecair bewarna merah, yang jelas dengan rasa Eukaliptus.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Thymol

- Bahan-bahan tidak aktif

Menthol Crystals, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Sodium Saccharin, Polyoxyl Hydrogenated Castor Oil, Methyl Salicylate, Eucalyptus Oil, Glycerin, Carmoisine powder, Propylene Glycol, Citric Acid Anhydrous dan Purified Water

-MAL number

MAL19016098X

Pemegang Pendaftaran Produk
KCK Pharmaceutical Industries Sdn. Bhd.

Plot 61, Bayan Lepas Industrial Park
Phase 4, Lintang Bayan Lepas 1,
11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang,
Malaysia.

Pengilang

KCK Pharmaceutical Industries Sdn. Bhd.

No. 5 & 7 Hala Beringin, Diamond
Valley Industrial Park, 11960
Bayan Lepas, Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

14/05/2024