

Zole Topical Solution (Clotrimazole 1% w/v)

Clotrimazole (1% w/v)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Zole
2. Bagaimana Zole berfungsi
3. Sebelum mengambil Zole
4. Cara mengambil Zole
5. Semasa menggunakan Zole
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Zole
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RIMUP

Apakah kegunaan Zole

Untuk merawat candidiasis pada kulit (ruam merah, gatal), *tinea corporis* (ruam berbentuk bulat), *tinea cruris* (kegatalan), *tinea pedis* (ruam pada kaki) dan *tinea versicolor* (ruam kecil, tidak berwarna).

Bagaimana Zole berfungsi

Clotrimazole mempunyai aktiviti anti-fungi yang membantu merawat jangkitan kulat.

Sebelum menggunakan Zole

-Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan ia jika mempunyai sensitiviti kepada Clotrimazole.

-Sebelum menggunakan ubat ini

Untuk digunakan di bawah nasihat perubatan dan seperti yang diarahkan oleh doktor.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Reaksi ubat tidak diketahui.

Cara mengambil Zole

-Berapa banyak harus diambil

Sapukan pada kawasan terkena jangkitan dan kawasan sekitar 2 atau 3 kali sehari secara berterusan untuk 2-4 minggu.

-Bila perlu diambil

Ambil seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda. Sapukan dengan nipis pada bahagian jangkitan 2-3 kali sehari dan ratakan.

-Berapa lama perlu diambil

Teruskan pengambilan Zole seperti yang dicadangkan oleh doktor anda.

-Jika terlupa mengambil

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Terlebih dos akut akibat penggunaan Clotrimazole secara topikal tidak dijangka boleh mengancam nyawa.

Semasa menggunakan Zole

- Perkara yang perlu dilakukan

- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Zole.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan ambil dos lebih daripada yang disarankan melainkan diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan ambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan memberi Zole kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika kerengsaan atau sensitiviti terjadi dengan penggunaan Clotrimazole, rawatan perlu dihentikan dan terapi yang sesuai perlu dilakukan.

Pesakit dinasihatkan untuk menggunakan ubat untuk masa rawatan penuh walaupun gejala mungkin bertambah baik.

Ubat ini harus digunakan dalam trimester pertama kehamilan selepas pertimbangan manfaat/risiko dan mengikut keputusan doktor. Ia tidak diketahui sama ada Clotrimazole dirembeskan dalam susu manusia. Seperti ubatan lain yang dirembeskan dalam susu manusia, perhatian perlu diberi apabila Clotrimazole digunakan oleh ibu-ibu yang menyusui.

Clotrimazole tidak mempunyai atau tidak dapat mempengaruhi keupayaan memandu atau menggunakan mesin.

Kesan-kesan sampingan

Reaksi setempat termasuk kerengsaan, rasa terbakar, dermatitis kontak, lepuh, kulit mengelupas, pruritus, urticarial (*hives*) dan rasa menyucuk pada kulit.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.moh.gov.my [Public → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Zole

-Penyimpanan

Pastikan bekas ditutup dengan ketat. Simpan di bawah suhu 30°C.

-Pelupusan

Ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Dapatkan maklumat daripada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Cecair pekat yang jelas dan tidak berwarna.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Clotrimazole 1% w/v

-Bahan-bahan tidak aktif
Propylene glycol.

-Nombor MAL

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

KCK Pharmaceutical Industries Sdn. Bhd.
Plot 61, Bayan Lepas Industrial Park Phase 4, Lintang Bayan Lepas 1, 11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang, Malaysia.

Zole Topical Solution (Clotrimazole 1% w/v)

Clotrimazole (1% w/v)

Tarikh kemaskini RiMUP

12/02/2020

Nombor Siri

NPRA (R2) 20/023