

Unimed's ChlorSept 2% with IPA Antiseptic Solution

10% v/v Chlorhexidine Gluconate 20% Solution equivalent to chlorhexidine gluconate (2.0% w/v), Isopropyl Alcohol (70.0% v/v)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Unimed's ChlorSept 2%
2. Bagaimana Unimed's ChlorSept 2% berfungsi
3. Sebelum mengambil Unimed's ChlorSept 2%
4. Cara mengambil Unimed's ChlorSept 2%
5. Semasa menggunakan Unimed's ChlorSept 2%
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini Unimed's ChlorSept 2%

Apakah kegunaan Unimed's ChlorSept 2%

Unimed's ChlorSept 2% digunakan sebagai antiseptik pada kulit sebelum prosedur perubatan invasif (kemasukan alat perubatan ke dalam badan)

Bagaimana Unimed's ChlorSept 2% berfungsi

Unimed's ChlorSept 2% mengandungi Chlorhexidine gluconate sebagai bahan aktifnya. Ia mempunyai sifat antiseptik dan disinfektan.

Unimed's ChlorSept 2% juga mempunyai alkohol isopropil sebagai bahan aktifnya, yang mempunyai sifat antibakteria dan antiseptik.

Sebelum menggunakan Unimed's ChlorSept 2%

-Bila tidak boleh menggunakan

Beritahu doktor anda sebelum menggunakan Unimed's ChlorSept 2% jika anda:

- mempunyai reaksi alahan berkaitan Chlorhexidine.
- mempunyai hipersensitiviti terhadap Unimed's ChlorSept 2%'s dengan IPA atau mana-mana komponennya.

-Mengandung dan penyusuan

Tiada kesan semasa kehamilan dan penyusuan.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan ubat ini, termasuk mana-mana yang anda dapatkan tanpa preskripsi dari kedai farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan anda.

Sesetengah ubat dan Unimed's ChlorSept 2% mungkin berinteraksi antara satu sama lain. Mereka mungkin terjejas oleh Unimed's ChlorSept 2% atau mungkin menjejaskan cara ia berfungsi.

- Tidak sesuai dengan penggunaan sabun atau agen anionik lain.
- agen *suspension* seperti alginat dan tragacanth, serbuk tidak larut seperti kaolin, dan sebatian yang tidak larut seperti kalsium, magnesium, dan zink.
- tidak boleh bersentuhan dengan beberapa vaksin dan suntikan ujian kulit (ujian tampalan)
- Isopropil alkohol tidak sesuai dengan agen pengoksidaan seperti hidrogen peroksida dan asid nitrik.

Cara mengambil Unimed's ChlorSept 2%

-Berapa banyak harus digunakan

Sentiasa gunakan seperti yang ditetapkan oleh doktor anda. Anda perlu menyemak dengan doktor atau ahli farmasi jika tidak pasti.

Dos biasa

Penyediaan Kulit: Gunakan *Unimed's ChlorSept 2%'s with IPA Antiseptic Solution* dan biarkan kering. Larutan digunakan tanpa pencairan.

-Bila perlu digunakan

Gunakan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

-Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan seperti yang dicadangkan oleh doktor anda. Jika gejala berterusan, dapatkan nasihat doktor anda.

-Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa telah terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Penggunaan Unimed's ChlorSept 2% secara berlebihan boleh menyebabkan:

- Hemolisis (pecah sel darah merah) setelah pengambilan atau pemberian intravena secara tidak sengaja.
- Pengambilan secara tidak sengaja mungkin memerlukan lavage (pencucian) gastrik menggunakan susu, putih telur, gelatin atau sabun ringan.

Semasa menggunakan

-Perkara yang perlu dilakukan

- Beritahu ahli farmasi atau doktor anda sekiranya simptom berterusan selepas mengambil ubat ini.
- Gunakan mengikut arahan doktor.
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Unimed's ChlorSept 2%.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan menggunakan dos lebih daripada yang disarankan melainkan diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan ambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan berikan Unimed's ChlorSept 2% kepada sesiapa yang mungkin mempunyai sejarah reaksi alergi terhadap Chlorhexidine
- Cacair mudah terbakar. Jangan gunakan prosedur elektrokauteri (pemanasan tisu) atau sumber

Unimed's ChlorSept 2% with IPA Antiseptic Solution

10% v/v Chlorhexidine Gluconate 20% Solution equivalent to chlorhexidine gluconate (2.0% w/v), Isopropyl Alcohol (70.0% v/v)

pencucuhan lain sehingga kulit kering sepenuhnya.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhenti menggunakan produk ini dan dapatkan bantuan perubatan segera jika anda mengalami ruam, kegatalan, bengkak, kesukaran bernafas, pening kepala atau degupan jantung yang cepat.

-Kesan-kesan sampingan

Unimed's ChlorSept 2% mengandungi chlorhexidine. Maklumkan kepada penyedia perkhidmatan kesihatan anda jika anda mengetahui alahan terhadap chlorhexidine.

Beritahu doktor anda jika anda dapati mana-mana kesan sampingan berikut atau mengalami apa-apa kesan lain yang tidak disenaraikan:

- Menyebabkan kulit sensitif.
- Gangguan sistem imun.
- Hipersensitiviti (kejutan anafilaktik)

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan Unimed's ChlorSept 2%

-Penyimpanan

Pastikan bekas ditutup rapat. Lindungi daripada panas dan cahaya. Simpan di bawah 30°C.

-Pelupusan

Ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Dapatkan maklumat daripada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Larutan warna merah jambu yang jelas

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Chlorhexidine Gluconate 20% Solution, Isopropyl Alcohol

- Bahan-bahan tidak aktif

Ponceau 4R Colour, Purified Water.

-MAL number

MAL20096023XZ

Pemegang Pendaftaran Produk

KCK Pharmaceutical Industries Sdn. Bhd.

Plot 61, Bayan Lepas Industrial Park Phase 4, Lintang Bayan Lepas 1, 11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang, Malaysia.

Pengilang

KCK Pharmaceutical Industries Sdn. Bhd.

No. 5 & 7 Hala Beringin, Diamond Valley Industrial Park, 11960 Bayan Lepas, Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

14/05/2024

Nombor Siri

NPRA(R2/2)240430/1263