

OttoZole Ear Drops (Clotrimazole 1% w/v)

Clotrimazole (1% w/v)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan OttoZole
2. Bagaimana OttoZole berfungsi
3. Sebelum mengambil OttoZole
4. Cara mengambil OttoZole
5. Semasa menggunakan OttoZole
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan OttoZole
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan OttoZole

Untuk jangkitan kulat yang mempengaruhi telinga, rawatan kombinasi antibiotik dan steroid dan pencegahan untuk telinga perenang.

Bagaimana OttoZole berfungsi

Clotrimazole merupakan kumpulan anti kulat dan imidazole berkesan terhadap pelbagai jenis kulat.

Ia juga mempunyai tindakan antibakteria dan beberapa mikroorganisma dilaporkan sensitif.

Clotrimazole juga melakukan aktiviti pada membran sel kulat dan menghalang sintesis protein dan mempengaruhi penggunaan asid amino asilasi yang penting bagi kulat.

Sebelum menggunakan OttoZole

-Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan ia jika mempunyai sensitiviti kepada Clotrimazole.

-Sebelum menggunakan ubat ini

Untuk digunakan di bawah nasihat perubatan dan seperti yang diarahkan oleh doktor.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Reaksi ubat tidak diketahui.

Cara mengambil OttoZole

-Berapa banyak harus diambil

4 hingga 5 titik dimasukkan di telinga 3-4 kali sehari atau seperti yang diarahkan oleh doktor.

-Bila perlu diambil

Ambil seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda. Gunakan 3-4 kali sehari.

-Berapa lama perlu diambil

Teruskan pengambilan OttoZole seperti yang dicadangkan oleh doktor anda.

-Jika terlupa mengambil

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Terlebih dos akut akibat penggunaan Clotrimazole OttoZole secara topikal tidak dijangka boleh mengancam nyawa.

Semasa menggunakan OttoZole

- Perkara yang perlu dilakukan

- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan OttoZole.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan ambil dos lebih daripada yang disarankan melainkan diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan ambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan memberi OttoZole kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika kerengsaan atau sensitiviti terjadi dengan penggunaan Clotrimazole, rawatan perlu dihentikan dan terapi yang sesuai perlu dilakukan.

Pesakit dinasihatkan untuk menggunakan ubat untuk masa rawatan penuh walaupun gejala mungkin bertambah baik.

Terdapat data yang terhad mengenai penggunaan clotrimazole pada wanita hamil. Untuk digunakan semasa kehamilan selepas manfaat / risiko telah dipertimbangkan dan diputuskan

oleh doktor. Clotrimazole dirembeskan dalam susu manusia. Seperti ubatan lain yang dirembeskan dalam susu manusia, perhatian perlu diberi apabila Clotrimazole digunakan oleh ibu-ibu yang menyusui.

Clotrimazole tidak mempunyai atau tidak dapat mempengaruhi keupayaan memandu atau menggunakan mesin.

Kesan-kesan sampingan

Reaksi setempat termasuk kerengsaan dan rasa terbakar jarang berlaku apabila digunakan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan OttoZole

-Penyimpanan

Pastikan bekas ditutup dengan ketat. Simpan di bawah suhu 30°C. Simpan di bawah suhu 30°C dan buang lebihan larutan setelah dibuka selepas 7 hari.

-Pelupusan

Ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Dapatkan maklumat daripada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Cecair pekat yang jernih dan tidak berwarna.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Clotrimazole 1% w/v

-Bahan-bahan tidak aktif
Sodium Methyl Paraben, Propyl Paraben, Propylene glycol and PEG 400.

-Nombor MAL

OttoZole Ear Drops (Clotrimazole 1% w/v)

Clotrimazole (1% w/v)

Pengilang dan Pemegang

Pendaftaran Produk

KCK Pharmaceutical Industries Sdn.
Bhd.
Plot 61, Bayan Lepas Industrial Park
Phase 4, Lintang Bayan Lepas 1,
11900 Bayan Lepas,
Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

10/02/2022

Nombor Siri

NPRA (R2) 20/138