

Unimed's ChlorSept 5% Antiseptic Solution

25.0% v/v of Chlorhexidine gluconate 20% solution equivalent to chlorhexidine gluconate.....5% w/v

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan UNIMED'S CHLORSEPT 5%
2. Bagaimana UNIMED'S CHLORSEPT 5% berfungsi
3. Sebelum mengambil UNIMED'S CHLORSEPT 5%
4. Cara mengambil UNIMED'S CHLORSEPT 5%
5. Semasa menggunakan UNIMED'S CHLORSEPT 5%
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini UNIMED'S CHLORSEPT 5%

Apakah kegunaan UNIMED'S CHLORSEPT 5%

UNIMED'S CHLORSEPT 5% digunakan untuk pembasmian kuman pada kulit sebelum pembedahan dan untuk luka atau luka kebakaran.

Bagaimana UNIMED'S CHLORSEPT 5% berfungsi
UNIMED'S CHLORSEPT 5% mengandungi Chlorhexidine gluconate sebagai bahan aktifnya. Ia mempunyai sifat antiseptik yang membunuh bakteria dan menghalang pertumbuhan bakteria.

Sebelum menggunakan UNIMED'S CHLORSEPT 5%

-Bila tidak boleh menggunakan

Beritahu doktor anda sebelum menggunakan UNIMED'S CHLORSEPT 5% jika anda:

- mengalami hipersensitiviti (gatal, ruam kulit, kemerahan, bengkak, kesukaran bernafas, pening kepala, perkembangan degupan jantung yang cepat)
- kejutan anafilaksis
- tindak balas alergi terhadap Chlorhexidine.

-Mengandung dan penyusuan

Tiada kesan semasa kehamilan dan penyusuan, pendedahan sistemik terhadap chlorhexidine glukonat boleh diabaikan.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan ubat ini, termasuk mana-mana yang anda dapatkan tanpa preskripsi dari kedai farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan anda.

Sesetengah ubat dan UNIMED'S CHLORSEPT 5% mungkin berinteraksi antara satu sama lain. Mereka mungkin terjejas oleh UNIMED'S CHLORSEPT 5% atau mungkin menjejaskan cara ia berfungsi.

- Tidak sesuai dengan penggunaan sabun atau agen anionik lain.

Cara mengambil UNIMED'S CHLORSEPT 5%

-Berapa banyak harus digunakan

Sentiasa gunakan seperti yang ditetapkan oleh doktor anda. Anda perlu menyemak dengan doktor atau ahli farmasi jika tidak pasti.

Dos biasa

- **Pembasmian Kulit Pra-Operatif:** Untuk digunakan dengan 1: 10 dalam 70% alkohol untuk pembasmian kuman pada kulit sebelum operasi
- **Pembersihan biasa pada kulit untuk luka atau luka kebakaran:** Digunakan dengan 1: 100 dalam 70% alkohol untuk luka atau luka bakar.

-Bila perlu digunakan

Gunakan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

-Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan seperti yang dicadangkan oleh doktor anda. Jika gejala berterusan, dapatkan nasihat doktor anda.

-Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa telah terambil dos berlebihan. Ini perlu

dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Penggunaan UNIMED'S CHLORSEPT 5% secara berlebihan boleh menyebabkan:

- Hemolisis (pecah sel darah merah)
- Pengambilan secara tidak sengaja mungkin memerlukan pencucian gastrik dengan menggunakan susu, putih telur, gelatin atau sabun ringan.

Semasa menggunakan

-Perkara yang perlu dilakukan

- Beritahu ahli farmasi atau doktor anda sekiranya simptom berterusan selepas mengambil ubat ini.
- Gunakan mengikut arahan doktor.
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan UNIMED'S CHLORSEPT 5%.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan menggunakan dos lebih daripada yang disarankan melainkan diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan ambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan berikan Unimed's ChlorSept 5% kepada sesiapa yang mungkin mempunyai sejarah reaksi alergi terhadap Chlorhexidine

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhenti menggunakan produk ini dan dapatkan bantuan perubatan segera jika anda mengalami ruam, kegatalan, bengkak, kesukaran bernafas, pening kepala atau degupan jantung yang cepat.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, UNIMED'S CHLORSEPT 5% boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mengalaminya. Jika simptom berterusan, jangan menggunakan ubat ini dan rujuk doktor:

Unimed's ChlorSept 5% Antiseptic Solution

25.0% v/v of Chlorhexidine gluconate 20% solution equivalent to chlorhexidine gluconate.....5% w/v

Beritahu doktor anda jika anda dapati mana-mana kesan sampingan berikut atau mengalami apa-apa kesan lain yang tidak disenaraikan:

- Gangguan tisu kulit seperti dermatitis, kegatalan, kemerahan, ekzema, ruam, kerengsaan kulit, lepuh.
- Gangguan sistem imun.
- Berpotensi: Reaksi alergi serius atau hipersensitiviti (kejutan anafilaktik)

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.moh.gov.my [Public Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan UNIMED'S CHLORSEPT 5%

-Penyimpanan

Pastikan bekas ditutup rapat. Lindungi dari panas dan cahaya. Simpan di bawah 30 ° C.

-Pelupusan

Ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Dapatkan maklumat daripada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Larutan warna merah jambu kemerahan yang jelas dengan wangian lavender.

Mod Pengambilan

Topikal

Bentuk Dos

Larutan

Pembungkusan

- Ia diisi dalam botol HDPE 120ml dengan penutup HDPE skru merah.
- Ia diisi dalam botol HDPE 1000ml dengan penutup HDPE skru merah.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

25.0% v/v of Chlorhexidine gluconate 20% solution equivalent to chlorhexidine gluconate.....5% w/v

- Bahan-bahan tidak aktif

Isopropyl Alcohol, Nonyl Phenol Ethoxylated (NP9), Fragrance (Lavender), Glucono Delta Lactone, Ponceau 4R Colour, Purified Water.

-MAL number

Pengilang dan Pemegang

Pendaftaran Produk

KCK Pharmaceutical Industries Sdn. Bhd.

Plot 61, Bayan Lepas Industrial Park Phase 4, Lintang Bayan Lepas 1, 11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini RIMUP

3/11/2020

Nombor Siri

NPRA(R2)20/112