

GASTRACID Suspension

Calcium Carbonate 400 mg, Sodium Bicarbonate 150 mg, Light Magnesium carbonate 25 mg, Simethicone 83 mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Gastracid
2. Bagaimana Gastracid berfungsi
3. Sebelum mengambil Gastracid
Cara mengambil Gastracid
4. Semasa menggunakan Gastracid
Kesan-kesan sampingan
5. Cara penyimpanan dan pelupusan
6. Maklumat lanjut
7. Pengilang dan Pemegang
Pendaftaran Produk
8. Tarikh kemaskini RIMUP

Apakah kegunaan Gastracid

Gastracid digunakan untuk rawatan simptom yang disebabkan oleh refluks asid, hempedu dan pepsin ke dalam esofagus seperti regurgitasi asid, pedih ulu hati, gangguan pencernaan dan hiperasiditas.

Bagaimana Gastracid berfungsi

Garam kalsium meneutralkan keasidan gastrik dan meningkatkan peristalsis pada esofagus untuk melegakan gejala pedih ulu hati.

Natrium Bikarbonat adalah agen alkalinisasi yang meneutralkan asid perut.

Light Magnesium Carbonate bertindak balas dengan asid hidroklorik dan meneutralkan asid berlebihan dalam perut.

Simethicone berfungsi sebagai surfaktan bukan sistemik yang mengurangkan ketegangan permukaan gelembung gas di saluran gastrointestinal.

Sebelum menggunakan Gastracid

-Bila tidak boleh menggunakan

Beritahu doktor anda sebelum menggunakan Gastracid jika anda:

- mempunyai hipersensitiviti terhadap kalsium karbonat, natrium bikarbonat, magnesium karbonat, simethicone atau kepada mana-mana eksipien produk

-Mengandung dan penyusuan

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau menyusukan anak.

Gastracid suspensi boleh digunakan semasa kehamilan dan penyusuan, tetapi di bawah pengawasan doktor

-Sebelum menggunakan ubat ini

Gunakan dengan berhati-hati jika anda

- Berumur di bawah 12 tahun.
- Menggunakan produk antasid lain

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil ubat ini, termasuk mana-mana yang anda dapatkan tanpa preskripsi dari kedai farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan anda.

Sesetengah ubat dan Gastracid mungkin berinteraksi antara satu sama lain. Mereka mungkin terjejas oleh Gastracid atau mungkin menjejaskan cara ia berfungsi.

Anda perlu berbincang dengan doktor anda atau ahli farmasi jika anda menggunakan ubat berikut:

- *H2-antihistaminics*
- *tetracyclines*
- *digoxine*
- *fluoroquinolones*
- *iron salts*
- *thyroid hormones*
- *ketoconazole*
- *neuroleptics*
- *thyroxine*
- *penicillamine*
- *beta-blockers (atenolol, metoprolol, propranolol)*
- *glucocorticoid*
- *chloroquine*
- *diphosphonates*
- *estramustine*

Cara mengambil Gastracid

-Berapa banyak harus diambil

Sentiasa gunakan seperti yang ditetapkan oleh doktor anda. Anda perlu menyemak dengan doktor atau ahli farmasi jika tidak pasti.

Dos biasa

- *Dewasa & kanak-kanak lebih dari 12 tahun:* 10-20 ml selepas makan dan pada waktu tidur, hingga empat kali sehari.
- *Kanak-kanak di bawah 12 tahun:* Hendaklah diberikan hanya atas nasihat perubatan

-Bila perlu diambil

Ambil seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

-Berapa lama perlu diambil

Teruskan pengambilan seperti yang dicadangkan oleh doktor anda. Jika gejala berterusan, dapatkan nasihat doktor anda.

-Jika terlupa mengambil

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, tunggu sehingga sampai masa untuk mengambil dos seterusnya dan abaikan dos yang tertinggal. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa telah terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Mengambil terlalu banyak Gastracid boleh menyebabkan:

- Ketegangan perut
- Sindrom alkali susu (kalsium darah tinggi)

Semasa menggunakan Gastracid

-Perkara yang perlu dilakukan

- Beritahu ahli farmasi atau doktor anda sekiranya simptom berterusan selepas mengambil ubat ini.
- Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Gastracid
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

GASTRACID Suspension

Calcium Carbonate 400 mg, Sodium Bicarbonate 150 mg, Light Magnesium carbonate 25 mg, Simethicone 83 mg

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan ambil dos lebih daripada yang disarankan melainkan diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan ambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan berkongsi dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan mesin

Produk ini tidak mempunyai atau tidak dapat mempengaruhi kemampuan memandu dan menggunakan mesin.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, Gastracid boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Beritahu doktor anda jika anda dapati mana-mana kesan sampingan berikut atau mengalami apa-apa kesan lain yang tidak disenaraikan:

- Gangguan sistem imun: Reaksi anaphylactic, reaksi anaphylactoid. Reaksi hipersensitiviti seperti urtikaria.
- Metabolisme dan gangguan pemakanan: Alkalosis, pemulihan asid, Hiperkalsemia, Sindrom susu-alkali
- Gangguan pernafasan, toraks dan mediastinum: Kesan pernafasan seperti bronkospasme.
- Gangguan saluran gastrousus: Sembelit

“Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.moh.gov.my [Consumers ➔ Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]”.

Cara penyimpanan dan pelupusan Gastracid

-Penyimpanan

Pastikan bekas ditutup rapat. Simpan di bawah 30 ° C. Lindungi dari cahaya

-Pelupusan

Ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Dapatkan maklumat daripada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Suspensi warna putih hingga putih pudar dengan perisa pudina

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Calcium carbonate, Sodium bicarbonate, Light magnesium carbonate, Simethicone

- Bahan-bahan tidak aktif

Xanthan gum, Glycerine, Liquid sorbitol, Sodium methyl paraben, Titanium dioxide, Sucralose, Sodium propyl paraben, Hydrogenated polyoxyl castor oil, Cetylpyridinium chloride, Peppermint oil, Citric acid anhydrous, Hydrogen peroxide 35%, Purified water.

-MAL number

MAL21086016X

Pengilang dan Pemegang

Pendaftaran Produk

KCK Pharmaceutical Industries Sdn. Bhd.

Plot 61, Bayan Lepas Industrial Park Phase 4, Lintang Bayan Lepas 1, 11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

23/12/2025

Nombor Siri

NPRA (R2) 21/056