

WINAMOL CF Tablets

Paracetamol / Pseudoephedrine Hydrochloride / Chlorpheniramine Maleate (325 mg/30 mg/ 2mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan WINAMOL CF
2. Bagaimana WINAMOL CF berfungsi
3. Sebelum mengambil WINAMOL CF
4. Cara mengambil WINAMOL CF
5. Semasa menggunakan WINAMOL CF
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan WINAMOL CF

Ia digunakan untuk melegakan sakit kepala, sakit otot, demam, bersin, kesesakan hidung, gatal dan mata berair yang disebabkan oleh flu, selsema dan rinitis alahan (radang pada membran mucus dalam hidung).

Bagaimana WINAMOL CF berfungsi

WINAMOL CF mengandungi *Paracetamol*, *Pseudoephedrine hydrochloride* dan *Chlorpheniramine maleate* sebagai bahan aktif. *Paracetamol* dapat menghentikan mesej kesakitan daripada sampai kepada otak. *Paracetamol* juga bertindak di dalam otak untuk mengurangkan demam. *Pseudoephedrine hydrochloride* adalah *decongestant* yang dapat melegakan hidung tersumbat dan membantu anda bernafas dengan lebih mudah. *Chlorpheniramine maleate* adalah sejenis antihistamin yang boleh membantu melegakan gejala alahan.

Sebelum menggunakan WINAMOL CF

-Bila tidak boleh menggunakan

Beritahu doktor anda sebelum mengambil WINAMOL CF jika anda:

- mempunyai alahan terhadap *paracetamol*, *pseudoephedrine*, *chlorpheniramine*, antihistamin atau mana-mana bahan-bahan lain di dalam produk ini.
- mengambil atau telah mengambil ubat-ubatan yang dipanggil monoamina oksidase (MAOIs), dalam masa dua minggu.

- mengambil ubat-ubatan lain untuk melegakan demam dan selesema, hidung berair atau hidung tersumbat, ubat perangsang seperti *amphetamine* (juga digunakan untuk merawat gangguan defisit), atau penahan selera makan, atau ubat-ubatan lain yang mengandungi antihistamin (kadang-kadang digunakan untuk merawat alahan).

-Mengandung dan menyusukan anak

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau menyusukan anak. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

Jangan mengambil ubat ini jika anda mengandung dan menyusukan anak kecuali disyorkan oleh doktor.

-Sebelum menggunakan ubat ini

Rujuk dengan doktor anda sebelum mengambil ubat ini jika anda mempunyai masalah darah tinggi yang teruk, masalah koronari arteri yang teruk atau masalah buah pinggang yang teruk.

Ambil dengan berhati-hati jika anda menghidapi:

- masalah hati atau masalah buah pinggang yang biasa ke sederhana.
- Penyakit kardiovaskular, *arrhythmias*, darah tinggi, *hyperthyroidism*, pembesaran prostatik, diabetes, glaukoma, atau *phaeochromocytoma* (tumor berdekatan dengan buah pinggang), epilepsi, bronkitis (infeksi pada paru-paru), bronkitiasis (pengumpulan mucus yang berlebihan di dalam paru-paru) dan asma bronkial.
- mengambil ubat *beta blocker* atau ubat anti hipertensif yang lain.

Produk ini mengandungi *PARACETAMOL*. Jangan ambil ubat-ubatan lain yang mengandungi *paracetamol* pada masa yang sama.

-Jika mengambil ubat-ubatan lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil ubat ini, termasuk mana-mana yang anda dapatkan tanpa

preskripsi dari kedai farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan anda.

Rujuk dengan doktor atau ahli farmasi and jika anda mengambil ubat-ubatan berikut:

- *warfarin* atau *coumarin* yang lain (ubat-ubatan untuk mencairkan darah)
- produk yang mengandungi *pseudoephedrine hydrochloride* dan MAOIs (atau dalam masa dua minggu setelah berhenti mengambil MAOI).
- *Decongestant*, penahan selera makan dan *psychostimulants* seperti *amphetamine*.
- produk yang mengandungi *pseudoephedrine*
- *chlorphenamine* dan hipnotik atau anxiolitik (anti keresahan)
- ubat yang mengandungi *phenytoin* untuk penyakit sawan

Cara mengambil WINAMOL CF

-Berapa banyak harus diambil

Sentiasa gunakan WINAMOL CF seperti yang ditetapkan oleh doktor anda. Anda perlu menyemak dengan doktor atau ahli farmasi jika tidak pasti.

Dos biasa

Dewasa (termasuk warga emas) dan kanak-kanak berusia 12 tahun ke atas: Ambil 1 hingga 2 tablet setiap 4 hingga 6 jam mengikut keperluan.

Dos harian maksimum: 8 tablet dalam masa 24 jam.

Jangka masa maksimum penggunaan tanpa nasihat doktor: 7 hari

Selang dos minimum: 4 jam

Kanak-kanak 6-12 tahun:

Ambil tablet setiap 4 hingga 6 jam mengikut keperluan.

Jangka masa maksimum penggunaan tanpa nasihat doktor: 3 hari.

Selang dos minimum: 4 jam

Tidak digalakkan untuk kanak-kanak di bawah 6 tahun, kecuali dengan nasihat doktor.

-Bila perlu diambil

Untuk pengambilan secara oral.

Dos interval minimum: 4 jam.

WINAMOL CF Tablets

Paracetamol / Pseudoephedrine Hydrochloride / Chlorpheniramine Maleate (325 mg/30 mg/ 2mg)

Jangan melebihi kuantiti dos yang disyorkan atau kekerapan dos yang disyorkan.

Tidak boleh digunakan bersama produk-produk lain yang mengandungi *paracetamol*, *decongestant* atau antihistmin, termasuk ubat batuk dan demam.

-Berapa lama perlu diambil

Teruskan pengambilan WINAMOL CF seperti yang dicadangkan oleh doktor anda. Jika gejala berterusan, dapatkan nasihat doktor anda.

-Jika terlupa mengambil

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, tunggu sehingga sampai masa untuk mengambil dos seterusnya dan abaikan dos yang tertinggal. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa telah terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan

-Perkara yang perlu dilakukan

- Beritahu ahli farmasi atau doktor anda sekiranya simptom berterusan selepas mengambil ubat ini.
- Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan WINAMOL CF.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan ambil dos lebih daripada yang disarankan melainkan diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan ambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan berkongsi dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Elakkan pengambilan alkohol bersama dengan ubat ini. Produk ini mungkin menyebabkan loya, pening, atau penglihatan yang kabur. Jangan memandu atau mengendalikan jentera sehingga anda pasti kesan ubat ini terhadap anda.

AMARAN ALERGI: *Paracetamol* boleh menyebabkan alahan kulit yang teruk. Gejala boleh termasuk kemerahan kulit, lepuh dan ruam. Ini boleh menjadi tanda-tanda keadaan serius. Jika tindak balas ini berlaku, hentikan penggunaan dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, WINAMOL CF boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya. Berjumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas mengambil ubat ini. Berhenti mengambil ubat ini dan beritahu doktor anda dengan segera jika anda mengalami kesan sampingan biasa ini atau sebarang tindak balas selain daripada yang disenaraikan di bawah:

- Kegugupan, Insomnia.
- Pening
- Muntah, mulut kering, loya
- Sedasi, mengantuk
- Masalah tumpuan, koordinasi yang tidak normal, pening, sakit kepala
- Penglihatan kabur
- Mual, mulut kering
- Keletihan

Tindakbalas ini jarang berlaku. Reaksi hipersensitiviti kulit termasuk ruam kulit, *angioedema*, *Stevens Johnson Syndrome/Toxic Epidermal Necrolysis* telah dilaporkan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan WINAMOL CF

-Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C. Lindungi daripada cahaya. Jauhi daripada kanak-kanak.

-Pelupusan

Ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Dapatkan maklumat daripada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Tablet bulat berwarna putih dan berbentuk biconvex dengan huruf 'CF' di bahagian atas dan kosong di bahagian bawah.

Mod Pengambilan

Oral

Bentuk Dos

Tablet tidak bersalut

Pembungkusan

10 tablet dibungkus dalam Alu-PVDC pek.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Paracetamol, Pseudoephedrine Hydrochloride, Chlorpheniramine Maleate

- Bahan-bahan tidak aktif

Microcrystalline Cellulose, Pregelatinized starch, Colloidal Anhydrous Silica/Colloidal Silicone Dioxide (Aerosil), Stearic Acid, Potassium Sorbate, Povidone K25 (Kollidon K25).

-Nombor MAL

MAL23036011AZ

WINAMOL CF Tablets

Paracetamol / Pseudoephedrine Hydrochloride / Chlorpheniramine Maleate (325 mg/30 mg/ 2mg)

Pengilang dan Pemegang

Pendaftaran Produk

KCK Pharmaceutical Industries Sdn.
Bhd.
Plot 61, Bayan Lepas Industrial Park
Phase 4, Lintang Bayan Lepas 1,
11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

21/07/2023

Nombor Siri

NPRA(R2/1)230717/1105