

FLAMEX SUSPENSION

Sodium Alginate/Dried Aluminium Hydroxide/Calcium Carbonate (250mg/100mg/75mg per 5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan FLAMEX
2. Bagaimana FLAMEX berfungsi
3. Sebelum mengambil FLAMEX
4. Cara mengambil FLAMEX
5. Semasa menggunakan FLAMEX
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan FLAMEX

FLAMEX adalah antasid yang digunakan untuk melegakan pedih hulu hati, masalah pencernaan dan masalah lain yang menyebabkan refluks asid.

Bagaimana FLAMEX berfungsi

FLAMEX adalah ubat yang membentuk lapisan pelindung pada bahagian atas dalam perut untuk mengelakkan asid perut daripada mengalir keluar dari perut ke dalam saluran pemakanan yang akan menyebabkan kesakitan dan ketidakselesaan.

Sebelum menggunakan FLAMEX

-Bila tidak boleh menggunakan

Produk ini tidak sesuai digunakan oleh individu yang mempunyai alahan terhadap sebarang bahan-bahan yang terdapat di dalam produk ini.

-Mengandung dan menyusukan anak

Anda boleh menggunakan FLAMEX sekiranya anda hamil atau menyusukan anak. Seperti semua ubat-ubatan lain, tempoh rawatan perlu dihidkan.

-Sebelum menggunakan ubat ini

Sila beritahu doktor anda jika anda mengambil sebarang ubat-ubatan lain, termasuk produk herba atau apa-apa yang anda beli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

-Jika mengambil ubat-ubatan lain

Jangan mengambil FLAMEX dalam tempoh dua jam selepas mengambil ubat-ubatan lain melalui mulut.

Cara mengambil FLAMEX

-Berapa banyak harus diambil

Sentiasa gunakan seperti yang ditetapkan oleh doktor anda. Anda perlu menyemak dengan doktor atau ahli farmasi jika tidak pasti.

Dos biasa

Dewasa dan kanak-kanak di atas 12 tahun: 10-20ml selepas makan dan sebelum tidur, sehingga empat kali sehari.

Kanak-kanak di bawah 12 tahun: diberikan atas nasihat doktor.

-Bila perlu diambil

Ambil seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda. Guncang botol sebelum digunakan. Ambil ubat ini selepas makan dan sebelum tidur.

-Berapa lama perlu diambil

Teruskan pengambilan FLAMEX seperti yang dicadangkan oleh doktor anda. Jika gejala berterusan, dapatkan nasihat doktor anda.

-Jika terlupa mengambil

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, tunggu sehingga sampai masa untuk mengambil dos seterusnya dan abaikan dos yang tertinggal. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa telah terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan FLAMEX

-Perkara yang perlu dilakukan

- Beritahu doktor atau ahli farmasi anda sekiranya simptom berterusan selepas mengambil ubat ini.

- Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan FLAMEX.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan ambil dos lebih daripada yang disarankan melainkan diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan ambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor.
- Jangan berkongsi FLAMEX dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

FLAMEX mengandungi natrium dan kalsium. Jika anda telah dinasihatkan untuk mengikuti diet terhad, sila dapatkan nasihat doktor.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, FLAMEX boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mengalaminya.

Jika simptom berterusan, jangan ambil ubat ini dan rujuk kepada doktor.

Berhenti menggunakan FLAMEX dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera jika anda mengalami sebarang gejala berikut:

- Sembelit
- Masalah usus jikan mengambil dos yang besar.
- Tulang lemah/tulang lembut.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan FLAMEX

FLAMEX SUSPENSION

Sodium Alginate/Dried Aluminium Hydroxide/Calcium Carbonate (250mg/100mg/75mg per 5ml)

-Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C. Simpan semua ubat daripada penglihatan dan jangkauan kanak-kanak.

Tarikh kemaskini RIMUP

22/03/2024

Nombor Siri

NPRA(R2/2)231228/1190

-Pelupusan

Ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Dapatkan maklumat daripada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Suspensi berwarna merah jambu dengan perasa oren dan pudina.

Mod Pengambilan

Oral

Bentuk Dos

Suspensi Oral (Cecair)

Pembungkusan

100ml dan 200ml botol HDPE lutsinar dengan penutup HDPE berwarna putih dengan cawan penyukat.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Sodium Alginate, Dried Aluminium Hydroxide, Calcium Carbonate.

- Bahan-bahan tidak aktif

Syrup, Sodium Methylparaben, Sodium Propylparaben, Cetylpyridium Chloride, Sodium Bicarbonate, Saccharin Sodium, Microcrystalline Cellulose, Xanthan Gum, Carboxymethylcellulose Sodium, Sorbitol Solution 70%, Erythrosine/ FD & C Red No.3, Orange Flavour, Purified Water dan Peppermint Oil.

- Nombor MAL

MAL15055036X

Pengilang dan Pemegang

Pendaftaran Produk

KCK Pharmaceutical Industries Sdn. Bhd.

Plot 61, Bayan Lepas Industrial Park
Phase 4, Lintang Bayan Lepas 1,
11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang,
Malaysia.