PEDIATRIC BENCODYL LINCTUS

(Diphenhydramine HCl 7mg/5ml, Ammonium Chloride 67.5mg/5ml, Levomenthol 0.9mg/5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan ***PEDIATRIC BENCODYL LINCTUS***
2. Bagaimana ***PEDIATRIC BENCODYL LINCTUS*** berfungsi
3. Sebelum menggunakan ***PEDIATRIC BENCODYL LINCTUS***
4. Cara menggunakan ***PEDIATRIC BENCODYL LINCTUS***
5. Semasa menggunakan ***PEDIATRIC BENCODYL LINCTUS***
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan ***PEDIATRIC BENCODYL LINCTUS***
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan *PEDIATRIC BENCODYL LINCTUS*

Untuk batuk yang produktif dan komplikasi yang berkaitkan dengan gangguan alergi dan manifestasi alergi penyakit pernafasan contohnya selesema, *Flu*, dan Bronkitis.

Bagaimana *PEDIATRIC BENCODYL LINCTUS* berfungsi

Diphenhydramine Hydrochloride membantu menghalang kesan fisiologi histamin.
Ammonium Chloride akan menggalakkan rembesan kahak di saluran udara, bagi memudahkan penyingkiran cecair.
Secara umumnya, ubat ini digunakan untuk merawat batuk alergi akut pada kanak-kanak.

Sebelum menggunakan *PEDIATRIC BENCODYL LINCTUS*

- *Bila tidak boleh menggunakan*

Jangan gunakannya jika:
• anda mengambil atau mempunyai perencat monoamine oxidase (MAOI) (rawatan untuk kemurungan) dalam tempoh 14 hari sebelumnya.
• anda sensitif kepada antihistamin
• jika tidak disuruh oleh doktor atau ahli farmasi anda.

Mengandung dan menyusukan anak

Jangan ambil ***PEDIATRIC BENCODYL LINCTUS*** jika anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau rasa mungkin mengandung.

Jangan ambil ***PEDIATRIC BENCODYL LINCTUS*** jika anda sedang menyusukan anak. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

Secara amnya, antihistamin membawa risiko yang tinggi kepada bayi, bayi baru lahir, dan bayi pra-matang khususnya. Terapi antihistamin adalah contraindikasi dengan ibu yang sedang menyusu.

Sebelum menggunakan PEDIATRIC BENCODYL LINCTUS

- ***PEDIATRIC BENCODYL LINCTUS*** tidak sesuai digunakan oleh kanak-kanak kurang daripada 2 tahun. Ubat ini perlu digunakan secara berhati-hati dan mendapat nasihat doktor jika ubat ini digunakan untuk kanak-kanak 2 hingga 6 tahun.

- *Jika mengambil ubat-ubat lain*

  Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan *PEDIATRIC BENCODYL LINCTUS*

- *Berapa banyak harus digunakan*

  -Umur 2 hingga 6 tahun:
  5ml, 3-4 kali sehari.

  -Umur 6 hingga 12 tahun:
  5-10ml, 3-4 kali sehari

  Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- *Bila perlu digunakan*

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- *Berapa lama perlu digunakan*

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- *Jika terlupa menggunakan*

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- *Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)*

Gejala disebabkan oleh pengambilan *Diphenhydramine* dan *Levomenthol* berlebihan adalah rasa mengantuk, pening, ataxia, keasan anti-cholinergic (masalah mental), pyrexia (demam), sakit kepala, sawan, halusinasi, keterujaan dan kesusahan pernafasan.

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan *PEDIATRIC BENCODYL LINCTUS*

- *Perkara yang perlu dilakukan*

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan ***PEDIATRIC BENCODYL LINCTUS***.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

- *Perkara yang tidak boleh dilakukan*

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi ***PEDIATRIC BENCODYL LINCTUS*** dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

- *Perkara yang perlu diberi perhatian*

Memandu dan menggunakan jentera

Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera, Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, ***PEDIATRIC BENCODYL LINCTUS*** boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya. Kesan-kesan sampingan berikut telah dilaporkan untuk bahan-bahan kandungan ***PEDIATRIC BEACODYL LINCTUS***:
Kesan sampingan yang biasa:
Mengantuk, mudah terangsang, sakit kepala, koordinasi yang lemah, kesukaran membuang air kecil, kekeringan mulut, sakit perut, lendir menebal dan penglihatan kabur.

kesan sampingan yang jarang berlaku:
Tekanan darah rendah, kekejangan otot, pening, kekeliruan, kemurungan, tidur terganggu, gegaran, sawan, denyutan jantung yang tidak teratur atau berdebar-debar, reaksi alahan, masalah hati dan gangguan darah (Jika anda mengalami lebam spontan atau pendarahan (tanda-tanda gangguan darah mungkin berlaku, hentikan rawatan dan mendapatkan nasihat segera daripada doktor anda.)

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Kesan sampingan yang paling biasa adalah rasa lali. Kesan sampingan yang lain termasuk gangguan dalam usus seperti rasa loya, muntah-muntah, cirit-birit atau sembelit dan kesakitan epigastric. Ia boleh menyebabkan sakit kepala, penglihatan kabur, tinnitus, keterujaan atau kemurungan, keresahan, mimpi ngeri, tiada selera makan, sukar kencing, kekeringan mulut, ketegangan pada dada dan rasa kesemutan, rasa berat dan kelemahan tangan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan *PEDIATRIC BENCODYL LINCTUS*
Penyimpanan

Simpan dalam bekas tertutup rapat.
Simpan di bawah 30ºC.
Lindungi daripada cahaya.
Jauhkan dari jangkauan kanak-kanak.

- *Pelupusan*

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut
- *Rupa dan warna produk*

Larutan berwarna coklat dengan perisa strawberi.

- *Mod Pengambilan*

Oral

- *Bentuk Dos*

Larutan Oral (Cecair)

- *Pembungkusan*

60ml & 100ml amber botol PET dengan penutup skru HDPE putih. Cawan sukatan diletakkan di atas penutup botol.

- *Bahan-bahan kandungan*
  - Bahan aktif

Diphenhydramine Hydrochloride, Ammonium Chloride , Levomenthol.

  - Bahan tidak aktif

Sodium Benzoate, Sodium Citrate, Citric Acid Anhydrous, Chloroform Spirit, Liquid Glucose, Liquid Caramel, Strawberry Flavour, Sugar Syrup, Air suling.

- *Nombor MAL*

MAL16065027AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
KCK PHARMACEUTICAL INDUSTRIES SDN. BHD.
Plot 61, Bayan Lepas Industrial Park Phase 4, Lintang Bayan Lepas 1,
11900 Bayan Lepas,
Pulau Pinang, Malaysia.

Tarikh Kemaskini
27/07/2022

Serial Number:
NPRA(R2/1)220726/922