

SILVERDERM CREAM

Silver Sulfadiazine (1g/100g)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan **Silverderm**
2. Bagaimana **Silverderm** berfungsi
3. Sebelum menggunakan **Silverderm**
4. Cara menggunakan **Silverderm**
5. Semasa menggunakan **Silverderm**
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan **Silverderm**
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan **Silverderm**

Silverderm digunakan untuk mencegah dan merawat luka sepsis pada pesakit dengan luka bakar tahap kedua dan ketiga.

Bagaimana **Silverderm** berfungsi

Silver sulfadiazine mempunyai aktiviti antimikrob yang luas terhadap bakteria Gram-positif dan Gram-negatif. Ia berfungsi dengan membunuh bakteria atau menghentikan pertumbuhan bakteria. Ini membantu untuk mengurangkan dan mencegah infeksi. Masa yang diambil untuk ubat berfungsi berbeza mengikut jenis luka.

Sebelum menggunakan **Silverderm**

- Bila tidak boleh menggunakan

- Mempunyai alahan (hipersensitif) terhadap *silver sulfadiazine*, atau mana-mana *sulfonamides* atau bahan-bahan lain yang disenaraikan dalam risalah ini.
- Wanita hamil yang menghampiri atau dijangka bersalin.
- Bayi pramatang.
- Bayi yang baru lahir dalam tempoh 2 bulan pertama.

- Sebelum mengambil **Silverderm**

Maklumkan kepada doktor sekiranya anda mempunyai/mengalami:

- sel darah putih yang rendah
- masalah buah pinggang atau hati
- luka terbakar yang meluas
- kekurangan enzim *glucose-6-phosphate dehydrogenase* (G6PD)

Penyerapan *propylene glycol* yang terkandung dalam **Silverderm** mungkin akan mengganggu keputusan ujian makmal.

Sekiranya anda tidak pasti sama ada anda perlu mula menggunakan produk ini, rujuk kepada doktor anda.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Maklumkan doktor atau pegawai farmasi semua ubat yang anda ambil termasuklah suplemen dan ubat tradisional.

Ubat yang disenaraikan dibawah ini mungkin boleh berinteraksi dengan **Silverderm**:

- ejen debridemen enzimatik (menyingkirkan tisu mati daripada luka)
- ejen hipoglisemik oral (untuk rawatan diabetes jenis 2)
- phenytoin (mencegah sawan)
- cimetidine (digunakan untuk pedih ulu hati dan ulser).

- Mengandung dan menyusu bayi

Silverderm tidak boleh digunakan pada bulan terakhir kehamilan.

Sulfonamide dikesan dalam susu ibu pada paras yang rendah dan perlu digunakan dengan berhati-hati oleh ibu yang menyusu.

Doktor anda akan membincangkan risiko dan faedah penggunaan **Silverderm** semasa hamil atau menyusu.

Cara menggunakan **Silverderm**

- Berapa banyak harus digunakan

Krim hendaklah disapu sekali hingga dua kali sehari pada ketebalan kira-kira 1/16 inci pada kawasan terbakar.

- Bila perlu digunakan

Gunakan seperti yang diarahkan oleh doktor.

- Berapa lama perlu digunakan

Rawatan harus diteruskan sehingga penyembuhan yang memuaskan berlaku, atau sehingga kawasan luka yang terbakar itu sedia untuk cantuman kulit.

- Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa menggunakan ubat ini, guna secepat mungkin apabila anda teringat. Jangan guna dos yang berganda untuk menggantikan dos yang terlupa.

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan **Silverderm**

- Perkara yang perlu dilakukan

- Patuhi arahan doktor atau ahli farmasi anda ketika menggunakan **Silverderm**. Jika anda tidak pasti, rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.
- Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda dengan segera sekiranya anda perasan sebarang kesan sampingan atau kesan sampingan menjadi serius atau apa-apa yang menyebabkan anda berasa tidak sihat.
- Jika anda hamil atau merancang untuk hamil semasa menggunakan **Silverderm**, maklumkan kepada doktor anda dengan segera.
- Jika anda merancang untuk mengambil ubat baru, ingatkan doktor dan ahli farmasi anda yang anda sedang menggunakan **Silverderm**.

Silverderm mengandungi *chlorhexidine*. Maklumkan doktor sekiranya anda mempunyai alergi terhadap *chlorhexidine*. Hentikan penggunaan ubat ini dan dapatkan rawatan segera jika anda mengalami ruam, gatal-gatal, bengkak, kesukaran bernafas, pening atau degupan jantung yang laju.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan menggunakan **Silverderm** selepas tarikh luput yang dinyatakan pada tiub dan kotak tersebut.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Ruam kulit yang berpotensi mengancam nyawa (sindrom *Stevens-Johnson*, nekrolisis

SILVERDERM CREAM

Silver Sulfadiazine (1g/100g)

epidermis toksik) telah dilaporkan dengan penggunaan *sulfadiazine*, yang pada mulanya muncul sebagai tompok-tompok kemerahan yang bersasar atau tompok-tompok bulat, selalunya dengan lepuh di bahagian tengah.

Tanda-tanda lain yang perlu diperhatikan termasuk ulser di dalam mulut, tekak, hidung, alat kelamin dan konjunktivitis (mata merah dan bengkak).

Ruam kulit yang berpotensi mengancam nyawa ini sering disertai dengan simptom seperti selesema. Ruam kulit mungkin akan merebak kepada lepuh yang meluas atau pengelupasan kulit.

Risiko tertinggi untuk kejadian reaksi kulit yang serius adalah dalam beberapa minggu pertama rawatan.

Jika anda telah mengalami sindrom *Stevens-Johnson* atau nekrolisis epidermis toksik dengan penggunaan *silver sulfadiazine*, anda tidak boleh memulakan semula penggunaan *silver sulfadiazine* pada bila-bila masa.

Jika anda mengalami ruam atau simptom kulit yang dinyatakan, dapatkan nasihat segera daripada doktor dan maklumkan doktor bahawa anda sedang mengambil ubat ini.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat lain, **Silverderm** boleh mendatangkan kesan sampingan kepada se-setengah orang walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Maklumkan kepada doktor anda sekiranya anda mengalami simptom-simptom berikut:

Biasa:

- Kerengsaan, rasa terbakar atau gatal-gatal.
- Ruam di sekitar kawasan luka (termasuk ekzema dan sentuhan dermatitis).
- Mengurangkan sel darah putih (leukopenia). Ini boleh membawa kepada peningkatan risiko jangkitan. Ini biasanya kembali normal dalam masa beberapa hari;

bagaimanapun, doktor perlu memantau anda dengan teliti untuk memantau anda dengan teliti bagi memastikan kiraan kembali normal.

Jarang:

- Perubahan warna kulit (disebabkan oleh penyerapan perak dalam tempoh yang lama).

Sangat jarang:

- Kegagalan buah pinggang. Maklumkan kepada doktor anda jika anda mengalami kesukaran untuk membuang air kecil, mengeluarkan jumlah air kencing yang lebih banyak atau lebih sedikit daripada biasa, jika anda mendapati ada darah atau kekeruhan dalam air kencing anda. Ini mungkin tanda bahawa buah pinggang anda tidak berfungsi dengan baik.
- Ruam kulit yang boleh mengancam nyawa (sindrom Stevens-Johnson, nekrolisis epidermis toksik).

Jika anda perasan terdapat sebarang kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di sini, maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan Silverderm

- Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C di dalam bekas yang tertutup rapi.

Lindungi daripada haba dan pancaran cahaya.

Untuk kegunaan luaran sahaja.

Jauhi daripada kanak-kanak.

- Pelupusan

Jika anda diarahkan oleh doktor untuk berhenti menggunakan **Silverderm** atau ia telah melepasi tarikh luput, tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan baki produk tersebut.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Silverderm adalah krim berwarna putih.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan Aktif

Silver sulfadiazine 1g/100g.

- Bahan tidak aktif

Liquid paraffin, chlorhexidine gluconate solution 20%, zalibra 6888 (colour perfume), lanolin anhydrous, cetyl alcohol, carbomer 940, polysorbate 80, triethanolamine, propylene glycol, purified water.

- Nombor MAL

MAL20021379AZ

Pengilang

T.O. CHEMICALS (1979) Ltd.,
280 Soi Sabaijai, Suthisarnwinjai
Road, Samsennok, Huay-Kwang,
Bangkok 10310, Thailand.

Pemegang Pendaftaran Produk

IMEKS Pharma Sdn. Bhd.
No. 5 & 9, Jalan Udang Harimau 2,
Medan Niaga Kepong,
51200 Kuala Lumpur, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

12/03/2025

Nombor siri:

BPFK(R4/1)170216/00041