

TYSTATIN ORAL SUSPENSION®

Nystatin (100,000 unit setiap ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Tystatin
2. Bagaimana Tystatin berfungsi
3. Sebelum menggunakan Tystatin
4. Cara menggunakan Tystatin
5. Semasa menggunakan Tystatin
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Tystatin
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Tystatin

Tystatin mengandungi bahan aktif yang dikenali sebagai nystatin.

Nystatin didapati sebanyak 100,000 unit setiap mL. Ia digunakan untuk mencegah dan merawat jangkitan kulat mulut yang disebabkan oleh kulat yang dikenali sebagai Candida.

Bagaimana Tystatin berfungsi

Nystatin tergolong dalam kumpulan ubat- ubatan yang dikenali sebagai antibiotik anti- kulat. Ia berfungsi dengan mengganggu pembentukan membran sel dan dengan itu menghalang pertumbuhan kulat yang menyebabkan jangkitan.

Sebelum menggunakan Tystatin

- Bila tidak boleh menggunakan

- Pernah mengalami alahan terhadap bahan aktif nystatin, atau terhadap bahan-bahan lain dalam produk ini.

-Sebelum mula menggunakan Tystatin

Beritahu doktor anda sekiranya anda:

- Alah terhadap ubat-ubatan lain, makanan, bahan pengawet atau bahan pewarna
- Mempunyai jangkitan kulat pada paru-paru atau pada kulit
- Mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang mengandung.

Bincang dengan doktor sekiranya anda tidak pasti samada anda patut

mula mengambil ubat ini atau tidak.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Maklumkan kepada doktor anda sekiranya anda sedang mengambil ubat lain, termasuk ubatan yang didapatkan tanpa preskripsi.

Anda mungkin perlu mengubah dos anda atau mengambil ubat lain.

-Semasa mengandung dan menyusu bayi

Sekiranya anda mengandung atau sedang menyusu, beranggapan anda telah mengandung, beritahu doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat sebelum mengambil ubat ini. Ia masih belum dikenalpasti sama ada nystatin boleh membahayakan bayi semasa mengandung. Ambil ubat ini sekiranya diperlukan dan diarahkan oleh doktor.

Ia masih belum dikenalpasti sama ada nystatin didapati dalam susu ibu. Tanya doktor sebelum mula mengambil ubat ini.

Cara menggunakan Tystatin

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Goncangkan botol sebelum guna, ambil jumlah yang betul dengan menggunakan penitis penyukat yang disediakan.

Ubat itu harus dikekalkan dalam mulut selama yang mungkin sebelum menelan. Individu harus mengelakkan pengambilan makanan atau minuman lebih awal daripada satu jam selepas dos. Bagi bayi dan anak-anak, gunakan separuh dos di setiap sisi mulut.

- Berapa banyak harus digunakan

Kanak-kanak dan Dewasa

Satu hingga enam ml (100,000 hingga 600,000 unit) empat kali sehari selepas makan.

Bayi

Satu ml (bersamaan dengan 100,000 unit) empat kali sehari selepas makan.

- Bila perlu digunakan

Ambil ubat ini seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda. Jangan guna ubat ini jika penutup botol didapati rosak. Goncangkan botol sebelum guna.

- Berapa lama perlu digunakan

Tempoh rawatan bergantung kepada jangkitan yang anda alami. Individu yang mengalami jangkitan serius mungkin memerlukan jangka rawatan yang panjang. Sekiranya anda tidak mematuhi arahan sepenuhnya yang diberikan oleh doktor anda, jangkitan dan simptom-simptom tersebut mungkin kembali semula.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos

TYSTATIN ORAL SUSPENSION[®]

Nystatin (100,000 unit setiap ml)

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tystatin Oral Suspension ialah larutan yang berwarna kuning dengan rasa raspberi-vanilla.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Setiap ml mengandungi 100,000 unit nystatin.

-Bahan tidak aktif

Polyethylene glycol 1500, microcrystalline cellulose, glycerin, carboxymethylcellulose sodium, saccharin sodium, polysorbate 80, purified water, raspberry essence and vanilla flavor. Methyl paraben dan propyl paraben sebagai pengawet.

-Bungkusan

Ia dibekalkan dalam botol 12ml, 30ml dan 60ml.

-Nombor MAL

MAL20032250AZ

Pengilang

T.O Chemicals (1979) Co. Ltd.
280 Soi Sabaijai, Suthisarnwinijai
Road, Samsennok, Huay-Kwang,
Bangkok 10310, Thailand.

Pemegang Pendaftaran Produk

IMEKS Pharma Sdn. Bhd.
No. 5 & 9, Jalan Udang Harimau 2,
Medan Niaga Kepong,
51200 Kuala Lumpur, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

23/11/2020

Nombor siri

NPRA(R2/1)201117/557