

LANOLONE TABLET

Allopurinol / Benzbromarone (100mg / 20mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Lanolone
2. Bagaimana Lanolone berfungsi
3. Sebelum menggunakan Lanolone
4. Cara menggunakan Lanolone
5. Semasa menggunakan Lanolone
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Lanolone
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Lanolone

Lanolone digunakan untuk merendahkan paras asid urik yang tinggi dalam darah (hyperuricaemia) yang berkaitan dengan gout atau keadaan lain seperti masalah buah pinggang, penyakit metabolik, penyakit kulit tertentu, kanser dan rawatan dengan diuretik. Lanolone tidak boleh digunakan untuk merawat kesakitan semasa serangan gout akut.

Bagaimana Lanolone berfungsi

Lanolone mengandungi bahan aktif allopurinol dan benzbromarone yang berfungsi sebagai perencat enzim dengan menghalang pembentukan asid urik daripada hypoxanthine. Ini membantu mengurangkan tahap asid urik dalam badan dan mengelak pendedapan kristal asid urik di dalam sendi yang menyebabkan keradangan, bengkak dan kesakitan.

Sebelum menggunakan Lanolone

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil Lanolone jika anda:

- mengalami alahan terhadap allopurinol, benzbromarone atau bahan-bahan kandungan lain dalam produk ini.

- Sebelum mula menggunakan Lanolone

Beritahu doktor anda jika anda:

- mempunyai alahan terhadap ubat-ubatan lain, makanan, bahan pengawet atau perwarna.

Beritahu doktor anda jika anda mempunyai atau pernah mengalami sebarang masalah kesihatan seperti yang berikut:

- masalah hati atau buah pinggang
- masalah tiroid
- masalah jantung atau tekanan darah tinggi dan anda sedang mengambil ubat diuretik dan/atau ACE-inhibitors

- Ruam kulit yang serius (sindrom Stevens-Johnson (SJS), nekrolisis epidermis toksik (TEN), sindrom hipersensitiviti yang dipanggil Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS))
- sedang mengalami serangan gout akut
- diabetes (kencing manis)

Untuk mengurangkan risiko serangan gout, ubat-ubatan seperti colchicine atau ubat anti-radang bukan steroid (NSAID) mungkin dicadangkan oleh doktor anda sebelum atau semasa mula mengambil Lanolone. Doktor anda akan menasihati anda mengenai bagaimana ubat-ubatan ini diambil.

Benzbromarone boleh menyebabkan masalah hati. Jalani ujian darah secara berkala untuk memeriksa paras asid urik anda dan memantau fungsi hati dan buah pinggang anda.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil ubat lain, termasuk sebarang ubat yang anda peroleh tanpa preskripsi, ubat herba atau produk semulajadi.

Lanolone mungkin berinteraksi dengan sesetengah ubat termasuk ubat-ubat berikut:

- ubat yang digunakan untuk kemoterapi (cth. 6-mercaptopurine, azathioprine dan cyclophosphamide)
- cyclosporine (untuk merawat psoriasis, rheumatoid arthritis atau selepas pemindahan organ)
- probenecid (merendahkan paras asid urik)
- phenytoin (merawat sawan)
- theophylline (merawat asma)
- ampicillin atau amoxicillin (antibiotik)
- aspirin atau ubat berkaitan (salicylate)
- ubat yang digunakan untuk mencegah pembekuan darah (cth. warfarin)
- chlorpropamide (merawat kencing manis)
- didanosine (merawat jangkitan HIV)
- thiazide diuretik (pil air) atau ACE-inhibitors seperti captopril (merawat tekanan darah tinggi)
- vidarabine (merawat herpes simplex atau cacar air)
- aluminium hidroksida (antasid)

Ubat-ubatan ini mungkin dipengaruhi oleh Lanolone atau mungkin menjejaskan fungsinya. Anda mungkin memerlukan

jumlah ubat yang berbeza atau mungkin perlu mengambil ubat yang lain.

Jika anda tidak pasti sama ada anda sedang mengambil sebarang ubat tersebut, periksa dengan doktor atau ahli farmasi anda.

- Semasa mengandung dan menyusu bayi

Jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusu bayi, bincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil ubat ini.

Cara menggunakan Lanolone

Sentiasa mengambil Lanolone sepertimana yang diarahkan oleh doktor anda. Jika anda tidak pasti, dapatkan nasihat daripada doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa: 1 tablet sehari

Kanak-kanak: Maklumat penggunaan ubat ini di kalangan kanak-kanak adalah amat terhad. Ubat ini hanya boleh diberikan kepada kanak-kanak apabila dipreskripsikan oleh doktor.

Dos yang lebih rendah digunakan untuk orang tua atau jika anda mempunyai masalah buah pinggan dan/atau masalah hati.

- Bila perlu digunakan

Ambil Lanolone seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda. Telan ubat ini dengan air yang secukupnya dan selepas makan boleh mengurangkan kesakitan atau ketidakselesaan perut.

Ambil ubat anda pada masa yang tetap setiap hari untuk kesan terbaik. Ia juga akan membantu anda untuk ingat masa mengambil ubat.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan mengambil ubat anda seperti yang dinasihatkan oleh doktor anda. Lanolone membantu mencegah serangan gout tetapi tidak menyembuhkannya. Adalah penting untuk anda terus mengambil ubat ini walaupun anda telah berasa sihat.

Jangan berhenti mengambil Lanolone tanpa berbincang dengan doktor anda. Jika anda terdapat sebarang persoalan, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera. Simptom-simptom terlebih dos termasuk rasa loya, muntah-muntah, cirit-birit dan pening.

Semasa menggunakan Lanolone

- Perkara yang perlu dilakukan

- Maklumkan semua doktor, doktor gigi atau ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil Lanolone.
- Berhenti mengambil Lanolone dengan serta-merta dan periksa dengan doktor anda jika terdapat ruam kulit atau reaksi alahan yang lain.
- Ambil ubat anda mengikut arahan doktor. Ia adalah penting untuk meminum air yang secukupnya untuk mencairkan air kencing. Ini akan membantu mencegah pembentukan batu karang.
- Maklumkan kepada doktor anda sekiranya anda mengalami serangan gout akut sewaktu mengambil Lanolone. Doktor anda akan memberikan ubat untuk melegakan serangan itu. Anda boleh terus mengambil Lanolone.
- Jika anda akan mula mengambil sebarang ubat baru, ingatkan doktor atau ahli farmasi bahawa anda sedang mengambil Lanolone.
- Maklumkan kepada doktor anda dengan segera sekiranya anda mengandung semasa mengambil Lanolone.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan mengambil Lanolone untuk merawat serangan gout akut.
- Jangan berhenti mengambil ubat atau mengubah dos tanpa merujuk kepada doktor anda.
- Jangan mengambil Lanolone yang telah melepasi tarikh luput yang dicetak pada kotak dan strip ubat.
- Jangan berikan ubat ini kepada orang lain, walaupun mereka mengalami simptom yang sama seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Lanolone mungkin akan mengakibatkan sesetengah orang berasa mengantuk, pening atau kurang koordinasi diri. Jangan memandu atau mengendalikan mesin berbahaya jika anda terpengaruhi.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, Lanolone boleh menyebabkan kesan sampingan walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda perasan sebarang tanda-tanda berikut yang merisaukan anda:

- sakit perut, termasuk loya, muntah-muntah atau cirit-birit
- pening, rasa mengantuk atau hilang keseimbangan badan sewaktu berjalan
- perubahan kebiasaan buang air besar
- sakit kepala, kesukaran untuk tidur
- perubahan deria rasa
- rambut gugur atau perubahan warna

Beritahu doktor anda dengan secepat mungkin jika anda mendapati salah satu kesan yang berikut:

- gangguan penglihatan
- rasa tercucuk jarum atau kebas pada tangan atau kaki
- perubahan kuantiti air kencing, kerap kencing, rasa sakit semasa membuang air kecil, darah dalam air kencing
- kulit dan mata kekuningan (jaundis)
- berasa tidak sihat atau depresi
- kerap mendapat jangkitan seperti demam, menggigil teruk, sakit tekak atau ulser mulut
- mudah lebam atau pendarahan
- sakit dada atau jantung berdebar-debar
- bengkak pada tangan, kaki atau pergelangan kaki

Keadaan tersenarai di atas adalah kesan sampingan yang serius dan anda mungkin memerlukan perhatian perubatan.

Jika mana-mana satu yang berikut berlaku, berhenti mengambil Lanolone dan beritahu doktor anda dengan segera atau pergi ke hospital yang terdekat:

- asma, pernafasan berbunyi (*wheezing*) atau kesukaran bernafas
 - bengkak pada muka, bibir, lidah atau tekak yang mungkin menyebabkan sukar bernafas
 - gatal-gatal atau ruam kulit yang mendadak atau serius, atau masalah kulit yang lain
 - pengsan, sawan atau kejang
 - sakit atau rasa ketegangan pada dada
- Keadaan tersenarai di atas adalah kesan sampingan yang sangat serius dan jarang

berlaku. Perhatian perubatan segera atau dimasukkan ke hospital mungkin diperlukan.

Sesetengah orang mungkin mengalami kesan-kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di atas. Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers* → *Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan Lanolone

- Penyimpanan

Simpan di tempat sejuk dan kering di bawah suhu 30°C. Simpan dalam bungkusan asal untuk melindungi daripada cahaya.

Jangan simpan Lanolone atau ubat-ubat lain di dalam tandas, berdekatan dengan sinki atau ditinggalkan di tepi tingkap atau di dalam kereta.

Jauhi daripada kanak-kanak.

- Pelupusan

Jangan guna Lanolone yang melebihi tarikh luput yang dicetak pada kotak atau blister.

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Lanolone adalah tablet berwarna putih, bulat, dwi-cembung, bertanda “SPS”, “L02” pada satu permukaan dan tiada sebarang tanda pada permukaan yang lain.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan Aktif

Setiap tablet mengandungi *Allopurinol* 100mg dan *Benzbromarone* 20mg.

- Bahan tidak aktif

Microcrystalline cellulose, talcum, povidone, cornstarch, colloidal silicon dioxide, sodium starch glycolate, magnesium stearate, hypromellose 5 CPS & 15 CPS, methacrylic acid copolymer, polyethylene glycol, sodium

hydroxide, simethicone emulsion, titanium dioxide dan purified water.

- **Bungkusan**

Ia boleh didapati dalam blister 10 biji tablet dan dipek dalam kotak 10, 20 dan 50 blister.

- **Nombor MAL**

MAL20034447AZ

Pengilang

SRIPRASIT PHARMA CO., LTD.
216 Moo 6 Suanluang, Krathum Baen,
Samut Sakhon 74110, Thailand.

Pemegang Pendaftaran Produk

IMEKS Pharma Sdn. Bhd.
No. 5 & 9, Jalan Udang Harimau 2,
Medan Niaga Kepong,
51200 Kuala Lumpur, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

18/08/2025

Nombor siri

NPRA(R2/1)190726/210