

LIPOTHIN 200MG CAPSULE

Fenofibrate (200mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Lipothin
2. Bagaimana Lipothin berfungsi
3. Sebelum menggunakan Lipothin
4. Cara menggunakan Lipothin
5. Semasa menggunakan Lipothin
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Lipothin
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Lipothin

Lipothin digunakan sebagai rawatan sampingan bersama diet untuk merendahkan paras kolesterol darah

Bagaimana Lipothin berfungsi

Fenofibrate tergolong dalam kumpulan ubat yang dikenali sebagai 'fibrates'. Ia berfungsi merendahkan paras trigliserida dan kolesterol buruk dalam badan dan pada masa yang sama meningkatkan paras kolesterol baik.

Sebelum menggunakan Lipothin

- Bila tidak boleh menggunakan

- Anda mempunyai alahan terhadap bahan aktif fenofibrate atau bahan berkaitan atau bahan lain dalam formulasi ini
- Mempunyai penyakit ginjal
- Mempunyai penyakit hati
- Mempunyai penyakit pundi hempedu
- Pernah mengalami sensitiviti terhadap cahaya semasa rawatan dengan fibrates / ketoprofen

- Sebelum mula menggunakan

Maklumkan kepada doktor mengenai semua masalah kesihatan yang anda hadapi sekarang dan pada masa lalu.

Termasuk:

- Mempunyai alahan terhadap ubat-ubat lain, makanan, bahan pengawet atau pewarna
- Masalah hati
- Masalah ginjal
- Pernah mengalami bilangan sel darah merah dan putih menjadi rendah semasa mengambil ubat jenis yang hampir sama

- Pernah menghidapi penyakit batu karang atau radang pada pankreas semasa mengambil ubat jenis yang sama.
- Sakit otot semasa mengambil ubat kolesterol yang lain.

Pesakit tua dinasihatkan agar lebih berhati-hati semasa mengambil ubat ini kerana fungsi ginjal mungkin terjejas. Sentiasa jalani pemeriksaan untuk memastikan keadaan ginjal.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Maklumkan kepada doktor anda sekiranya anda sedang mengambil ubat lain, termasuk ubatan yang didapatkan tanpa preskripsi. Ubat-ubat ini mungkin dipengaruhi oleh Lipothin atau mempengaruhi fungsi ubat Lipothin. Anda mungkin perlu mengubah dos anda atau mengambil ubat lain. Doktor anda akan memberikan cadangan.

Doktor dan ahli farmasi anda mempunyai maklumat lebih lanjut mengenai ubat-ubat yang perlu diberi perhatian atau dielakkan semasa anda mengambil ubat-ubat berikut:

- Ubat yang menghalang pembekuan darah seperti *warfarin*
- Ubat untuk mengurangkan kolesterol jenis statin seperti *simvastatin*.
- Ciclosporin (ubat immunosupresan)
- Ubat resin yang menghalang asid hempedu daripada diserap seperti *cholestyramine*.

- Semasa mengandung dan menyusu bayi

Sila maklumkan kepada doktor anda sekiranya anda hamil semasa mengambil ubat ini. Doktor anda akan menyarankan ubat yang sesuai untuk digunakan semasa mengandung.

Cara menggunakan Lipothin

Ambil ubat ini seperti yang diarahkan oleh doktor anda. Penggunaan Lipothin perlulah disertakan dengan diet rendah lemak dan rawatan perubatan atau senaman.

- Berapa banyak harus digunakan

Satu kapsul sehari

- Bila perlu digunakan

Diambil semasa salah satu waktu makan utama. Telan seluruh kapsul dengan air. Ia adalah penting untuk mengambil kapsul dengan makanan, kerana ia tidak akan berfungsi dengan sebaiknya jika perut anda kosong.

- Berapa lama perlu digunakan

Ambil ubat ini selagi diarahkan oleh doktor anda. Ubat ini membantu untuk mengawal keadaan anda tetapi bukan untuk menyembuhkannya. Jangan berhenti mengambil ubat ini dengan tiba-tiba.

- Jika terlupa menggunakan

Jika anda lupa satu dos, ambil sejurus anda teringat, tetapi sekiranya hampir masa untuk dos seterusnya, anda bolehlah cuma mengambil dos seterusnya. Jangan sesekali mengambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlupa. Sekiranya anda tidak pasti, tanya doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda, atau sesiapa telah mengambil ubat ini secara berlebihan, anda hendaklah pergi ke Bahagian Rawatan Kecemasan Hospital terdekat atau maklumkan kepada doktor anda dengan segera. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang tanda ketidakselesaan atau keracunan. Bawa bersama bungkusan atau baki ubat biji yang selebihnya dengan anda.

Semasa menggunakan Lipothin

- Perkara yang perlu dilakukan

- Periksa paras kolesterol anda semasa diarahkan oleh doktor anda untuk memastikan ubat ini berkesan untuk anda.
- Doktor anda mungkin akan melakukan ujian darah untuk memastikan bilangan sel darah dan fungsi hati adalah normal.
- Maklumkan kepada doktor anda sekiranya anda mengalami sakit otot, lemah atau kekejangan otot, terutamanya berserta dengan ketidakselesaan badan atau demam.
- Maklumkan kepada doktor anda

- sekiranya anda mengalami sakit abdomen, loya dan muntah yang mungkin disebabkan oleh keradangan. Keradangan pada pankreas mungkin merupakan tanda pembentukan batu karang.
- Maklumkan kepada doktor, doktor gigi, ahli farmasi yang anda sedang mengambil Lipothin
 - Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda sebelum anda mengambil ubat baru yang anda sedang mengambil Lipothin
 - Maklumkan kepada doktor anda sekiranya anda hamil semasa mengambil Lipothin

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan minum alkohol berlebihan kerana ia mungkin menyebabkan masalah pada hati
- Jangan gunakan Lipothin untuk mengubati penyakit lain
- Jangan berhenti mengambil Lipothin sebelum berbincang dengan doktor anda.

• Perkara yang perlu diberi perhatian

Lipothin tidak mempengaruhi keupayaan untuk memandu, tetapi seperti ubat-ubat lain, sesetengah orang mungkin akan mengalami kepening semasa menggunakan ubat ini.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, ubat ini boleh mendatangkan kesan sampingan kepada pengguna walaupun tidak semua orang akan mengalaminya.

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi jika anda perasan sebarang kesan-kesan sampingan selepas mengambil ubat ini.

Lipothin boleh menyebabkan kesan-kesan sampingan yang berikut:

Biasa:

- Gangguan pada sistem gastrousus seperti sakit abdominal, loya, muntah, cirit-birit dan rasa kembung

Bukan kebiasaan:

- Sakit kepala
- Masalah kulit seperti ruam, kemerahan, gatal

- Lemah otot, kejang, sakit sendi, *rhabdomyolysis* (penguraian otot)
- Pembentukan batu karang

Jarang:

- Masalah hati (tahap enzim hati meningkat, hepatitis)
- Nafsu seks berkurang
- *Alopecia* (keguguran rambut), sensitif terhadap cahaya
- Bilangan sel darah merah dan putih menurun

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers -> Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan Lipothin

- Penyimpanan

Simpan ubat dalam bungkusan asal. Simpan di tempat sejuk (bawah 30°C) dan kering. Jauhkan dari kepanasan, cahaya dan kelembapan yang berlebihan. Jangan tinggalkan ubat anda di dalam kereta. Jauhi daripada kanak-kanak.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak sepatutnya dibuang seperti biasa. Tanya doktor atau ahli farmasi untuk mengetahui cara pelupusan.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Serbuk berwarna putih diisi dalam kapsul berwarna jingga

• Bahan-bahan kandungan

- Bahan Aktif
Fenofibrate

- Bahan tidak aktif
Colloidal silicon dioxide, croscarmellose sodium, povidone K-90, lactose, magnesium stearate, sodium lauryl sulfate

• Nombor MAL

MAL20040802AZ

Pengilang

T.O. CHEMICALS (1979) Ltd.
280 Soi Sabaijai, Suthisarnwininjai Road, Samsennok, Huay-Kwang, Bangkok 10310, Thailand.

Pemegang Pendaftaran Produk

IMEKS Pharma Sdn Bhd.
No 5 & 9, Jalan Udang Harimau 2, Medan Niaga Kepong, 51200 Kuala Lumpur.

Tarikh kemaskini RiMUP

04/01/2022

Serial Number:

NPRA(R2/1)210709/703