

MOTIDOM TABLET/ORAL SUSPENSION®

Domperidone (10mg, 1mg/ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan **Motidom**
2. Bagaimana **Motidom** berfungsi
3. Sebelum menggunakan **Motidom**
4. Cara menggunakan **Motidom**
5. Semasa menggunakan **Motidom**
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan
8. **Motidom**
9. Maklumat lanjut
10. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
11. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan **Motidom**

Motidom digunakan untuk melegakan gejala-gejala loya dan muntah.

Bagaimana **Motidom** berfungsi

Motidom berfungsi dengan menghalang bahan kimia di dalam otak yang menyebabkan rasa loya dan muntah. Ia juga meningkatkan pergerakan atau pengecutan perut dan usus, untuk memudahkan pergerakan makanan di dalam sistem penghadaman anda.

Sebelum menggunakan **Motidom**

- Bila tidak boleh menggunakan

- Mengalami alahan terhadap bahan aktif domperidone atau kepada bahan-bahan lain dalam produk ini.
- Mempunyai tumor kelenjar pituitari di bahagian otak anda yang menyebabkan penghasilan hormon prolaktin berlebihan.
- Mengalami penyakit hati tahap sederhana hingga teruk.
- Mengalami sakit jantung
- Saluran gastrousus berdarah, tersumbat dan berlubang.
- Jika anda ada mengambil sesetengah ubat- ubatan (Rujuk bahagian “Jika mengambil ubat-ubatan lain”)

Penggunaan **Motidom** adalah tidak digalakkan untuk pencegahan rutin muntah selepas pembedahan atau untuk pengambilan jangka lama lebih daripada 12 minggu.

- Sebelum mula menggunakan

- Motidom** Maklumkan kepada doktor anda sekiranya anda:
- Mengalami masalah buah pinggang
- Ketidakseimbangan elektrolit
- Mengalami alahan terhadap ubat-ubatan lain, makanan, bahan pengawet atau bahan pewarna.

Sekiranya anda tidak pasti sama ada anda perlu mula mengambil produk ini, dapatkan nasihat daripada doktor anda.

- Jika mengambil ubat-ubatan lain

- Sesetengah ubat dan **Motidom** mungkin bertindak balas antara satu sama lain. Jangan menggunakan **Motidom** sekiranya anda sedang mengambil ubat-ubatan tertentu untuk:
- Degupan jantung tidak teratur (contoh: amiodarone)
 - Gangguan psikologi (contoh: haloperidol) atau masalah depresi (citalopram, escitalopram)
 - Antibiotik (contoh: erythromycin, levofloxacin, moxifloxacin, clarithromycin, anti-kulat, anti-malaria)
 - Masalah pencernaan (contoh: cisapride)
 - Alahan atau selsema (contoh: antihistamine)
 - Kanser

Maklumkan kepada doktor anda sekiranya anda mengambil:

- Ubat untuk penyakit jantung (diltiazem, verapamil)
- Antibiotik (Azithromycin, roxithromycin)

- Semasa mengandung dan menyusui bayi

Maklumkan kepada doktor sekiranya anda mengandung, mengesyaki anda telah mengandung atau bercadang untuk mengandung. Pengambilan **Motidom** tidak disyorkan semasa mengandung.

Maklumkan kepada doktor sekiranya anda sedang menyusui atau bercadang untuk menyusui. Penggunaan **Motidom** tidak disyorkan untuk ibu yang sedang menyusui. Hal ini kerana sebahagian kecil ubat tersebut boleh dirembes ke dalam susu ibu.

Penggunaan **Motidom** hanya boleh diberikan terhadap bayi di bawah pengawasan perubatan yang teliti dan apabila pakar perubatan berpendapat bahawa manfaat ubat ini melebihi risiko terlibat.

Cara menggunakan **Motidom**

Anda mesti sentiasa mengambil jumlah **Motidom** yang paling rendah dan sesuai untuk anda dan tidak perlu mengambilnya untuk jangka masa yang lama daripada yang perlu.

Walaupun dos **Motidom** tertera di bawah, doktor anda boleh menyelaraskan dos mengikut keperluan anda.

Motidom paling berkesan jika diambil 15-30 minit sebelum makan.

Dewasa, remaja (berumur 12 tahun ke atas) dan kanak-kanak yang mempunyai berat 35kg ke atas:

Ambil 1 biji tablet atau 10ml, 3 hingga 4 kali sehari. Jangan ambil melebihi 40mg/sehari.

Suspensi oral: ambil : Ambil 10 mL suspensi, 3 atau 4 kali sehari. Jangan ambil lebih daripada 40mL sehari (40 mg/hari).

Dewasa dan remaja yang mempunyai berat kurang dari 35kg:

Suspensi oral: Beri 0.25 mililiter untuk setiap kilogram berat badan 3 hingga 4 kali sehari. Dos maksima sehari ialah 1mg/kg tetapi tidak melebihi 35mg sehari.

Bayi dan kanak-kanak berumur kurang dari 12 tahun and berat kurang dari 35kg:

Keberkesanan **Motidom** belum diketahui pada bayi dan kanak-kanak di bawah umur 12 tahun dengan berat badan <35 kg.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan pengambilan ubat ini selagi anda diarahkan oleh doktor.

Kebiasaannya, tempoh masa rawatan maksima tidak melebihi 1 minggu.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos anda dengan segera apabila anda teringat dan kemudian teruskan mengambil **Motidom** mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang anda terlupa. Ia boleh mengakibatkan kesan sampingan yang tidak diingini.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda, atau sesiapa telah mengambil **Motidom** secara berlebihan, anda hendaklah segera pergi ke Bahagian Rawatan Kecemasan Hospital terdekat atau maklumkan kepada doktor anda. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang tanda ketidakselesaan atau keracunan.

Bawa bersama bungkusan atau baki ubat bersama anda.

Antara simptom terlebih dos ubat

Motidom termasuk mengantuk, agitasi, gangguan kesedaran, sawan, disorientasi dan pergerakan tidak terkawal.

Sila rujuk doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut mengenai penggunaan produk ini.

Semasa menggunakan Motidom

- Perkara yang perlu dilakukan

- Patuhi arahan doktor atau ahli farmasi anda ketika mengambil ubat **Motidom**. Jika anda tidak pasti, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.
- Jika anda merancang untuk mengambil ubat baru, ingatkan doktor dan ahli farmasi anda yang anda sedang mengambil **Motidom**.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan beri ubat ini kepada orang lain walaupun mereka mempunyai keadaan yang sama dengan anda.
- Jangan guna **Motidom** untuk merawat masalah kesihatan lain kecuali diberitahu oleh doktor.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

- Pening dan mengantuk merupakan kesan yang didapati selepas penggunaan domperidone. Anda dinasihatkan untuk tidak memandu atau mengendalikan mesin atau melakukan sebarang aktiviti yang berkaitan dengan kecerdasan mental dan koordinasi sehingga anda mengetahui kesan **Motidom** kepada anda.
- **Motidom** tablet mempunyai kandungan laktosa dan mungkin tidak sesuai untuk orang yang mempunyai masalah intoleransi, penghasilan dan penyerapan laktosa.

Kesan-kesan sampingan

Ubat-ubatan mempunyai kesan sampingan. **Motidom** mungkin akan menyebabkan kesan yang tidak diinginkan, tetapi bukan semua orang akan mengalaminya.

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda mengalami kesan-kesan sampingan seperti berikut:

- Gangguan psikiatri
- Dorongan seksual menurun, keresahan, depresi, agitasi, kegelisahan
- Gangguan sistem saraf

- Mengantuk, sakit kepala, sukar untuk duduk diam, pergerakan tidak terkawal, sawan, pening

• Gangguan gastrousus

- Mulut kering, cirit-birit

• Gangguan kulit

- Ruam, kegatalan kulit

• Gangguan sistem reproduksi dan payudara

- Penghasilan susu tidak normal, sakit dada, tumbesaran buah dada pada lelaki, tidak datang haid, kitaran haid tidak tetap

• Gangguan umum

- Kekurangan tenaga

• Gangguan sistem imunisasi

- Reaksi alahan termasuk kebengkakan bawah lapisan kulit

• Gangguan mata

- Pergerakan bebola mata pada posisi yang tetap, kebiasaannya ke atas.

• Gangguan jantung

- Rentak degupan jantung tidak sekata, ritma jantung tidak normal, mati mengejut disebabkan kegagalan fungsi jantung.

• Gangguan buah pinggang dan urinary

- Pengekalan kencing

• Ujian makmal

- Ujian fungsi hati tidak normal, ujian darah untuk prolaktin meningkat

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi jika kesan sampingan menjadi serius atau terdapat kesan sampingan lain yang tidak dinyatakan di sini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan Motidom

- Penyimpanan

Simpan di tempat dingin dan kering di bawah suhu 30°C. Simpan di dalam bungkusan asal untuk melindungi daripada cahaya, haba dan kelembapan.

Jangan simpan **Motidom** atau ubat-ubatan lain di dalam bilik air, berdekatan

sinki atau tinggalkannya berhampiran tingkap atau dalam kereta.

Jauhi daripada kanak-kanak.

- Pelupusan

Jangan guna **Motidom** yang telah melebihi tarikh luput yang dicetak pada kotak atau strip.

Jika anda diarahkan oleh doktor untuk berhenti mengambil **Motidom**, atau ia telah melebihi tarikh luput, tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan baki ubat tersebut.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Motidom Tablet berwarna putih, berbentuk dwi-cembung dan bulat dengan garis pembelahan pada satu permukaan.

Motidom Oral Suspension 1mg/ml adalah suspensi putih.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan Aktif

Motidom Tablet

Setiap tablet mengandungi 10mg domperidone

Motidom Oral Suspension 1mg/ml

Setiap 5ml mengandungi 5mg domperidone.

- Bahan tidak aktif

Motidom Tablet

Glycerine, povidone, sodium starch glycolate, lactose monohydrate, talc, magnesium stearate dan purified water.

Motidom Oral Suspension 1mg/ml

Saccharin sodium, sorbitol, myacide SP, xanthan gum, microcrystalline cellulose, carboxymethyl cellulose sodium, concentrated raspberry juice, propylene glycol, methyl paraben, propyl paraben, polysorbate, alkohol dan purified water.

- Bungkusan

Motidom Tablet

Dibungkus di dalam kotak yang mengandungi 50 strip x 10 biji tablet.

Motidom Oral Suspension 1mg/ml

Ia dibungkus ke dalam botol 30ml.

- Nombor MAI

Motidom Tablet

MAL20021173AZ

Motidom Oral Suspension 1mg/ml

MAL06011683AZ

Pengilang**Motidom Tablet**

T.O Chemicals (1979) Ltd.
280 Soi Sabaijai, Suthisarnwinijai Road,
Samsennok, Huay Kwang,
Bangkok 10320, Thailand.

Motidom Oral Suspension 1mg/ml

T.O. Pharma Co. Ltd
101, Soi Ladprao 124,
Ladprao Road, Philapphla,
Wangthonglang, Bangkok 10310,
Thailand.

Pemegang Pendaftaran Produk

IMEKS Pharma Sdn. Bhd.
No. 5 & 9, Jalan Udang Harimau 2,
Medan Niaga Kepong,
51200 Kuala Lumpur, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

01/07/2022

Nombor siri

NPRA (R4/1) 120820/00123