

TIMAZOL TABLET 5MG

Methimazole (5mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan TIMAZOL
2. Bagaimana TIMAZOL berfungsi
3. Sebelum menggunakan TIMAZOL
4. Cara menggunakan TIMAZOL
5. Semasa menggunakan TIMAZOL
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan TIMAZOL
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan TIMAZOL

TIMAZOL digunakan untuk merawat hipertiroidisme atau kelenjar tiroid yang terlalu aktif (keadaan dimana kelenjar tiroid menghasilkan terlalu banyak hormon tiroid). Ia juga digunakan sebelum pembedahan tiroid atau terapi radioaktif iodine.

Tanya doktor anda jika anda mempunyai sebarang persoalan kenapa ubat ini diberikan kepada anda. Doktor anda mungkin memberikan ubat ini untuk tujuan lain.

Bagaimana TIMAZOL berfungsi

TIMAZOL mengandungi bahan aktif Methimazole yang tergolong dalam kumpulan ubat agen antitiroid. Ubat ini berfungsi dengan mengurangkan penghasilan hormon tiroid oleh kelenjar tiroid.

Sebelum menggunakan TIMAZOL

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil TIMAZOL jika:

- Anda mempunyai alahan terhadap methimazole atau bahan lain dalam formulasi ini atau ubat lain yang serupa.
- Anda sedang menyusu bayi atau bercadang untuk menyusu bayi. TIMAZOL boleh meresap ke dalam susu ibu.
- Anda pernah mengalami keradangan pankreas (pankreatitis akut) selepas pengambilan carbimazole atau methimazole (thiamazole) pada masa lalu.

Jika anda tidak pasti sama ada anda perlu mengambil ubat ini, sila rujuk kepada doktor anda.

- Sebelum mula menggunakan TIMAZOL

Beritahu doktor anda jika:

- Anda mempunyai alahan terhadap sebarang ubat, makanan, bahan pengawet atau pewarna.

- Anda mempunyai bilangan sel darah putih yang rendah.
- Anda mempunyai sakit sendi.
- Anda mempunyai masalah hati.
- Anda sedang mengambil ubat yang diketahui boleh menyebabkan agranulocytosis (pengurangan bilangan sel darah putih).
- Anda alah terhadap carbimazole atau propylthiouracil (ubat tiroid yang lain).
- TIMAZOL boleh memudaratkan bayi yang belum lahir. Jika anda berpotensi hamil, gunakan kaedah kontraseptif yang berkesan apabila anda memulakan rawatan dan semasa rawatan.

• Jika anda hamil, fikir anda mungkin hamil atau merancang untuk hamil, beritahu doktor anda dengan segera. Rawatan anda dengan TIMAZOL mungkin perlu diteruskan semasa kehamilan jika potensi manfaat melebihi potensi risiko kepada anda dan bayi anda yang belum lahir. Namun begitu, untuk mengurangkan kemungkinan bayi anda mengalami kesan ubat ini, doktor anda perlu memberikan dos terendah yang berkesan dan menghentikan rawatan anda 3 hingga 4 minggu sebelum bersalin.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil ubat lain, termasuk ubat-ubat yang didapatkan tanpa preskripsi.

Ubat-ubat ini mungkin dipengaruhi oleh TIMAZOL atau mungkin mempengaruhi keberkesanannya. Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil mana-mana ubat berikut:

- Antikoagulan seperti warfarin, digunakan untuk mencegah pembekuan darah.
- Beta-blockers, digunakan untuk merawat masalah jantung atau tekanan darah tinggi.
- Digitalis glikosida, digunakan untuk merawat masalah jantung.
- Theophylline, digunakan untuk merawat asma atau masalah pernafasan.

Cara menggunakan TIMAZOL

Ambil ubat anda seperti yang diarahkan oleh doktor anda. Jika anda tidak pasti, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa banyak harus digunakan

Dos harian TIMAZOL biasanya dibahagikan kepada 3 dos dan diambil secara oral setiap 8 jam.

Dewasa

Dos permulaan harian:

Kes ringan – 15mg sehari

Kes sederhana – 30mg hingga 40mg sehari

Kes serius – 60mg sehari

Apabila simptom terkawal, dos patut dikurangkan. Dos penyelenggaraan ialah 1-3 tablet (5 hingga 15mg) sehari.

Kanak-kanak

Dos permulaan harian: 0.4mg/kg berat badan

Dos penyelenggaraan harian: kira-kira separuh daripada dos permulaan.

- Bila perlu digunakan

TIMAZOL boleh diambil dengan atau tanpa makanan. Telan ubat ini dengan segelas air. Ambil ubat anda pada masa yang tetap setiap hari akan memberi kesan yang terbaik. Ini juga membantu anda mengingat masa pengambilan ubat.

- Berapa lama perlu digunakan

Untuk mengekalkan kawalan ke atas kelenjar tiroid, anda mungkin perlu terus mengambil TIMAZOL untuk beberapa bulan. Doktor anda akan menentukan bila rawatan boleh dihentikan. Doktor anda mungkin meminta anda menjalani ujian darah sekali sekala untuk menentukan respons anda terhadap rawatan.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat, dan kembali mengambil ubat anda seperti biasa. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal. Tanya doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti apa yang perlu dilakukan.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera. Bawa bersama bungkusan atau baki ubat yang selebihnya dengan anda.

Symptom-symptom terlebih dos termasuk rasa loya, muntah, ketidakselesaan perut, sakit

kepala, demam, sakit sendi, rasa gatal dan bengkak. Simptom-simptom seperti hepatitis, kulit mengelupas, sakit saraf, kemurungan dan terlalu teruja mungkin juga berlaku.

Tanda-tanda pengurangan sel darah putih, sel darah merah dan platelet mungkin hanya boleh diperhatikan selepas beberapa jam atau hari, dan ini termasuk demam, menggigil, pucat, senang lebam dan gusi berdarah.

Semasa menggunakan TIMAZOL

- Perkara yang perlu dilakukan

- Jika anda akan mula mengambil sebarang ubat baru, ingatkan doktor atau ahli farmasi anda bahawa anda sedang mengambil TIMAZOL.
- Maklumkan kepada doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil TIMAZOL.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.
- Jika anda bakal menjalani pembedahan, beritahu pakar bedah atau pakar bius bahawa anda sedang mengambil TIMAZOL. Ia mungkin mengganggu kesan ubat lain yang akan digunakan semasa pembedahan.
- Pastikan anda menjalani rawatan susulan untuk memeriksa perkembangan anda.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berikan ubat ini kepada orang lain, walaupun mereka mengalami keadaan yang sama seperti anda.
- Jangan berhenti mengambil ubat anda atau mengubah dos tanpa merujuk kepada doktor anda.
- Jangan ambil TIMAZOL untuk merawat penyakit lain kecuali atas arahan doktor.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhati-hati semasa memandu atau mengendalikan mesin sehingga anda tahu bagaimana TIMAZOL mempengaruhi anda.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mengalami sebarang tanda atau simptom jangkitan, khususnya sakit tekak, demam, menggigil dan rasa tidak sedap badan.

Rujuk kepada doktor anda dengan segera jika anda perasan sebarang pendarahan atau lebam yang tidak normal, najis berwarna hitam dan melekit, air kencing atau najis berdarah. Berhati-hati semasa menggunakan berus gigi, flos atau pencungkil gigi.

Perhatikan juga sekiranya terdapat tanda-tanda masalah hati seperti hilang selera

makan, rasa gatal, sakit abdomen, rasa letih atau kekuningan pada mata atau kulit.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mengalami:

- demam atau sakit abdomen, yang mungkin merupakan tanda keradangan pankreas (pankreatitis akut).
 - rasa lesu, berat badan menurun, sakit sendi dan otot, yang mungkin merupakan tanda keradangan saluran darah (vaskulitis).
- Pengambilan TIMAZOL mungkin perlu diberhentikan.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, TIMAZOL boleh menyebabkan kesan sampingan walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Kesan-kesan sampingan berikut mungkin akan berlaku sewaktu pengambilan ubat ini. Beritahu doktor anda jika mana-mana simptom berikut berlarutan atau bertambah serius:

- loya, muntah
- sakit perut
- ruam atau gatal-gatal pada kulit
- perubahan warna kulit
- sakit kepala, pening
- rasa mengantuk
- keguguran rambut
- pedih ulu hati
- hilang deria rasa
- hilang selera makan

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan yang serius, termasuk:

- sakit pada otot atau sendi
- rasa kebas atau menggelenyar
- sesak nafas
- batuk berdarah
- bengkak pada nodus limfa
- bengkak pada kelenjar air liur
- tanda-tanda masalah hati seperti loya/muntah berterusan, kekuningan pada kulit/mata, air kencing berwarna gelap, sakit teruk pada bahagian abdomen
- tanda-tanda masalah buah pinggang seperti perubahan dalam jumlah air kencing, air kencing berdarah
- keradangan pankreas (pankreatitis akut)

Dengan jarangnyanya, TIMAZOL boleh menyebabkan masalah darah yang sangat serius (seperti bilangan sel darah merah, sel darah putih dan platelet yang rendah), terutamanya semasa beberapa bulan pertama rawatan. Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mengalami mana-mana simptom

berikut: tanda-tanda jangkitan (seperti demam, sakit tekak berterusan), mudah lebam atau berdarah, keletihan yang luar biasa.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengalami kesan sampingan lain yang menyebabkan anda berasa kurang sihat. Sesetengah orang mungkin mengalami kesan sampingan yang tidak tersenarai di atas.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web nppra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan TIMAZOL

- Penyimpanan

Jangan simpan pada suhu melebihi 30°C. Simpan ubat dalam bungkus asal, jauh daripada haba, cahaya dan kelembapan yang berlebihan. Jangan tinggalkan ubat anda di dalam kereta. Jauhi ubat daripada kanak-kanak.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

TIMAZOL adalah tablet berwarna putih dan berbentuk bulat dwicembung dengan garis pembelahan pada satu belah permukaan dan bertanda 'S03' pada permukaan yang lain.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan Aktif
Methimazole 5mg

- Bahan tidak aktif

Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, cornstarch, sodium starch glycolate, croscarmellose sodium, povidone, talcum, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate.

- Bungkus

Dibungkus dalam pek blister (10 biji tablet) dengan kuantiti 100 dan 500 tablet sekotak.

- Nombor MAL

MAL07050041AZ

Pengilang

Sriprasit Pharma Co., Ltd.
216 Moo 6 Suanluang, Krathum Baen,
Samut Sakhon 74110, Thailand.

Pemegang Pendaftaran Produk

IMEKS Pharma Sdn. Bhd.
No. 5 & 9, Jalan Udang Harimau 2,
Medan Niaga Kepong,
51200 Kuala Lumpur, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

04/06/2025

Nombor Siri

NPRA(R2/2)250520/1481