

LIOBAC TABLET

Baclofen (10 mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan LIOBAC
2. Bagaimana LIOBAC berfungsi
3. Sebelum menggunakan LIOBAC
4. Cara menggunakan LIOBAC
5. Semasa menggunakan LIOBAC
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan LIOBAC
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan LIOBAC

LIOBAC digunakan untuk mengurangkan ketegangan otot yang menyebabkan kekejangan. Ia mengurangkan kekejangan dan kesakitan yang berlaku dalam pelbagai penyakit seperti *multiple sclerosis* dan masalah atau kecederaan pada saraf tunjang. Ia membantu memudahkan pergerakan anda dan membolehkan anda mengendalikan aktiviti harian anda.

Bagaimana LIOBAC berfungsi

LIOBAC mengandungi bahan aktif *Baclofen* yang tergolong dalam kumpulan ubat yang dikenali sebagai pengendur otot (*muscle relaxants*). Ia berfungsi untuk mengembalikan keseimbangan dan mengurangkan hiperaktiviti otot. Dengan itu, ia membolehkan pergerakan otot yang lebih normal.

Sebelum menggunakan LIOBAC

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil ubat ini jika:

- Anda mempunyai alahan terhadap bahan aktif atau bahan lain dalam formulasi ini atau ubat lain yang sama.
- Anda mengalami penyakit ulser peptik.

Sekiranya anda tidak pasti sama ada anda perlu mengambil ubat ini, rujuk kepada doktor anda.

- Sebelum mula menggunakan LIOBAC

Maklumkan kepada doktor anda sekiranya anda mempunyai alahan terhadap sebarang ubat, makanan, bahan pengawet atau pewarna.

Beritahu doktor anda jika anda sedang atau pernah mengalami penyakit berikut:

- sebarang masalah psikiatri

- epilepsi dan spastik
- ulser peptik
- peningkatan ketegangan otot yang abnormal (*sphincter hypertonia*)
- masalah hati
- penyakit kencing manis

Jika anda hamil, merancang untuk hamil atau sedang menyusui, rujuk kepada doktor anda sebelum mula mengambil ubat ini.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil ubat lain, termasuk sebarang ubat yang anda peroleh tanpa preskripsi, ubat herba atau produk semulajadi.

Keberkesanan sesetengah ubat mungkin akan dipengaruhi oleh LIOBAC. Anda mungkin perlu mengubah dos anda atau mengambil ubat lain. Doktor dan ahli farmasi anda mempunyai maklumat lebih lanjut mengenai ubat-ubat yang boleh diambil atau perlu dielakkan semasa mengambil LIOBAC. Maklumkan kepada doktor anda sekiranya anda mengambil:

- opiat sintetik (cth: *fentanyl*) untuk mengurangkan kesakitan.
- ubat untuk menurunkan tekanan darah.
- ubat untuk merawat kemurungan (*citalopram*).
- ubat untuk merawat penyakit Parkinson (*levodopa* dan *carbidopa*).

Jangan minum alkohol semasa mengambil LIOBAC. Alkohol boleh meningkatkan kesan sedatif dan menyebabkan anda rasa mengantuk.

Dapatkan nasihat daripada doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil sebarang ubat-ubatan.

Cara menggunakan LIOBAC

Ambil ubat anda seperti yang diarahkan oleh doktor anda.

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa:

Dos permulaan adalah 5 mg ($\frac{1}{2}$ tablet), diambil 3 kali sehari. Doktor anda akan menambah dos anda secara beransur-ansur mengikut respons anda terhadap ubat ini sehingga kesan ubat diingini dicapai.

Kanak-kanak:

Dos untuk kanak-kanak akan ditentukan oleh doktor anda selepas mengambil kira berat badan kanak-kanak tersebut.

- Bila dan bagaimana menggunakannya

Telan tablet dengan segelas air bersama makanan, biasanya dibahagi kepada 3 dos sehari, kecuali diarahkan oleh doktor anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Ambil ubat ini selagi diarahkan oleh doktor anda. Ubat ini membantu untuk mengawal keadaan anda tetapi bukan untuk menyembuhkannya. Jangan berhenti mengambil ubat ini dengan mendadak.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Simptom-simptom terlebih dos termasuk: rasa mengantuk, hilang kesedaran, kesukaran bernafas dan koma. Simptom-simptom lain yang mungkin berlaku termasuk kekeliruan, cepat marah, halusinasi, sawan, masalah penglihatan, kelemahan otot, pergerakan otot tidak terkawal, tekanan darah rendah, suhu badan rendah, kadar degupan jantung rendah, loya, muntah, cirit-birit dan penghasilan air liur berlebihan.

Semasa menggunakan LIOBAC

- Perkara yang perlu dilakukan

- Sekiranya anda akan mula mengambil ubat baru, ingatkan doktor anda yang anda sedang mengambil ubat ini.
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil LIOBAC.
- Sekiranya anda akan menjalani pembedahan, maklumkan kepada pakar bedah atau pakar bius anda bahawa anda

sedang mengambil ubat ini. Ia mungkin mengganggu kesan ubat lain yang akan digunakan semasa pembedahan.

- Sekiranya anda akan menjalani ujian darah, maklumkan kepada doktor anda bahawa anda sedang mengambil ubat ini. Ia mungkin mengganggu keputusan sesetengah ujian.
- Pastikan anda menjalani rawatan susulan untuk memeriksa perkembangan anda. Doktor anda mungkin akan memeriksa fungsi hati dan tahap glukosa darah anda dari semasa ke semasa untuk memastikan keberkesanan ubat ini dan untuk mengelakkan kesan sampingan.
- Beritahu doktor anda dengan segera sekiranya anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berikan ubat ini kepada orang lain walaupun mereka mempunyai simptom-simptom yang sama dengan anda.
- Jangan berhenti mengambil ubat ini atau mengubah dos anda sebelum berbincang dengan doktor anda. Antara kesan-kesan yang mungkin berlaku sekiranya anda berhenti mengambil LIOBAC secara mendadak adalah rasa gelisah, keliru, halusinasi, keadaan psikotik/manik, paranoia, sawan, degupan jantung cepat, suhu badan meningkat, spastik dan hilang koordinasi.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan mesin

Berhati-hati apabila memandu atau mengendalikan mesin semasa mengambil ubat ini. Ubat ini mungkin menyebabkan anda rasa mengantuk, pening dan hilang koordinasi. Sekiranya anda mengalami simptom-simptom ini, jangan memandu, mengendalikan mesin atau melakukan aktiviti-aktiviti yang berbahaya.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, LIOBAC boleh menyebabkan kesan sampingan walaupun bukan semua orang akan mengalaminya. Kesan-kesan sampingan berikut mungkin berlaku terutamanya pada permulaan rawatan atau semasa dos tinggi digunakan. Kesan-kesan sampingan ini biasanya berlaku untuk jangka masa pendek dan boleh diatasi dengan mengurangkan dos.

Pesakit yang pernah mengalami penyakit psikiatri, strok dan golongan berumur

mungkin akan mengalami kesan sampingan yang lebih serius.

Maklumkan kepada doktor anda sekiranya anda mengalami kesan-kesan sampingan berikut:

- rasa mengantuk
- loya
- gangguan gastrousus ringan
- rasa menjelolak
- muntah
- sembelit
- cirit-birit

Jarang

- kesukaran bernafas
- pitam
- kurang tenaga dan lesu
- kekeliruan
- murung
- pening
- sakit kepala
- hilang koordinasi
- insomnia
- rasa gembira
- kelemahan otot
- bergetar
- mulut kering
- kulit rasa menusuk-nusuk, panas
- masalah pertuturan
- gangguan penglihatan
- perubahan deria rasa
- sakit perut
- tekanan darah rendah
- masalah jantung
- kesukaran menahan air kencing
- kesukaran membuang air kencing
- impoten
- masalah fungsi hati
- berpeluh secara berlebihan
- ruam
- masalah spastik bertambah

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda sekiranya terdapat sebarang kesan lain yang menyebabkan anda rasa tidak sihat. Kesan-kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan mungkin akan berlaku pada sesetengah orang.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan LIOBAC

- Penyimpanan

Jangan simpan melebihi suhu 30°C. Lindungi daripada kelembapan dan cahaya. Jauhi semua ubatan daripada kanak-kanak.

- Pelupusan

Jangan mengambil LIOBAC yang telah melepasi tarikh luput yang dicetak pada bungkusan.

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Jika doktor anda mengarahkan anda berhenti mengambil LIOBAC, atau ubat ini telah melepasi tarikh luputnya, sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

LIOBAC adalah tablet berwarna putih, bulat, dengan tanda “SPS”, “L05” dan garis pembelahan pada satu permukaan dan tiada sebarang tanda pada permukaan yang lain.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan Aktif

Baclofen

- Bahan tidak aktif

Microcrystalline cellulose, cornstarch, hydroxypropyl cellulose, isopropyl alcohol, sodium starch glycolate, colloidal silicon dioxide dan magnesium stearate.

- Bungkusan

LIOBAC boleh didapati dalam pek blister 10 biji tablet dan dibungkus dalam 5, 10, 20 dan 50 blister sekotak.

- Nombor MAL

MAL07021433AZ

Pengilang

Sriprasit Pharma Co., Ltd.
216 Moo 6, Suanluang, Krathum Baen,
Samut Sakhon 74110, Thailand.

Pemegang Pendaftaran Produk

IMEKS Pharma Sdn. Bhd.
No. 5 & 9, Jalan Udang Harimau 2,
Medan Niaga Kepong,
51200 Kuala Lumpur, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

10/12/2024

Nombor Siri

NPRA(R2/1)200914/521