

MEGEX-I SUSPENSION® 800MG/20ML

Megestrol Acetate (800mg/20ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Megex-I Suspension
2. Bagaimana Megex-I Suspension berfungsi
3. Sebelum menggunakan Megex-I Suspension
4. Cara menggunakan Megex-I Suspension
5. Semasa menggunakan Megex-I Suspension
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Megex-I Suspension
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Megex-I Suspension

Megex-I Suspension membantu meningkatkan selera makan dan/atau mengatasi masalah kehilangan berat badan yang sering berlaku pada pesakit kanser atau AIDS.

Bagaimana Megex-I Suspension berfungsi

Megex-I Suspension mengandungi bahan aktif *megestrol acetate* yang tergolong dalam kumpulan ubat *progestogens*. *Megestrol acetate* mempunyai ciri unik yang boleh meningkatkan selera makan pesakit. Namun begitu, mekanisme sebenar bagaimana ia berfungsi masih tidak diketahui.

Sebelum menggunakan Megex-I Suspension

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil Megex-I Suspension:

- Jika anda alah (hipersensitif) kepada *megestrol acetate* atau mana-mana bahan kandungan yang disenaraikan pada akhir risalah ini.
- Jika anda sedang mengandung atau mungkin mengandung.
- Jika anda sedang menyusukan anak.

Dapatkan nasihat daripada doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil sebarang ubat-ubatan.

Sebelum mula menggunakan Megex-I Suspension

- Beritahu doktor anda jika anda sedang mengandung atau bercadang untuk mengandung. Ubat ini tidak boleh digunakan

semasa mengandung kerana ia boleh membahayakan bayi dalam kandungan anda. Wanita yang berpotensi untuk hamil harus menggunakan kaedah pencegahan kehamilan yang berkesan semasa mengambil ubat ini.

- Anda tidak disyorkan untuk menyusukan anak semasa rawatan dengan Megex-I Suspension kerana bahan aktif *megestrol* meresap masuk ke dalam susu ibu dan mungkin memudaratkan bayi anda. Penyusuan perlu dihentikan jika rawatan dengan Megex-I Suspension diperlukan.

Beritahu doktor anda jika anda:

- mempunyai masalah hati yang teruk.
- pernah mengalami penggumpalan darah (*thrombophlebitis*).
- mempunyai penyakit kencing manis (diabetes). Megex-I Suspension mungkin akan meningkatkan paras gula dalam darah anda. Beritahu doktor anda jika anda mendapati paras gula darah anda lebih tinggi daripada biasa.

- Jika mengambil ubat-ubatan lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil ubat lain, termasuk sebarang ubat yang anda peroleh tanpa preskripsi, ubat herba atau produk semulajadi.

Sesetengah ubat mungkin menyebabkan komplikasi apabila diambil bersama-sama dengan Megex-I Suspension, sebagai contoh:

- *Hepatic enzyme-inducing drugs* (cth. *Carbamazepine*, *Phenobarbital*, *Phenytoin*, *Rifabutin*, *Rifampin*)
- *Indinavir* (digunakan untuk merawat HIV)

Dapatkan nasihat daripada doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil sebarang ubat-ubatan.

Cara menggunakan Megex-I Suspension

Ambil Megex-I Suspension dengan tepat seperti yang dinasihatkan oleh doktor anda. Jangan melebihi dos yang disyorkan. Jika anda berusia 65 tahun ke atas, doktor anda mungkin akan mengesyorkan dos permulaan yang lebih rendah dan memantau fungsi buah pinggang anda. Beliau akan menentukan dos yang sesuai dengan keadaan anda. Tanya doktor anda sekiranya anda tidak pasti.

- Berapa banyak harus digunakan

Anorexia atau kekurangan berat badan:

400 - 800 mg diambil sebagai dos tunggal setiap hari. Goncang dengan baik sebelum menggunakan. Boleh diambil secara terus dari pek. Cawan penyukat dengan penanda 10ml disediakan untuk memudahkan anda menyukat kuantiti yang diperlukan.

- Bila dan bagaimana menggunakannya

- Untuk membantu anda mengingat, ambil Megex-I Suspension pada waktu yang tetap setiap hari.

- Berapa lama perlu digunakan

Biasanya rawatan dengan Megex-I Suspension akan mengambil masa dua bulan berterusan untuk menentukan sama ada ubat ini berkesan. Teruskan mengambil Megex-I Suspension kecuali diarahkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Megex-I Suspension

- Perkara yang perlu dilakukan

- Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Megex-I Suspension.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

- Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan berkongsi Megex-I Suspension dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera

Megex-I Suspension biasanya tidak akan mempengaruhi keupayaan anda memandu.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Megex-I Suspension boleh menyebabkan kesan sampingan walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Sesetengah kesan sampingan mungkin serius. Beritahu doktor anda jika anda mengalami simptom berikut:

- Berat badan bertambah
- Muntah, loya
- Kesukaran bernafas
- Rasa panas, kemerahan pada muka dan leher
- Tekanan darah tinggi
- Paras gula dalam darah tinggi
- Sembelit, cirit-birit, perut kembung (angin)
- Membuang air kecil dengan kerap
- Ruam
- Kabur penglihatan, kekeliruan, sawan
- Perubahan emosi

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan Megex-I Suspension

- Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C.

Lindungi daripada haba dan cahaya.

Jauhi semua ubatan daripada kanak-kanak.

- Pelupusan

Jangan mengambil Megex-I Suspension yang telah melepasi tarikh luput yang dicetak pada bungkusan.

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Jika doktor anda mengarahkan anda berhenti mengambil Megex-I Suspension, atau ubat ini telah melepasi tarikh luputnya, sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Megex-I Suspension adalah suspensi berwarna putih-krim dengan perisa oren.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan Aktif

Megestrol Acetate

- Bahan tidak aktif

Xanthan gum, polyethylene glycol 1450, polyoxyl 40 hydrogenated castor oil, citric acid anhydrous, sodium citrate hydrate, sucrose, sodium benzoate, orange essence and purified water.

- Bungkusan

Megex-I Suspension diisi dalam paket PET/LLDPE-Alu 20ml dan dibekalkan dalam 20 paket sekotak.

- Nombor MAL

MAL18016021AZ

Pengilang

Daewon Pharm. Co., Ltd.

24, Jeyakongdan 1-gil,

Hyangnam-eup, Hwaseong-si,

Gyeonggi-do, Republic of Korea.

Pemegang Pendaftaran Produk

IMEKS Pharma Sdn. Bhd.

No. 5 & 9, Jalan Udang Harimau 2,

Medan Niaga Kepong,

51200 Kuala Lumpur.

Tarikh kemaskini RiMUP

17/1/2020

Nombor siri

NPRA(R2/1)200114/332