

POVISHIELD SORE THROAT SPRAY 0.45 %W/V

Povidone Iodine (0.45 %w/v)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Povishield Sore Throat Spray 0.45 %w/v
2. Bagaimana Povishield Sore Throat Spray 0.45 %w/v berfungsi
3. Sebelum menggunakan Povishield Sore Throat Spray 0.45 %w/v
4. Cara menggunakan Povishield Sore Throat Spray 0.45 %w/v
5. Semasa menggunakan Povishield Sore Throat Spray 0.45 %w/v
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Povishield Sore Throat Spray 0.45 %w/v
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemasikini RiMUP

Apakah kegunaan Povishield Sore Throat Spray 0.45 %w/v

Kelegaan untuk sakik tekak, sakit bengkak, ketidakselesaan tekak dan serak disebabkan oleh radang tekak.

Bagaimana Povishield Sore Throat Spray 0.45 %w/v berfungsi

Povidone Iodine mempunyai banyak fungsi sebagai antiseptik dan disinfektan.

Sebelum menggunakan Povishield Sore Throat Spray 0.45 %w/v

- Bila tidak boleh menggunakan

- Jika anda alah terhadap iodine atau povidone atau apa-apa bahan yang mengandungi dalam produk ini;
- Jika anda mempunyai masalah tiroid;
- Jika anda akan menerima atau sedang menerima terapi radioaktif iodine;
- Jika anda mengguna produk yang mengandungi merkuri seperti thiomersal.

- Mengandung dan menyusukan anak

Ubat ini tidak disyorkan untuk digunakan dalam kehamilan atau penyusuan.

Jika anda hamil atau menyusu atau bercadang untuk hamil, maklumkan kepada doctor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan Povishield Sore Throat Spray 0.45 %w/v.

- Sebelum mula menggunakan Povishield Sore Throat Spray 0.45 %w/v

Beritahulah doktor atau ahli farmasi jika anda:

- alah kepada iodine atau *povidone*;
- mempunyai masalah tiroid;
- hamil atau merancang kehamilan;
- sedang menyusukan anak anda;
- ada sejarah gejala alahan yang disebabkan oleh ubat atau lain- lain;
- mengalami hakisan mukosa mulut yang teruk;
- menerima rawatan iodine radioaktif dalam tempoh 4 minggu yang lalu;
- Hendak digunakan pada kanak-kanak berumur 1 hingga 6 tahun.
- Guna Povishield Sore Throat Spray 0.45 %w/v sebelum ujian diagnostik

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Ubat / sediaan lain yang disapukan pada kulit untuk menyembuhkan luka, jika digunakan pada masa yang sama, boleh mengubah kesan Povishield Sore Throat Spray 0.45 %w/v atau kesan ubat / sediaan yang lain itu.

Produk yang mengandungi raksa, perak, hidrogen peroksida, octenidine dan taurolidine boleh bersaling tindak dengan *Povidone Iodine* dan tidak boleh digunakan pada masa yang sama.

Penggunaan serentak dengan produk merkuri boleh menyebabkan pembentukan bahan ramuan yang boleh merosakkan

kulit.

Rawatan ini boleh mengganggu ujian atau fungsi tiroid dan boleh menyebabkan rawatan tiroid dengan iodine mustahil. Selepas rawatan selanglah sekurang-kurangnya 1-2 minggu sebelum menjalani scintigram.

Beberapa jenis ujian untuk mengesan specimen (tidak kelihatan) darah di dalam najis atau darah dalam air kencing mungkin terjejas (iaitu menghasilkan keputusan positif palsu). Jangan mulakan rawatan dengan ubat yang baru tanpa memberitahu doctor yang merawat anda.

Untuk mendapatkan maklumat selanjutnya mengenai risiko lain yang boleh timbul kerana menggunakan ubat ini, tanyalah doktor atau ahli farmasi.

Cara menggunakan Povishield Sore Throat Spray 0.45 %w/v

- Berapa banyak harus digunakan.

Halakan muncung ke arah tekak dan sembur 2 atau 3 kali setiap 3-4 jam.

Kanak-kanak harus diawasi oleh penjaga mereka semasa menggunakan produk ini.

Produk ini hanya digunakan untuk semburan tekak; jangan menelan atau digunakan pada luka atau luka terbakar.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan Povishield Sore Throat Spray 0.45 %w/v untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat.

POVISHIELD SORE THROAT SPRAY 0.45 %W/V

Povidone Iodine (0.45 %w/v)

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Simptom yang berikut jarang-jarang sekali berlaku, tetapi jika anda mengalami mana-mana antaranya: sakit perut, kegagalan buah pinggang untuk menghasilkan air kencing, masalah peredaran darah, susah bernafas, pengumpulan cecair dalam peparu atau sebarang keabnormalan akibat gangguan metabolisme, sila mendapat rawatan dengan segera. Terapi: Rawatan simptomatik dan sokongan perlu diberikan perhatian khusus kepada keseimbangan elektrolit dan buah pinggang dan fungsi tiroid.

Semasa menggunakan Povishield SoreThroat Spray 0.45 %w/v

- Perkara yang perlu dilakukan

Gunakan Povishield Sore Throat Spray 0.45 %w/v mengikut arahan doktor atau ahli farmasi. Maklumkan kepada semua doktor dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Povishield Sore Throat Spray 0.45 %w/v.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini. Beritahu doktor anda sekiranya simptom anda tiada perubahan selepas 5 hari atau bertambah teruk selepas menggunakan ubat ini; atau anda mempunyai kesan sampingan seperti iritasi kulit, kemerahan, lepuh kecil, gatal-gatal yang berlaku secara serta-merta selepas menggunakannya.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan gunakan ubat ini dengan alkali, hydrogen peroksida, taurolidin, asid tannic, asid acetylsalicylic, semua perak, bismut dan garam merkuri.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Povishield Sore Throat Spray 0.45 %w/v adalah untuk kegunaan mulut dan tekak sahaja dan bukan untuk kawasan tubuh yang luas.

Sekiranya anda tertelan atau terkena pada mata, sila pergi ke klinik berdekatan dengan segera. Pengawasan yang rapi diperlukan selepas tamat rawatan ini untuk mengesan simptom-simptom awal hipertiroidisme dan jika perlu, fungsi tiroid hendaklah dipantau.

Jika anda mempunyai kegagalan buah pinggang, beri perhatian jika kerap menggunakan Povishield Sore Throat Spray 0.45 %w/v pada luka. Jika berlaku gatal-gatal or sensitiviti, berhenti menggunakannya. Povishield Sore Throat Spray 0.45 %w/v tidak menjejaskan keupayaan anda untuk memandu atau menggunakan mesin.

Kesan-kesan sampingan

Povishield Sore Throat Spray 0.45 %w/v boleh menyebabkan kerengsaan mukosa mulut serta reaksi alahan. Sekiranya terdapat kerengsaan atau sensitif, hentikan penggunaan dan dapatkan nasihat doktor anda. Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini. Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my (Consumer → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)).

Cara penyimpanan dan pelupusan Povishield Sore Throat Spray 0.45 %w/v

- Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C.

Lindungi daripada cahaya.

Jauhkan daripada capaian kanak-kanak

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Larutan sedikit pekat yang berwarna kuning kecoklatan atau coklat dan berbau khas.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Povidone Iodine

- Bahan-bahan tidak aktif

Glycerin, Menthol, Potassium Iodide, Ethanol & Purified Water

- Nombor MAL

MAL24116002XCZ

Pengilang

Syarikat Wen Ken Drug Sdn Bhd
24, Jalan Lambak, Taman Johor,
81200 Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

EP Plus Group Sdn Bhd
Block C-3-1, Plaza Mont Kiara,
No. 2, Jalan Kiara, Mont Kiara,
50480 Kuala Lumpur, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

11/12/2025

Nombor Siri

NPRA (R2) 24/085