

ULTIMAX CREAM®

Methyl Salicylate / Eucalyptus Oil / Menthol (25.5% w/w / 10% w/w / 3.3% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Ultimax Cream.
2. Bagaimana Ultimax Cream berfungsi.
3. Sebelum menggunakan Ultimax Cream.
4. Cara menggunakan Ultimax Cream.
5. Semasa menggunakan Ultimax Cream.
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Ultimax Cream.
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan Ultimax Cream

Ultimax Cream digunakan untuk melegakan kesakitan dan ketidakselesaan pada otot atau sendi untuk sementara waktu.

Bagaimana Ultimax Cream berfungsi

Ultimax Cream mengandungi methyl salicylate dan menthol yang bertindak sebagai agen anti-iritasi (menyebabkan kulit terasa sejuk dan kemudian hangat). Ia juga mengandungi minyak Eucalyptus yang bertindak sebagai *rubefacient* (menyebabkan peningkatan aliran darah dan menjadikan kulit kemerahan). Kesan krim ini pada kulit akan mengalihkan perhatian anda dari rasa sakit pada otot, sendi, dan tendon anda.

Sebelum menggunakan Ultimax Cream

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan menggunakan produk ini jika anda alah kepada Methyl Salicylate, minyak Eucalyptus, Menthol atau sebarang bahan lain yang terkandung di dalam produk ini (disenaraikan dalam Maklumat lanjut)

Jangan gunakan produk ini pada kanak-kanak di bawah umur 2 tahun.

- Sebelum menggunakan Ultimax Cream

Berhati-hati apabila menggunakan produk ini untuk merawat kanak-kanak berumur 2 tahun dan ke atas.

Mengandung dan menyusukan anak

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Produk ini mengandungi Methyl Salicylate dan apabila digunakan atau digosok pada bahagian kulit, ia boleh meresap ke dalam darah.

Jika anda sedang mengambil warfarin (ubat untuk mengurangkan pembekuan darah), penggunaan yang berlebihan pada kulit boleh meningkatkan risiko pendarahan.

Rujuk doktor anda jika anda sedang mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi daripada farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Ultimax Cream

- Berapa banyak harus digunakan

Urut secara perlahan-lahan pada kulit mengikut keperluan.

Ikuti semua arahan yang diberikan oleh doktor dan ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza daripada maklumat yang terkandung dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Guna krim ini seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

Urut secara perlahan-lahan pada kawasan yang tidak terluka dua hingga tiga kali sehari. Sebaik-baiknya digunakan selepas mandi air suam.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan ubat ini mengikut tempoh masa yang disyorkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika anda terlupa menggunakan

Sapukan dos yang tertinggal sebaik sahaja anda ingat. Sekiranya sudah hampir masanya untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal. Teruskan menyapu ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan sapukan dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Ultimax Cream

- Perkara yang perlu dilakukan

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Ultimax Cream.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan memberi Ultimax Cream kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Untuk kegunaan luaran sahaja.

ULTIMAX CREAM®

Methyl Salicylate / Eucalyptus Oil / Menthol (25.5% w/w / 10% w/w / 3.3% w/w)

Produk ini tidak boleh disapu pada kulit yang terluka atau meradang, atau berhampiran mata atau membran mukus.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, Ultimax Cream boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang akan mengalaminya.

Kesan sampingan yang mungkin berlaku adalah:

- reaksi hipersensitiviti contoh simptom seperti gatal, bengkak pada muka atau tekak (Angioneurotik edema), ruam, kesukaran bernafas.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers→ Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Ultimax Cream

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan di bawah suhu 30°C. Lindungi daripada cahaya dan pembekuan.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Krim legap berwarna hijau muda.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Methyl Salicylate
Eucalyptus Oil
Menthol

- Bahan tidak aktif

Purified Water, Polysorbate 80,
Triethanolamine, Carbomer,
Capsicum Oleoresin, Chlorophyll
Oil Soluble, Methyl
Hydroxybenzoate, Chlorocresol
dan Propyl Hydroxybenzoate

- Nombor MAL

MAL20021181X

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Hovid Berhad

121, Jalan Tunku Abdul Rahman
(Jalan Kuala Kangsar),
30010 Ipoh,
Perak, Malaysia.

Tarikh kemas kini RiMUP

02/04/2024

Nombor Siri

NPRA(R4/1)010424/00050