

HOVITOL SOLUTION

Chloroxylenol (5% w/v)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Hovitol
2. Bagaimana Hovitol berfungsi
3. Sebelum menggunakan Hovitol
4. Cara menggunakan Hovitol
5. Semasa menggunakan Hovitol
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Hovitol
8. Maklumat Lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan Hovitol

Hovitol digunakan untuk/sebagai

- Membersihkan luka, abses (bengkak yang diisi dengan nanah di bawah kulit disebabkan jangkitan kuman) dan bisul (bengkak yang merah dan sakit disebabkan jangkitan folikel rambut)
- Pembasmi kuman permukaan secara rutin

Bagaimana Hovitol berfungsi

Produk ini mengandungi chloroxylenol yang membunuh bakteria dan mencegah pertumbuhan bakteria.

Sebelum menggunakan Hovitol

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan menggunakan Hovitol jika anda mempunyai alahan kepada chloroxylenol atau sebarang bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat lanjut).

- Sebelum menggunakan Hovitol

Mengandung atau menyusukan anak

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengandung,

merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya, atau kedai makan kesihatan.

Cara menggunakan Hovitol

Untuk kegunaan luaran sahaja.

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Berapa banyak harus digunakan

Saiz pek (mL)	Untuk luka, lecet, gigitan dan sengatan serangga	Kegunaan		
		Untuk kegunaan dalam rumah		Untuk mandi
		Untuk mencuci kain dan lampin	Untuk mencuci lantai dan permukaan keras lain	
50	1 penutup Hovitol (5mL) dalam 100mL air	6 penutup Hovitol (30mL) dalam 1.2L air		1 penutup Hovitol (5mL) dalam air mandi
100	1 penutup Hovitol (10mL) dalam 200mL air	3 penutup Hovitol (30mL) dalam 1.2L air		1 penutup Hovitol (10mL) dalam air mandi
120	1 penutup Hovitol (10mL) dalam 200mL air	3 penutup Hovitol (30mL) dalam 1.2L air		1 penutup Hovitol (10mL) dalam air mandi
750	1 penutup Hovitol (12mL) dalam 250mL air	2 penutup Hovitol (24mL) dalam 1L air	5 penutup Hovitol (60mL) dalam 2.4L air	1 penutup Hovitol (12mL) dalam air mandi
1000	1 penutup Hovitol (23mL) dalam 500mL air	1 penutup Hovitol (23mL) dalam 1L air	2.5 penutup Hovitol (57.5mL) dalam 2.4L air	1 penutup Hovitol (23mL) dalam air mandi

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Gunakan ubat ini mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika anda terlupa menggunakannya

Gunakan dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian terus menggunakan ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

HOVITOL SOLUTION

Chloroxylenol (5% w/v)

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Hovitol

- Perkara yang perlu dilakukan

- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang sedang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Hovitol.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan memberi Hovitol kepada sesiapa sahaja, sama ada mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

- Jangan menggunakannya tanpa dicairkan.
- Elakkan daripada terkena pada mata. Jika terkena, bilas mata dengan air.
- Jika tertelan, bilas mulut

dengan air dan minum air atau susu yang banyak.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Hovitol Solution boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Apabila menggunakan produk ini, anda mungkin mengalami kulit sensitif.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Hovitol

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan di bawah suhu 30°C.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-

langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Larutan jernih berwarna perang gelap.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

- Chloroxylenol

- Bahan tidak aktif

- Caramel Liquid, Oleic Acid, Fragrance, Potassium Hydroxide, Isopropyl Alcohol, Terpineol, Castor Oil, Purified Water

- Nombor MAL

MAL09061604X

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Hovid Bhd.
121, Jalan Tunku Abdul Rahman
(Jalan Kuala Kangsar),
30010 Ipoh,
Perak, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

10/09/2024

Nombor Siri

NPRA(R4/1)020924/00116